

PREIS-
VERZEICHNIS
1954/55



CONRAD MAASS

Baum- und Rosenschulen

Rellingen in Holstein

Fernsprecher Pinneberg 3157

Schneekloth sen.


PREIS-VERZEICHNIS

1954/55

der

Baum- und Rosenschulen

CONRAD MAASS



Rellingen in Holstein

Fernsprecher: Amt Pinneberg 31 57

Telegr.-Adresse: Rosenmaass, Rellingen, Bez. Kiel

Bank-Konten: Pinneberger Bank. Abteilung der
Schleswig-Holsteinischen und Westbank Pinneberg

Postscheck-Konto: Hamburg 566 85

Berechtigt zur Führung des Markenetiketts für Baumschulerzeugnisse



Mitglied

des Zentralverbandes der Forstpflanzenbetriebe
des Bundes deutscher Baumschulen
des Vereins deutscher Rosenfreunde
der Deutschen dendrologischen Gesellschaft
der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst
und Landschaftsgestaltung
der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft

Spezialkulturen
in niedrigen und Hochstamm-Rosen

Obst, Beerenobst, Zier- und
Treibsträucher

Koniferen, Forst- und Hecken-
pflanzen

Wildlinge aller Art



Durch den Bund deutscher Baumschulen anerkannte Qualitäts-Baumschule

An meine verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit überreiche ich Ihnen mein neues Preisverzeichnis. Bitte, schauen Sie es sich recht eingehend an, sicherlich werden Sie manches für Ihren Bedarf finden. Ich hoffe sehr, auch in diesem Jahr Ihre Aufträge zu erhalten.

Die Reichhaltigkeit meiner Sortimente und der gute Stand meiner Kulturen ermöglichen es Ihnen, Ihren gesamten Bedarf an Baumschul-Pflanzen bei mir zu decken.

Ich danke Ihnen herzlich für das bisher erwiesene Vertrauen. Dieses Vertrauen zu erhalten und zu rechtfertigen ist mir ständige Verpflichtung. Ich will darüber hinaus Ihre besonderen Wünsche, soweit ich dazu in der Lage bin, gerne erfüllen.

Meine Baumschulen liegen an der Bundesstraße 5 Hamburg-Husum-Westerland nur 15 km von Hamburg entfernt. Vom Vorortsbahnhof Pinneberg gehen Sie 25 Minuten. Wenn Sie mich rechtzeitig anrufen, bin ich auch gern bereit, Sie vom Bahnhof abzuholen. Bitte, überzeugen Sie sich selbst von der Qualität meiner Pflanzen. Ich freue mich immer über Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen!

Conrad Maass

Obstbäume und Fruchtsträucher

Unsere Obstbäume sind auf mildem Lehm Boden herangezogen und werden in gesunder, wüchsiger Ware geliefert.

Mittlere Wahl 20 % billiger

1. Obstbäume

Apfel (siehe Sortenverzeichnis Seite 6)

			1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme,	180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	3,50	31,50	280,—
	180—200 cm Stammhöhe	8—10 cm StU.	4,50	40,—	360,—
Halbstämme,	120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	3,—	27,—	240,—
	120—150 cm Stammhöhe	7—9 cm StU.	3,50	31,50	280,—
Viertelstämme,	80—100 cm Stammhöhe	6—8 cm StU.	3,—	27,—	240,—
Buschbäume,	60 cm Stammhöhe	2jährig	2,75	25,—	225,—
	60 cm Stammhöhe	3—4jährig	3,50	31,50	280,—
Spindelbüsche		2jährig	2,50	22,50	200,—
		3jährig	3,—	27,—	240,—
Schnurbäume,	senkrecht	2jährig	2,50	22,50	200,—
	senkrecht	3—4jährig	3,—	27,—	240,—
Schnurbäume,	waagrecht, einarmig	2jährig	3,50		
	waagrecht, zweiarmig	3—4jährig	5,50		
Schrägspaliere		1 Etage	4,—	36,—	
		2 Etagen	5,—	45,—	
Pyramiden		mit 2 Serien	5,—	45,—	
U-Formen		2jährig	5,—		
		3—4jährig	6,—		

Birnen (siehe Sortenverzeichnis Seite 7)

Hochstämme,	180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	4,50	40,—	360,—
	180—200 cm Stammhöhe	8—10 cm StU.	5,50	50,—	450,—
Halbstämme,	120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	3,50	31,50	280,—
	120—150 cm Stammhöhe	7—9 cm StU.	4,—	36,—	320,—
Viertelstämme,	80—100 cm Stammhöhe	6—8 cm StU.	3,50	31,50	280,—
Buschbäume,	60 cm Stammhöhe, auf Wildling veredelt	2jährig	3,—	27,—	240,—
	60 cm Stammhöhe, auf Wildling veredelt	3—4jährig	4,—	36,—	320,—
	60 cm Stammhöhe, auf Quitte veredelt	2jährig	3,50	31,50	280,—
	60 cm Stammhöhe, auf Quitte veredelt	3—4jährig	5,—	45,—	400,—
Spindelbüsche,	auf Wildling veredelt	2jährig	3,—	27,—	240,—
	auf Wildling veredelt	3—4jährig	4,—	36,—	320,—
	auf Quitte veredelt	2jährig	3,50	31,—	280,—
	auf Quitte veredelt	3—4jährig	4,50	36,—	320,—
Schnurbäume,	senkrecht	2jährig	3,—	27,—	240,—
	senkrecht	3—4jährig	4,—	36,—	330,—
Schnurbäume,	waagrecht, einarmig	2jährig	4,—		
	waagrecht, zweiarmig	3—4jährig	5,50		
Schrägspaliere		1 Etage	4,50	3 Etagen	6,50
		2 Etagen	5,50		
U-Formen		2jährig	6,—		
		3—4jährig	7,—		

Pflaumen und Zwetschen (siehe Sortenverzeichnis Seite 8)

Hochstämme,	180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	3,50	31,50	280,—
	180—200 cm Stammhöhe	8—10 cm StU.	4,50	40,—	360,—
Halbstämme,	120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	3,—	27,—	240,—
	120—150 cm Stammhöhe	7—9 cm StU.	3,50	31,50	280,—
Buschbäume		2jährig	2,75	25,—	225,—
		3—4jährig	3,50	31,50	280,—

Süß- und Sauerkirschen (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Hochstämme,	180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	4,50	40,—	360,—
	180—200 cm Stammhöhe	8—10 cm StU.	5,50	50,—	450,—
Halbstämme,	120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	3,50	31,50	280,—
	120—150 cm Stammhöhe	7—9 cm StU.	4,—	36,—	320,—
Büsche		1jährig	2,50	22,50	200,—
		mehrfährig	3,—	27,—	240,—
Fächer		1jährig	4,—	36,—	
		mehrfährig	5,—	45,—	

Pfirsiche (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

irsische (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)		1 St.	10 St.	100 St.
		DM	DM	DM
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	7,—	63,—	
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	5,—	45,—	
Büsche, auf Pflaumen oder Sämling veredelt	1jährig	4,—	36,—	320,—
Büsche, auf Pflaumen oder Sämling veredelt	2jährig	5,—	45,—	400,—
Fächer, auf Pflaumen oder Sämling veredelt	1jährig	5,50	50,—	
Fächer, auf Pflaumen oder Sämling veredelt	mehrjährig	6,50	58,—	

Aprikosen (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	7—8 cm StU.	7,—	63,—	
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe	6—7 cm StU.	5,—	45,—	
Fächer	1jährig	5,50	50,—	
	2jährig	6,50	58,—	
Büsche	1jährig	4,—	36,—	
	2jährig	5,—	45,—	

Quitten (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe		5,—	45,—	400,—
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe		4,—	36,—	320,—
Büsche	1jährig	2,50	22,50	200,—
	2—3jährig	3,50	31,50	280,—

2. Schalenobst

Eßbare Kastanien (*Castanea sativa*)

Hochstämme	8—10 cm StU.	8,—		
	10—12 cm StU.	10,—		
Heister	Höhe 150—200 cm	3,60	33,—	300,—
	Höhe 200—250 cm	4,40	40,—	360,—

Walnüsse (*Juglans regia*)

Hochstämme	8—10 cm StU.	8,—	72,—	
	10—12 cm StU.	10,—	90,—	
Heister	Höhe 150—200 cm	5,—	45,—	

Haselnüsse (Sorten siehe Sortenverzeichnis Seite 10)

Büsche, in großfrüchtigen Sorten, verpfl. Ableger		1,75	16,—	140,—
Büsche, aus Samen gezogen, 60—100 cm		1,20	11,—	100,—

3. Beerenobst und Sonstiges

Stachelbeeren (siehe Sortenverzeichnis Seite 10)

Hochstämme	4—6 Triebe	1,70	15,30	140,—
	6 und mehr Triebe	2,—	18,—	160,—
Halbstämme	4—6 Triebe	1,50	13,50	120,—
	6 und mehr Triebe	1,70	15,30	140,—
Fußstämme	4—6 Triebe	1,30	12,50	110,—
	6 und mehr Triebe	1,50	13,50	120,—
Büsche	3—5 Triebe	—,60	5,40	48,—
	5—8 Triebe	—,80	7,20	64,—
	8—12 Triebe	1,—	9,—	80,—

Johannisbeeren (siehe Sortenverzeichnis Seite 10)

Hochstämme	3—4 Triebe	1,70	15,30	140,—
	4 und mehr Triebe	2,—	18,—	160,—
Halbstämme	3—4 Triebe	1,50	13,50	120,—
	4 und mehr Triebe	1,70	15,30	140,—

		1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
Büsche	3—5 Triebe	—,55	5,—	45,—	400,—
	5—8 Triebe	—,70	6,30	56,—	490,—
	8—12 Triebe	—,90	8,—	72,—	650,—

Brombeeren

Wilsons Frühe und Kitatiny, aufrechtwachsend	1jährig	—,50	4,50	40,—
	2jährig verpflanzt	—,90	8,—	72,—
Theodor Reimers, rankend	1jährig	—,90	8,—	72,—
	2jährig verpflanzt	1,20	11,—	100,—

Himbeeren

Sorten: Preußen, Deutschland, Lloyd George, Nordmark	1jähr. Ruten	—,30	2,75	25,—	225,—
	2jährig verpflanzt	—,45	4,—	36,—	320,—

Weinreben

	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
mit Topfballen, 40—60 cm hoch	1jährig	2,75	25,—	
mit Topfballen, 60—100 cm hoch	2jährig	3,50	31,50	

Rhabarber

Elmsfeuer, vollkommen dunkelrote Stiele, sehr ertragsreich	—,60	5,40	48,—	430,—
Elmsjubiläum, vollkommen dunkelrote Stiele	—,80	7,20	66,—	590,—
Holsteiner Blut, (Vierländer), rotfleischig und starktriebzig	—,70	6,30	56,—	500,—
Loher Blut, Verbesserung von Holsteiner Blut	—,70	6,30	56,—	500,—
Verbesserter Viktoria, ausgezeichnet durch sehr starke Stiele	—,60	5,40	48,—	430,—

Erdbeeren:

	25 St. DM	50 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
Gruppe I: Oberschlesien, Deutsch Evern, Mad. Moutot, Sieger, Hansa, Schwarze Ananas, Königin Luise u. ähnl. Sorten	2,—	3,50	6,—	50,—
Gruppe II: Prinz J. E. Braunschweig, Eva Macherauch, Mieke Schindler, Dithmarschen, Georg Soltwedel	2,25	4,—	7,—	60,—

Monatserdbeeren:

Rügen, rankenlose Monatserdbeere, ununterbrochen tragend, dunkelrote Frucht, 1jährig verpflanzt	2,25	4,—	7,—	60,—
---	------	-----	-----	------

Spargel

Ruhm von Braunschweig, Sämlinge	1jährige	4,50	40,—
Sämlinge	2jährige	5,50	50,—

Verzeichnis der Obstsorten

Da nicht alle Sorten in allen Formen vorrätig sind, empfehlen wir, soweit es sich nicht um einzelne Sorten für den Massenanbau handelt, uns die Sortenwahl zu überlassen. In diesem Fall bitten wir um Angabe der Bodenverhältnisse, des Klimas, der Lage und um Auskunft darüber, ob eine Tafel- oder Wirtschaftsfrucht, eine frühe oder eine späte Sorte gewünscht wird. Wir werden dann die geeigneten Sorten aussuchen und sind dabei in der Lage, durchweg starke Bäume zu liefern.

Apfelsorten

Charlamowsky, August-September, sehr früh und reichtragend für rauhe Lagen, mittelgroße, karminrotgestreifte Frucht, von säuerlichem Geschmack.

Croneels, September-Oktober, große, hellgelbe Frucht, von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist starkwachsend und gegen Kälte unempfindlich.

Sommeräpfel

Schöner aus Bath, Juli-September, sehr früher und regelmäßiger Träger, von großer Windfestigkeit, Frucht mittelgroß, orange-gelb, sonnenseits rötlich geflammt.

Weißer Klarapfel, Ende Juli-Mitte August, mittelgroße bis große, grünlichweiße Frucht von angenehm-säuerlichem Geschmack, geeignet für den Großanbau.

Herbstäpfel

Biesterfelder Rtte., Okt.-November, große, saftige, gelbe, rotgestreifte Tafelfrucht. Eine sehr wertvolle Herbstsorte.

Cox Pomona, Oktober-November, sehr große, gelbe, rot gestreifte Frucht.

Finkenwärdler Herbstprinz, Oktober-Dezember, Frucht groß, länglich, rotgestreift, Lokalsorte aus dem Alten Land, reichtragend, Tafel- und Wirtschaftsapfel.

Geheimrat Dr. Oldenburg, Frucht mittelgroß, goldgelb, mit rötlicher Sonnenseite. Baum früh und reichtragend. Für den Massenanbau geeignet.

Gelber Richard, Oktober-Januar, große zitronengelbe Frucht von edelstem Wohlgeschmack. Baum trägt spät, nicht überreich, gedeiht am besten im nordischen Küstenklima.

Großherzog Friedrich von Baden, Oktober-Dezember, große hellgelbe Frucht, gesunder, früher und regelmäßiger Träger.

Gravensteiner, September-Dezember, edle, sehr saftreiche Sorte von herrlichem Ananasduft und Geschmack, verlangt tiefgründigen, feuchten Boden und geschützte Lage. Liebt Seeklima.

James Grieve, September-Oktober, mittelgroße Frucht, hellgelb mit roten Streifen, von angenehm würzigem, süßweinigem Geschmack, sehr saftig. Vorzüglicher Tafelapfel.

Prinzenapfel, Oktober-Dezember, bekannte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Signe Tillisch, November-Januar, große, hellgelbe Frucht von gutem Geschmack, gesunde und reichtragende Sorte.

Winteräpfel

Adersleber Kavill, Dezember-März, große, kantige, grünlich-gelbe Frucht von angenehmem Geschmack. Sehr gute Tafelfrucht.

Altenländer Pfannkuchenapfel, Februar-April, mittelgroße Frucht von platter Form. Außerordentlich reichtragender, kräftig wachsender, gesunder Baum.

Baumanns Rtte., Dezember-April, mittelgroße, lebhafte gerötete Frucht. Früher und reicher Träger, der für den Straßenanbau gut geeignet ist.

Boikenapfel, Januar-April, große, hellgelbe Frucht mit roter Backe. Gesunder, guter Träger, der für den Straßenanbau geeignet ist.

Coulons Rtte., Dezember-März, große, gelbe, süßweilige Frucht. Eine vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsf Frucht.

Danziger Kantapfel, Oktober-Januar, mittelgroße, gerippte Frucht von angenehmem Geschmack. Gute Sorte für den Haus- und Kleingarten.

Filippa-Apfel, November-Januar, mittelgroßer, gelber, leicht geröteter Tafel- und Wirtschaftsapfel.

Geheimrat Breubahn, Dezember-April, große, gelbe Frucht, die bei völliger Reife auf der Sonnenseite rot überzogen ist und ein saftiges, gutes Aroma hat.

Goldrenette von Blenheim, November-März, große, goldgelbe, rot gestreifte Frucht. Eine wertvolle Tafel- und Wirtschaftsf Frucht für geschützte Lagen.

Grahams Jubiläumsapfel, November-März. Ein früher und regelmäßiger Träger mit gelben leicht geröteten Früchten.

Großer Bohnapfel. (großer rheinischer Bohnapfel) Januar-Mai, eine der besten Wirtschaftssorten mit mittelgroßer gelblich-grüner Frucht. Später aber reicher und regelmäßiger Träger, der für den Massen- und Straßenanbau bestens geeignet ist.

Hornburger Pfannkuchenapfel, Dezember-Januar, sehr große, grünlich-gelbe, reichtragende Lokalsorte aus dem Alten Land. Eine vorzügliche Wirtschaftsf Frucht.

Ingrid Marie, Dezember-Januar, sehr gesunder und stark wachsender Findling der Sorte Cox Orange. Früchte größer und intensiver in der Färbung als die Muttersorte.

Jacob Lebel, November-Januar, sehr große, gelblich-grüne Frucht. Vorzügliche Wirtschafts- und Marktf Frucht. Für den Massenanbau geeignet.

Kaiser-Wilhelm, November-März, mittelgroße bis große goldgelbe, lebhafte rot-gestreifte Tafel- und Wirtschaftsf Frucht.

Landsberger Rtte., November-Januar, goldgelbe, leicht gerötete Frucht von angenehmem Geschmack. Eine gute Tafel- und Wirtschaftsf Frucht.

Laxtons Superb, Dezember-März, große, kräftige, rot überlaufende, wüchsige, reichtragende Sorte.

Martini-Apfel, November-Februar, mittelgroßer, gelblich-grüner, hochfeiner Tafelapfel. Ein gesunder und reicher Träger bei guten Bodenverhältnissen.

Neue Goldparmanäe, November-Januar, mittelgroße, widerstandsfähige Marktsorte, die keinen großen Anspruch an den Boden stellt und sehr gut in rauen Lagen gedeiht.

Ontario, Januar-Juni, große, flachrunde, kantige gelbe Frucht von angenehmem Geschmack, eine für den Erwerbsobstbau geeignete Sorte.

Purpurroter Cousinot, November-April, mittelgroße, vorzügliche Wirtschaftsf Frucht, die keine Ansprüche an den Boden stellt und auch in rauen Lagen gut gedeiht.

Rote Sternrenette, November-März, mittelgroße, blutrote mit weißlich-grünen Sternchen besetzte Frucht. Ein sehr guter Tafelapfel, der sehr widerstandsfähig gegen Krebs und Fusikladium ist.

Roter Eisapfel, Januar-Mai, ziemlich großer, dunkelroter Apfel. Eine ausgezeichnete Wirtschafts- und Marktf Frucht, Straßenbaum für rauhe Lagen.

Schöner aus Boskoop, Dezember-April, große grünlich-gelbe, gerötete Frucht. Eine sehr gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktf Frucht.

Weißer Winterglockenapfel, Dezember-April, spätreifende, mittelgroße, glockenförmige, reingelbe Frucht, von angenehm säuerlichem Aroma. Eine sehr gute Tafel- und Wirtschaftsf Sorte.

Wintergoldparmanäe, November-Februar, mittelgelbe, lebhafte gerötete Frucht, von angenehmem Geschmack. Eine Tafel- und Wirtschaftsf Frucht.

Zuccalmaglios Rtte., Dezember-März, mittelgroße, zitronengelbe, leicht gerötete, saftreiche Frucht. Ein guter Tafelapfel für wärmere Gegenden.

Birnensorten

Sommerbirnen

Bunte Juli, Juli-August, Frucht mittelgroß, lebhafte gelb, rot gefärbt, von angenehmem Geschmack. Marktsorte.

Clapps Liebling, Mitte August-Anfang Okt., Frucht groß, gelb, mit geröteter Sonnenseite. Ausgezeichnete Frühbirne.

Frühe aus Trevoux, Anfang August, mittelgroße, längliche, saftreiche Frucht, gute Marktsorte.

Gute Graue, Ende August-Anfang September, mittelgroße, gelblich-grüne Frucht. Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Für den Straßenanbau gut geeignet.

Juli Dechantsbirne, Ende Juli - Anfang August, kleine gelbliche, rotbackige Tafel- u. Marktf Frucht.

Lübecker Sommerbergamotte, September, Frucht mittelgroß, gelbbraun. Eine reichtragende Sorte.

Williams Christbirne, September, große, keulige hellgelbe, leicht gerötete Frucht. Eine wertvolle, frühe und reichtragende Birne. Für Kleingarten und Massenanbau.

Herbstbirnen

Boes Flaschenbirne, Oktober - Mitte November, mittel bis große Frucht, hellgelb, mit zimtfarbigem Rost, gute Tafel- und Marktf Frucht.

Gellerts Butterbirne, September - Oktober, große, grünlich-gelbe, broncefarben berostete Frucht. Sehr gute Herbstbirne für geschützte Lagen.

Graf Moltke, Oktober, große, zimtfarbig berostete Frucht. Gute Tafelsorte.

Gute Luise, Oktober, eiförmige, gelblich-grüne, leicht punktierte, saftreiche und süße Frucht. Gute Einmachfrucht.

Kongreßbirne, (Andenken an den Kongreß) September-Anfang Okt., große, gelbe, gerötete, saftreiche Frucht, die keine besonderen Ansprüche an den Boden stellt.

Köstliche aus Charnen, Anfang Oktober-Mitte November, mittelgroße, grünlich-gelbe Frucht. Gute Tafel- und Handelsorte, auch für rauhere Lagen und als Straßenbaum.

Neue Poiteau, Anfang Oktober - Mitte November, große bis sehr große, grüne graupunktierte Frucht. Gute Tafelsorte, auch als Straßenbaum geeignet.

Prinzess Marianne, September-Oktober, mittelgroße, leicht kantige, hellgelbe Frucht, die sehr saftreich, würzig süßweinig schmeckt. Gute Tafel- und Marktf Frucht.

Rote Bergamotte, September-Oktober, mittelgroße, flachrundige, gelblich-grüne, sonnenwärts mit samtfarbigem Rost überzogene und punktierte Frucht, vorzügliche Wirtschaftsfrucht.

Speckbirne, Oktober, mittelgroße, unempfindliche Sorte. Eine der besten Wirtschaftssorten.

Vereins Dechantsbirne, Frucht groß, breit kegelförmig, hellgelb, goldartig gerötet. Gute saftreiche Tafel- und Marktf Frucht.

Winterbirnen

Alexander Lucas, Oktober-Dezember, große, stumpfe, kegelförmige, gelblich gepunkte Frucht. Sehr saftige süße Tafel- und Marktf Frucht.

Diels Butterbirne, November - Dezember, große, dickbauchige, goldgelbe, leicht gerötete, sehr saftige Frucht. Gute Tafel- und Marktsorte.

Hellmanns Melonenbirne, (Keulenbirne) Oktober-November, große abgeplattete Einmachbirne. Gut für windige Gegenden.

Gräfin von Paris, Dezember-Januar, ziemlich große, grünlich-gelbe, dicht punktierte saftreiche und süße Frucht.

Pastorenbirne, November-Anfang Januar, Frucht groß bis sehr groß, hellgelb, Sonnenseite gerötet. Unempfindliche Erwerbsorte und gute Einmachfrucht.

Pflaumen- und Zwetschensorten

Anna Späth, Ende September - Anfang Oktober, Frucht ziemlich groß, braunrot, bläulich bereift. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Früher und außerordentlich reicher Träger, für warme und sonnige Lagen.

Bühler Frühzwetsche, Ende August, mittelgroße, dunkelblaue Frucht, stark bereift, Reicher Träger in warmen Böden.

Emma Leppermann, August, sehr große gelbe, sonnenseitig hellrote Frucht.

Esperens Goldpflaume, Anfang September, große, goldgelbe Tafelfrucht.

Gelbe Eierpflaume, Anfang-Mitte September, große bis sehr große, gelbe Frucht. Eine dankbare Liebhabersorte.

Graf Althans Renekode, Anfang August - Ende September, große, kugelförmige, bräunlich-rote, sehr saftige Frucht. Eine wertvolle und reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Große grüne Renekode, Anfang - Mitte September, Frucht groß, gelblich-grün. Eine der besten Renekodensorten für den Massenanbau und Kleingarten.

Hauszwetsche, Ende September - Mitte Oktober, mittelgroße, dunkelblaue Frucht. Brauchbare Sorte für den Gartenbau sowie für die Plantage.

Königin Viktoria, Ende August - Anfang September, sehr große, hellviolett-rote Frucht. Früher und reicher Träger, für den Kleingarten und den Erwerbsanbau.

Nancymirabelle, Anfang-Mitte August, Frucht mittelgroß, gelb, rot gepunktet. Eine ertragreiche Sorte.

Ontariopflaume, Anfang-Mitte August, sehr reichtragende, grünlich-gelbe, große Frucht. Tafel- und Wirtschaftssorte.

Quilins Renekode, Mitte-Ende August, gelbe, große Frucht, rot punktiert. Gute Tafel- und Wirtschaftssorte.

Ruth Gerstetter, Ende Juli, früheste blaue Pflaume, von angenehmen süßsaurem Geschmack.

Schöne aus Löwen, August, rotblaue, dunkelviolette, große ansprechende Frucht. Gute Wirtschaftssorte.

The Czar, August, große, rundliche, dunkelblaue, wohlschmeckende Frucht. Tafel- und Wirtschaftssorte.

Wangenheims Frühzwetsche, Mitte August - Anfang September, mittelgroße, schwarz-blaue Frucht. Sorte für den Groß- und Kleinganbau. Reicher Träger.

Süßkirschen

Braunauer, Anfang Juli, Frucht schwarz-rot, mittelgroß, sehr reichtragend.

Dönissens gelbe Knorpelkirsche, Ende Juli-August, mittelgroß, süß mit leichter Säure.

Früheste der Mark, Anfang-Mitte Juni, mittelgroße, braun-rote Frucht. Früheste aller Kirscheensorten.

Große Braune, Mitte Juli, glänzend braun-rot, mittelgroß, angenehm säuerlich.

Große Prinzessinkirsche, Mitte Juli, Frucht gelblich-rot, sehr groß und wohlschmeckend, festes Fleisch.

Große schwarze Knorpel, Ende Juli, große, glänzend schwarze Frucht. Sehr reich tragend.

Hedelfinger Riesen, Mitte-Ende Juli, sehr große schwarz-rote Frucht. Beliebte Tafel- und Einmachsorte.

Jorker Späte, Ende Juli, Frucht klein mit herbem Geschmack.

Kassins frühe, Ende Juni, ziemlich große, braun-rote Frucht. Sehr gute Tafelfrucht.

Napoleons Knorpelkirsche, Mitte Juli, der großen Prinzessinkirsche sehr ähnlich. Etwas früher reifend.

Rote Knorpelkirsche, Mitte Juli, Frucht dunkelbraunrot, mittelgroß, Edle Tafelfrucht.

Schneiders späte Knorpelkirsche, Ende Juli, Frucht groß, schwarzbraun, festfleischig, Sehr wohlschmeckend.

Sauerkirschen

Ostheimer Weichsel, Ende Juli, Frucht mittelgroß, dunkelrot, sehr reichtragend.

Schattenmorellen (große, lange Lotkirsche), Ende Juli-August, große rundliche, dunkelbraun-rote Frucht. Wertvollste Sorte zum Einmachen und zum Versand. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Königin Hortense, Anfang-Mitte Juli, sehr große, hellrote Frucht, edle Tafelfrucht, aber mäßiger Träger.

Schöne aus Choisy, Anfang-Mitte Juli, reichtragende, mittelgroße, hellrote Frucht, von säuerlichem Geschmack. Sehr widerstandsfähig gegen Monilla.

Pfirsiche

Amsden, Ende Juli-Anfang August, mittel- bis ziemlich große, gelbe, rötliche Frucht. Durch die frühe Reife eine gesuchte Marktsorte.

Alexander, Juli-Anfang August, mittelgroße gelblich-weiße, karminrot überfärbte Frucht. Früher und ergiebiger Träger.

Mayflower, Mitte Juli, große, rundliche, sonnenwärts leuchtend rote Früchte, von vorzüglichem Geschmack.

Proskauer, Anfang-Mitte September, mittelgroße Frucht, hellgelb mit rot marmoriert. Dünnhäutige, gute Einmachfrucht. Trägt auch in rauheren Lagen.

Waterloo, Ende Juli-Anfang August, mittelgroße, auf grünlich-gelbem Grund rot überzogene Frucht. Eine widerstandsfähige, kräftige Frühsorte.

Aprikosen

Ambrosia, Ende Juli-Anfang August, große, feinvollige, dunkelgelbe Frucht. Eine der besten Tafelsorten, fruchtbarer, früher Träger.

Nancyaprikose, Ende Juli-Anfang August, große, orange gelbe mit rot überlaufene Frucht, vorzügliche Tafelsorte, harter und reicher Träger.

Luizetsaprikose, Ende Juli, große bis sehr große, orange gelbe Frucht, wertvolle Versand- und Handelsorte.

Quitten

Champion, birnenförmige, grünlich-gelbe, grau- filzige Frucht. Reicher und regelmäßiger Träger.

Portugiesische Birnenquitte, mittelgroße, grüne, birnenförmige Frucht.

Riesenquitte von Lescovae, apfelförmige große Frucht.

Haselnüsse

Lange Landsberger, Gunslebener Zellernuß, Holsteiner Lambertsnuß, Hallesche Riesennuß, Neue Riesennuß, Webbs Preisnuß, Wunder aus Bollweiler, Fertile, Cosford, Prince royal, Bars spanische.

Stachelbeeren

Rot: Amerikanische Gebirgsstachelbeere, Maiherzog, Maurers Sämling, Rote Deutsche, Rote Preisbeere, Rote Triumph (Winhams Industry).

Weiß: Blanca, weiße Triumph (White Smith).

Gelb: Gelbe Riesen, Golden Ball, Golden Yellow, Hönigs Früheste, Lauffener Frühe, Gelbe Triumphbeere.

Grün: Früheste aus Neuwied, grüne Flaschenbeere, grüne Deutsche, grüne Hansa, Lady Delamere.

Johannisbeeren

Schwarz: Bank up, Gollath, Lee's schwarze, Rosenthals Langtraubige.

Weiß: große weiße Holländer weiße Werdersche, Weiße aus Jüterbog, Weiße Versaller.

Rot: Fays fruchtbare, rote Holländer, rote Kirsch, Heros, Erstling von Vierlanden, Laxtons Nr. 1.

Weinreben

Elbing, grüngelb, frühe Sorte, mit großen grüngelblichen Beeren.

Roter Gutedel, ziemlich früh, mit großen, rötlichen Beeren.

Weißer Gutedel, mittelfrüh, großtraubig, Beere gelbgrün.

Früher Blauer Burgunder, früh, schwarzblau.

Früher Malinger, sehr frühe Sorte, mit gelblichgrünen bis goldgelben Beeren.

- Preis-
gruppe**
- 3 Erna Harkness, feurig-scharlachrote, edle, gut gefüllte, duftende Blume, buschig wachsend und gesund. Gr. Schn. Th.
- + 2 Etoile de Hollande, dunkelblutrot, Blume groß, duftend. Tr. Schn. Gr. Th.
- 5 First Love, mittlere, gut gefüllte, duftende Blume, die sich lange hält. Farbe hellrosa mit dunkelrosa Schatten. Reichblühend, winterhart und gesund. Gute Garten- und Schnittrose.
- 1 Fischer & Holmes, leuchtend scharlachrot, mit mittelgroßer, gefüllter Blume. Reichblühend. Schn. Tr. R.
- 4 Forty-Niner, starkwachsende, gutverzweigte und gesunde Pflanze. Die reinen Farben, innen bräunlichrot und außen gelb, halten sich bis zum Verblühen.
- 1 Frau Carl Druschki, blendend reinweiß, groß und gefüllt, Knospe länglich, von edlem Bau. Tr. Schn. Gr. R.
- 5 Fred Howard, starker, aufrechter Wuchs, gesund und winterhart. Sehr haltbare und gut gefüllte Blume von goldorangener Farbe mit rosa Schattierung.
- 2 Fritz Höger, große, dichtgefüllte, rein dunkelrote, haltbare Blume. Sehr starkwüchsig. Schn. Gr. Th.
- + 4 Geheimrat Duisberg, Farbe reingelb, Blume groß, hochedel gebaut, haltbar bis zum vollständigen Verblühen. Tr. Schn. Gr. Th.
- 4 G. J. Joe, besonders schöne, rosa Treibsorte mit den gleichen guten Eigenschaften wie ihre Stammsorte Better Times.
- + 4 Gloria Dei, Blume rein goldgelb, mit karminrotem Rand. Starkwüchsig mit glänzender Belaubung. Schn. Gr. Th.
- 3 Golden Dawn, sehr reich blühend, rein goldgelb, stark duftend, an den Duft der Marschal Niel erinnernd. Schn. Th.
- 2 Golden Ophelia, reingoldgelb, hoch, edle Becherform, auf langen, schlanken Stielen stehend. Tr. Schn. Gr. Th.
- 3 Grande Duchesse Charlotte, langsam erblühende, orange bis tomatenrote, große Blume mit gutem Duft. Pflanze aufrecht, starkwüchsig und willig blühend.
- + 3 Gretel Greul, orange-rosa blühend, in ein schönes Hellrot übergehend, Sport der Sorte Rapture, aber stärker im Wuchs, die Blume ist größer und schöner als die Stammsorte. Gr. Schn. Tr.
- 4 Hens Verschuren, leuchtend, rein blutrote, auf langen Stielen stehende, nie verbrennende Blume. Schn. Gr. Th.
- 3 Kaiserin Auguste Viktoria, blendend weiß auf grünlichgelbem Grund, stark duftend. Tr. Schn. Gr. Th.
- 3 Katherine T. Marshall, besonders gute Freilandschnittsorte mit aufrechtem Wuchs, die auch bei starkem Schnitt wieder durchtreibt. Sehr große, edelgeformte, tieflachsrosa Blüten auf langen Stielen mit starkem Duft.
- 3 Liebesglut, Blume groß, von schönem Bau. Die Farbe ist ein schwärzlich schattiertes, nicht verblauendes Blatrot. Wuchs buschig aufrecht mit gesundem Laub. Gr. Schn. Th.
- 1 Luna, Blume von reingelber, leuchtender Farbe. Gr. Th.
- + 1 Mad. G. Forest Colcombet, glänzend dunkelkarmin mit scharlachrot, durchleuchtet, auf langem, aufrechtem Stiel. Tr. Schn. Gr. Th.
- Preis-
gruppe**
- + 2 Mad. Jules Bouché, zuweilen blendend reinweiß, zuweilen rosig schattiert. Blume mittelgroß, gut gefüllt. Tr. Schn. Gr. Th.
- 4 Marcelle Gret, Blumen von besonders schöner, goldgelber Farbe, mit edelgeformten Knospen. Eine wertvolle Schnitt- und Gartenrose.
- 2 Margaret M. Gredy, Farbe geranienschalot mit scharlachorange. Großblumig und gefüllt. Gr. Th.
- 4 Marrakech, aufrecht, sehr stark und buschig wachsend. Große, vollgefüllte Blume von blutroter, scharlachrot schattierter Farbe.
- + 2 Mevrouw G. A. van Rossem, Blume dunkelorange, aprikosen- und bronzefarbig schattiert und gefleckt auf goldgelbem Grund. Rückseite der Petalen bräunlichrot mit kirschrot geädert. Tr. Schn. Gr. P.
- 3 Michele Meillard, Blume gefüllt von zarter, weißlichrosa Färbung ohne irgendwelche Schattierungen, Wuchs stark buschig mit guter gesunder Belaubung. Gr. Schn. Th.
- 5 Mme. Alphonse Braeckmann, Enorm große, vollgefüllte Blume von dunkelrosa Farbe. Die Sorte ist sehr gesund und wächst aufrecht und kräftig.
- 3 Mme. Henri Guillot, Farbe kupferfarbig rot ohne Schattierungen. Blume gut gefüllt, große, von langgestreckter Becherform. Pflanze buschig mit glänzend, gesundem Laub.
- 5 Mme. L. Dieudonné, reichblühende und gesunde Gartenrose in einziger Farbenpracht, die auch zum Schnitt geeignet ist. Außenseite der Blüten leuchtendgelb, Innenseite leuchtendfeurigrot.
- 2 Mrs. John Laing, seidenartig, rein rosa duftende Blume. Starkwachsend und reichblühend. Tr. Schn. Gr. R.
- 2 Mrs. Sam Mc. Gredy, Blume ganz vorzüglich gefüllt, edel geformt auf langen, festen Stielen, Farbe scharlach-kupfer-orange, mit Rot schattiert. Schn. Gr. Th.
- + 2 Narzisse, besonders groß in der Blüte, voll gefüllt, rein gelb. Schn. Th.
- 4 Neige Parfum, sehr große, blendend-reinweiße, starkduftende Blume. Die Pflanze wächst gut, ist gesund und blüht sehr reich. Wertvolle Neuheit.
- + 4 New Yorker, Blüten dunkelrot, groß, gut gefüllt, langsam aufblühend, schöne Form; Wuchs kräftig. 50 cm hoch, gesund. Tr. Schn. Th. Gr.
- 5 Opera, reichblühende, stark wachsende Gartenrose mit guter Belaubung. Hat sehr große Blumen in kräftig kirschroter Farbe.
- 2 Ophelia, Blume zart fleischweiß, oft goldgelb und rot angehaucht. Tr. Schn. Gr. Th.
- 4 Perle von Aalsmeer, große gefüllte Blume, von edlem Bau, stark duftend, auf langen Stielen stehend. Farbe leuchtend karminrot. Gr. Schn. Tr.
- 3 Phyllis Gold, Blume auf sehr langen kräftigen Stielen, groß, gutgefüllt, von edler Form. Farbe hellgelb. Gr. Schn. P.
- + 3 Poinsetta, leuchtende, feurig scharlachrote Farbe. Blume groß, genügend gefüllt, auf kräftigen Stielen stehend, nicht verblassend. Gr. Schn. Th.
- + 1 President Herbert Hoover, orangerosa bis kupferrot, Farbenschönheit, hervorragend für Treiberei. Tr. Schn. Gr. Th.
- 3 President Macia, Rosa-fleischfarben, beste Schnittrose.

Preis-
gruppe

- 3 Printemps, starkwachsend mit schöner Belaubung. Die sehr großen, gut gefüllten Blumen sind an der Innenreihe lachsfarbig rosa und an der Außenreihe goldgelb. Sehr haltbar, kräftige Stiele und duftend.
- + 2 Quebeck, sehr reich blühend, gut gefüllt. Farbe gelb, außen rötlich schattiert. Gr. Schn. Th.
- + 2 Rapture, Sport von Mad. Butterfly, aprikosenkorallenfarbig mit rosa und goldig vermischt. Stark duftend. Tr. Schn. Gr. Th.
- + 3 Roselandia, Sport von Golden Ophelia. Blume von schönster goldgelber Färbung. Tr. Schn. Gr. Th.
- + 2 Rote Rapture, Sport von Rapture, mit den Blüten und Wuchseigenschaften der Stammsorte, in der Belaubung aber dunkler. Farbe hellkirschrot. Tr. Schn. Gr. Th.
- 5 Serenade, Gartenrose von mittelhohem, buschigem Wuchs mit leicht duftenden, korallenorangenen Blumen. Gesund und willig blühend.
- 4 Signora Puricelli, lachsrosa Schnittrose, vollkommen gesund.
- 4 Souvenir de Jac Vershuren. Steil aufrecht wachsende Gartenrose mit großen, gut gefüllten kupferorangefarbenen Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Auch als Treibsorte geeignet.
- + 3 Speck's Yellow, Blume mittelgroß bis groß, gut gefüllt, von intensiver leuchtend sonnen-gelber Farbe. Sehr wüchsig. Gr. Schn. Th.
- 2 Sterling, Blume am Rande der Petalen hellrot, bis zum Grunde in zartrosa übergehend, von edler Form, auf langen Stielen stehend. Tr. Schn. Gr. Th.
- 4 Sutters Gold, Th. Blüten goldgelb, außen orange, locker gefüllt, groß, Wuchs stark, aufrecht 70 cm, Tr. Schn. Th. Gr.

Preis-
gruppe

- 4 Tallyho, Blüten innen karmesin, außen hochrot, duftend, groß, gefüllt, langstielig, Knospen becherförmig; Wuchs kräftig, 60 cm. Tr. Schn. Th. Gr.
- + 1 Texas Centennial, ein roter Sport von Pres. Herbert Hoover, die hervorragenden Eigenschaften der Stammsorte in sich vereinigend, aber mit großer Blüte. Die Farbe ist auffallend karmin-orange bis kapuziner-braunrot. Wertvolle Treib- und Schnittrose. Tr. Schn. Gr. Th.
- 4 The Doctor, wertvolle Neuheit, starkwachsende Freilandschnittrose von reiner dunkelrosa Farbe. Sehr guter Duft.
- 1 Ulrich Brunner fils, kirschrot mit ziemlich großer Blüte. Tr. Schn. R.
- 5 Valiant, große gefüllte, karmesin-leuchtend-rote Blume mit herrlichem Duft.
- 3 Verschuren's Pink, Schöne Blume von rötlich-rosa Farbe.
- 3 Vierlanden, orangerosa, sehr starkwüchsige Rose mit herrlichen, gut geformten und gefüllten Blüten. Tr. Schn. Gr. Th.
- + 4 Virgo, eine sehr schön geformte, blendend weiße Rose von langer Haltbarkeit. Die sehr langgestreckten Knospen öffnen sich sehr langsam. Belaubung frei von Krankheit, eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Gr. Tr. Schn. Th.
- 4 White Swan, Edelgeformte, reinweiße, gut gefüllte Blume mit leichtem Duft und langer Haltbarkeit. Die Farbe hält sich auch bei schlechtem Wetter. Ausgesprochener Schnittrosenwuchs.

Polyantharosen

Preis-
gruppe

- + 4 Alain, Polyantha-Hybride, Blume in sehr großen Dolden sitzend, groß, gefüllt, von dunkelkarminroter Farbe, große Leuchtkraft. Wuchs buschig mit gesunder Belaubung.
- 5 Andenken an Marshall Mannerheim, ähnlich wie Orange Triumph, Farbe leuchtend-orangescharlach. Blumen in riesigen Dolden. Eine sehr wertvolle Polyantha-Rose. Vollkommen gesund und frosthart.
- 4 Chatter, große, gefüllte, karminrote Blume von guter Haltbarkeit. Gut durchtreibend und von gesundem, mittelhohem Wuchs.
- 3 Dagmar Späth, Sport von Josef Guy, in Wuchs und Blühwilligkeit dieser vollkommen gleichend. Farbe blendendes Alabasterweiß.
- 3 Dick Koster, ziemlich große, in Büscheln stehende Blumen. Farbe hell-lachsrosa bis orange, gleichmäßig wachsend, gute Treibsorte.
- 3 Donal Prior, feurig scharlachrot, Blume von großer Leuchtkraft, in Dolden stehend, sehr haltbar mit gesunder krankheitsfreier Belaubung.
- 3 Elfe, Blüten von weißlicher Farbe mit rosa Anhauch. Stark wachsend und reich blühend.

Preis-
gruppe

- 3 Else Paulsen, zart-leuchtend rosa, eine reichblühende ältere wertvolle Sorte.
- 3 Erna Grootendorst, schönste dunkelrote Polyantha-Rose mit niedrigem Wuchs, absolut winterhart. Für die nordischen Länder als Gruppenrose besonders gut zu empfehlen.
- 3 Eva Teschendorf, eine reichblühende Rose mit rein-weißlichen Blumen.
- + 3 Fanal, Farbe rosa-rot mit leichter Orangetönung, von großer Leuchtkraft, nie verblauend, sehr reichblühend, großblumig, Belaubung glänzend sattgrün.
- + 4 Fashion, Polyantha-Hybride. Die großen, halb gefüllten Blumen stehen in schönen, großen Büscheln. Farbe zart lachsrosa. Wuchs gleichmäßig buschig, eine hervorragende Polyantha-Rose.
- 3 Feuerschein, ein blutroter Sport von Josef Guy. Farbe sehr leuchtend. Wuchs und Blütenreichtum wie bei der Stammsorte.
- + 3 Frau Astrid Späth, Sport von Josef Guy, leuchtend korallenrosa.
- + 3 Fresham, Polyantha-Hybride. Blüte halb gefüllt in Büscheln sitzend, von auffallend leuchtend dunkelroter Farbe. Sehr stark wachsend.

Preis-
gruppe

- 3 Freude, sehr große edelrosenähnliche, hellrosa Blüten in Büscheln stehend. Stark und aufrechtwachsend.
- + 3 Gabriele Privat, Blumen vollgefüllt, in riesigen Dolden stehend. Farbe seidartig rosa. Sehr reichblühend und gleichmäßig im Wuchs.
- + 4 Gelbe Holstein, Farbe wirkungsvoll hellgelb, in der Knospe dunkelgelb. Blumen halbgefüllt, groß, in großen Rispen sitzend, von erstaunlicher Haltbarkeit. Breitbuschig starkwachsend. Laub sattgrün, vollkommen gesundbleibend.
- + 3 Gloria mundi, feurig orange ohne jeden Nebenton. Ein seltener Farbton.
- 4 Goldlocks, die großen, goldgelben, halb gefüllten Einzelblumen stehen in Büscheln zusammen und sind sehr haltbar.
- 3 Gotenhafen, Farbe leuchtend rein-rosa. Blumen mittelgroß und halbgefüllt. Wuchsgutverzweigt und starkwüchsig. Im Laub gesundbleibend.
- + 3 Gruppenkönigin, Blume sehr groß, vollkommen gefüllt, karminrosa, die Innenseite der Petalen hellrosa. Sehr reichblühend.
- + 3 Gruß an Aachen, große, herrlich dunkelgelbe mit blutrot schattierter Blume. Eine ausgezeichnete Sorte für Gruppen, Töpfe und Rabatten.
- + 3 Gruß an Finnland, Polyantha-Hybride von leuchtend roter Farbe und stark duftend. Zum Schnitt geeignet.
- + 3 Heidegruß, stark gefüllte, haltbare Blüten, von gelblich-lachsrosa Farbe. Die einzelnen Blüten sind sehr groß.
- + 3 Heidekind, gut gefüllt, bis zu 5 cm groß in den Dolden, korallenrosa. Wuchs gedungen, unermüdlich blühend.
- 3 Helgoland, Polyantha-Hybride, gefüllte, mit großen, in Büscheln stehenden, Blumen, von leuchtend blutroter Farbe. Wuchs aufrecht und gedungen.
- 3 Herzblut, Polyantha-Hybride, Blume sehr groß, halb gefüllt, in Büscheln stehend, von leuchtender, weithin scheinender, blutroter Farbe. Buschiger und gedungener Wuchs mit gesunder, glänzender Belaubung.
- + 3 Holstein, sehr große Blumen in Büscheln dicht zusammen stehend, von feurig blutroter Farbe mit breitbuschigem Wuchs.
- 3 J. F. Müller, Sport von Rodhütte, feurig blutrot.
- + 3 Joseph Guy, Blumen leuchtend scharlachrot von niedrigem Wuchs.
- + 3 Käthe Duvidneau, Polyantha-Hybride, mit halbgefüllten, in schönen Büscheln stehenden, Blumen, von leuchtend roter, lachsscheiniger Farbe. Kräftiger breitbuschiger Wuchs mit gesunder, glänzender Belaubung.
- + 3 Karl Kempkes, leuchtend dunkelrote, auffallend große Blüten, in großen Büscheln stehend.
- + 3 Karl Weinhausen, rot-dunkelrote, nie verblauende, halb gefüllte, in Büscheln sitzende, Blüten. Sehr reichblühende Sorte mit vollkommen krankheitsfreier Belaubung.
- 3 Kirsten Poulsen, Blumen von feurig orange purpurroter Farbe.

Preis-
gruppe

- + 3 Koster fulgens, herrliche dunkel-lachsrosa Farbe. Zum Frühlreiben als Topfrosee bestens geeignet, ebenso als niedrigblühende Gruppenrose.
- 4 Märchenland, hellrosa, gut gefüllte, in Büscheln stehende Blumen, reichlich blühend, kräftig und hochwachsend.
- 3 Margo Koster, niedrigblühende, kleinblumige halbgefüllte Topfrosee mit lachsorangenen Blüten, die sich auch besonders zur Beetpflanzung eignet.
- + 3 Martha Kordes, Blumen orangerosa, groß, halbgefüllt, Pflanzen buschig, reich und dauernd blühend.
- 4 Obergärtner Wiebecke, große, schalenförmig, karminrosa Blüten, gesund, frosthart und blühwillig.
- + 3 Orange Triumph, Blume orange-scharlachrot, gut gefüllt, in sehr großen Dolden. Wuchs stark buschig.
- + 3 Pink Aachen, ein Sport (der Sorte Gruß an Aachen, jedoch von apfelblütenrosa Farbe.
- 3 Koralle ein leuchtend blutroter Sport von Else Poulsen.
- 5 Red Pinochio, mit großen, dunkelroten, gefüllten, sehr haltbaren Blüten. Lange und voll blühend. Breiter Wuchs, Höhe ca. 50 cm.
- 3 Rodhütte, leuchtend rot von niederem Wuchs.
- 3 Rosa Vollendung, eine enorm große, gefüllte, dunkel karminrosa blühende Sorte.
- 3 Rosenelfe, Polyantha-Hybride. Die ziemlich großen Blumen von edlem Bau stehen meistens in großen Büscheln, Farbe an der Außenseite der Petalen silbrig rosa, von der Innenseite rosig-weiß, Wuchs mittelhoch.
- 3 Rosenmärchen, Polyantha-Hybride, mittelgroße, schön geformte Blüten in Büscheln und größeren Dolden zusammensitzend. Farbe Mer Blüten gelblich-rosa. Wuchs breitbuschig.
- 3 Sammetglut, Farbe sammetartig rot, nie verblauend. Blumen mäßig gefüllt, fast einfach, sehr groß, ungewöhnlich haltbar. Wuchs buschig, Belaubung vollkommen gesund.
- 3 Silberlachs, Blüten schalenförmig, silberlachs-farbig. Hellgrüne, gesunde Belaubung, bis 100 cm hoch werdend.
- + 3 Tantau Triumph, Polyantha-Hybride, Blüte von einzigartiger, leuchtend orangeroter Farbe. Pflanzen stark und aufrechtwachsend.
- + 5 Tantau Überraschung, Polyantha-Hybride, Blumen groß, gefüllt mit eigenartig gewellten Petalen, ganz dunkelblutrot, starkwachsend.
- 4 United Nations. Gesunde und reichblühende Pflanze von gedungenem, aufrechtem Wuchs mit mittelgroßen, halbgefüllten, hellrosa und pfirsichfarben-schattierten Blumen.
- + 3 Verdun, lebhaft purpurkarmin, niedrig bleibend.
- 3 Weiße Gruß an Aachen, Großblumige und sehr gut gefüllte, reinweiße Blumen von langer Haltbarkeit. Sehr zu empfehlen.
- 3 Willi Maass, leuchtendrot, sehr schön.
- 4 Yellow Pinochio, Gesund und buschig wachsende Pflanze mit reingelben, gut gefüllten, in großen Büscheln blühenden Blumen.

Kletter- und Rankrosen

Preisgruppe

- 4 American Pillar, rein rosenrot mit weißer Mitte, Blüten einfach, in riesigen Dolden.
- 4 Blazer, eine immerblühende Pauls scarlet Climber. Diese Sorte ähnelt der Stammrose in allen vortrefflichen Eigenschaften.
- 4 Dorothy Perkins, kirschrot, Blumen in riesigen Dolden, sehr dankbar blühend.
- 4 Dästerlohe, dunkelrosa mit großen einfachen Blüten, in Dolden stehend, starkwachsende Sorte.
- 5 Eva, blutrote, immerblühende Rankrose mit riesigen Blumen in gewaltigen Dolden. Die Pflanze rankt stark und blüht unaufhörlich bei völlig krankheitsfreier Belaubung.
- 4 Exelsa, leuchtend dunkelrot, Blume gebaut wie bei D. Perkins. Stark wachsend.
- 4 Gloire de Dijon, enorm große, stark duftende, gefüllt blühende, gelbe Sorte mit starkem Wuchs und von langer Haltbarkeit.
- 4 Golden Climber, Farbe goldgelb.
- 4 Golden Gloew, rein goldgelb, Blume edelrosenähnlich.
- 4 Guinée, eine rote, stark duftende, edelrosenähnliche, gefüllt und öfter blühende Sorte.
- 5 Hamburg, Einzelblüten von bedeutender Größe in großen Dolden stehend. Feurig-scharlachrot.
- 4 Hiawatha, Blumen einfach in großen Dolden, Blütrot mit weißer Mitte.
- 4 Käthe Schmidt, Blume rein rosa.

Preisgruppe

- 4 Le Reve, rankende Lutea Hybride. Farbe rein goldgelb.
- 4 Mad. Barbier, reich blühend, Farbe gelblich fleischfarbig.
- 4 Mary Wallace, Farbe leuchtend-silbrig, rosa. Blumen groß, edelrosenähnlich, gut gefüllt, rehr reich- und vollblühend. Pflanze sehr starkwüchsig.
- 5 New Dawn, zartrosa, edelrosenähnlich, duftende Blumen, stark rankend, ungeheuer reich blühend.
- 4 Pauls scarlet Climber, leuchtend scharlachrot, Pflanze sehr rankend, mit großer krankheitsfreier Belaubung.
- 4 Revel Dijonnais, Blumen groß, hellgefüllt, edelrosenähnlich, Innenseite der Petalen erdbeerrot auf gelbem Grund, Außenseite gelb mit leicht karmin.
- 4 Royal Scarlet Hybrid. Farbe feurig blutrot.
- 4 Tausendschön, zartrosa, Blumen in großen Dolden, stark rankend, stachellose Pflanzen.
- 4 Venusta pendula, stark wachsend. Blüte weiß, zart rosa überhaucht.
- 4 White Dorothy, weißblühender Sport von Dorothy Perkins, Blüte milchweiß, zuweilen rosig angehaucht.
- 5 Wilhelm, blutrote, gefüllte Blumen in enorm großen Riesendolden. Die Pflanze wächst stark aufrecht, überhängend und blüht den ganzen Sommer.

Park- und Wildrosen

Preis-Gruppe

- 5 Rosa alba
- 5 Mad. Plantier, rein weiß, mittelgroß, starkwüchsig.
- 5 Maidens Blush, fleischfarbig rosa.
- 5 Rosa californica flore pleno. Blüten rosarot.
- 1 Rosa canina, die bekannte Hundsrose.
- Rosa centifolia
- 5 Blanche Morresu, rein weiß.
- 5 Capitain John Ingram, schwärzlichrot.
- 5 Centifolia muscosa, kräftig rosa.
- 5 Christata, Blume rosa.
- 1 Rosa gallica (L) Essigrose, bis 1,50 m hoch werdend, dicht, stachlig und borstig, Blätter rauh, dunkelgrün, Blüten rosa bis rot, 5-6 cm breit, Frucht rundlich, ziegelrot, treibt starke Ausläufer. Deshalb besonders geeignet für Befestigung von Böschungen.
- 5 splendens (chapeau de Napoleon). Blumen sehr groß, halb gefüllt, leuchtend feurig rot, die ganze Pflanze bedeckend.
- 5 versicolor, karminrot, weiß gestreift, halb gefüllt, sehr reichblühend.
- 5 Rosa Hugonis, Blume einfach groß, leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend.
- 5 Rosa hybrida bifera Hermann Löns. Blume sehr groß, einfach, leuchtend brennend rot.
- Rosa Lambertiana
- 5 Berlin, feurig-zinnoberrot mit gelber Mitte in riesigen Dolden stehend, von ungewöhnlicher Haltbarkeit, ein unermüdlicher Blüher, stark und buschig wachsend.

Preis-Gruppe

- 5 Bonn, zinnober-meningrot, große, lockere Blüten in Rispen stehend, starker Blüher; bis 1,5 m hoch werdend.
- 5 Elmsborn, ungewöhnlich große, gut gefüllte hellrote Blüten in Dolden stehend von langer Haltbarkeit. Belaubung vollkommen krankheitsfrei.
- 5 Erfurt, halb gefüllte, leuchtend rosa-rote Blüten mit weißer Mitte.
- 5 Hamburg, sehr große, halb gefüllte, feurig-scharlachrote Blüten in großen Dolden stehend, starkwüchsig und winterhart.
- Rosa lutea
- 5 Austrian Yellow, leuchtend goldgelb, einfach und früh blühend.
- 5 Harrisoni, leuchtend gelb, gefüllt.
- 5 bicolor, außen gelb, innen kapuzinnerrot.
- 5 bicolor atropurpurea. Blumen außen gelb, innen kapuzinnerrot, leuchtender als lutea bicolor.
- 5 Parkfeuer, Blume feurig rot.
- 5 Persian Yellow, rein gelb.
- 5 Rosa macrophylla Amalata, Blüte rosa, sehr stachlig, reicher Fruchtbehang von länglichen roten Früchten.
- 5 Rosa moschata alba hybrida grandiflora (v. Freundiana) (Graeb), rein weiß.
- 1 multiflora, in weißen Rispen blühend, überhängend.

Preis-
Gruppe

- 5 *nutkana* (Presl.), bis 3 m hoch werdend, mit breiten Stacheln, Blätter dunkelgrün, unterseits drüsig behaart. Blüten einfach lila-rosa bis 7 cm groß. Früchte kugelig, lebhaft rot.
- 5 *omeiensis pteracantha* (Rend. u. Wils.), bis 3 m hoch werdend. Dornen stark verbreitend zu roten Flügeln umgebildet. Blüten meist mit 4 Petalen, weiß, Früchte birnenförmig hochrot.
- 1 *Rosa pimpinellifolia*, siehe *spinosissima*.
- 1 *Rosa rubiginosa*, hellrosa kleine Blumen.
- 5 Fritz Nobis, *Rubiginosa*hybride. Blüte in Rispen bis zu 6 zusammenstehend, gefüllt, gelblich-rosa, später weißlich-gelb.
- 5 *hybrida Rosenwunder*, hellrot vollkommen gefüllt, edelrosen ähnliche Blüten, starkwüchsig, vollkommen winterharte Pflanzen.
- 5 Josef Rothmund, *Rubiginosa*hybride. Blüten in Rispen bis zu 6 zusammenstehend, gefüllt, stark duftend. Farbe lachsrosa mit gelblichrosa.
- 5 *magnifica*, Blumen groß, halb gefüllt.
- 1 *Rosa rubrifolia*, hellrot, rötliches Laub.
- Rosa rugosa*
- 1 *alba* (Ware), Abart der *rosa rugosa* mit weißen Blüten.
- 5 *A parfum de l'Hay*, Blumen groß, gefüllt, karminkirschrot.
- 5 Conrad Ferd. Meyer, Blumen groß, gefüllt, rein centifolienrosa.

Preis-
Gruppe

- 5 Dr. Eckener. sattgelb, durchzogen, große Blume, erscheint schon im Frühjahr, starkwüchsig, reichblühend und winterhart.
- 5 Fr. J. Grotendorst. Blüten in Dolden stehend, mittelgroß, orangerot.
- 5 Goldener Traum, langtriebig, früh blühend mit großen, gefüllten, wohlriechenden Blumen.
- 1 *hollandica* (hort.), stark wachsender mittelhoher Strauch mit roten Blüten.
- 1 *Regelliana*, weiß und rot blühende Form der wilden *rugosa*.
- 5 *Nova Zembla*, rein weiß, duftend.
- 5 *Ruskin*, Blume groß bis sehr groß, voll gefüllt, stark duftend, dunkelkarmesinrot.
- 5 *Sanguinaire*, Blumen leuchtend blutrot in purpur übergehend auf gelbem Grund.
- 5 Stern von Prag, sammetartig schwarzrot, reichblühend, duftend.
- 1 *Rosa spinosissima* (*pimpinellifolia*), Blüte einfach weiß, Busch dicht verzweigt wachsend.
- 5 *grandiflora hybrida* Karl Foerster, Blüte sehr groß, gefüllt blühend, reinweiß, außerordentlich reich blühend.
- 5 *hispida hybr.* Frühlingsgold, Blüte einfach, sehr groß, rein goldgelb, Außenseite der Blumenblätter bei den Knospen braunrot gestreift. Sehr früh und überreich blühend. Wuchs stark überhängend.
- 1 *virginiana* (*lucida*), Blüte rosa, Blätter glänzend dunkelgrün, Früchte scharlachrot.


Zur Verwendung als Parkrosen

empfehlen wir, außer den oben angeführten Park- und Wildrosen, aus der Gruppe der unter Kletter- und Rankrosen aufgeführten Rosen noch folgende Sorten:


Blaze
Eva

Hamburg
Pauls Sc. Climber


Reveil Dijonais
Wilhelm




Es werden jährlich 450 000 Rosen in meiner eigenen Baumschule veredelt



Ein Teilquartier Juniperus chinensis pfitzeriana



Anzucht von Gehölzen und Koniferen in modernen Kastenanlagen



Ein Spezialquartier von Ilex pyramidalis in allen Größen mit Schutzpflanzung

Laubhölzer

Allee-, Solitär- und Zierbäume:

Die als „verpflanzte“ bezeichneten Bäume sind in fertigem Zustande in besonders weitem Stande verschult. Ein gutes Anwachsen ist dadurch sichergestellt. Der Stammumfang wird 1 m über dem Erdboden gemessen.

Ein Stammumfang von:

6—8 cm
8—10 cm
10—12 cm
12—14 cm
14—16 cm
16—18 cm
18—20 cm
20—22 cm
22—25 cm

entspricht einem Durchmesser von:

etwa 19—25 mm
„ 25—32 mm
„ 32—38 mm
„ 38—45 mm
„ 45—51 mm
„ 51—57 mm
„ 57—64 mm
„ 64—70 mm
„ 70—80 mm

Heckenpflanzen:

Alle durch ein „H“ bezeichneten Pflanzen sind Heckenpflanzen. Wir kultivieren unsere Heckenpflanzen auf mildem Lehmboden, der sachgemäß vorbereitet ist. Durch sachgemäßen Rückschnitt erzielen wir eine dichtverzweigte, gut garnierte Heckenware. Pflanzen von *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Cornus mas*, und *Fagus sylvatica* werden, soweit es notwendig ist, um einen geraden Mitteltrieb zu erzielen, an Stäben gezogen. Ein reichlich gemessener Reihenabstand bietet jeder Pflanze die Möglichkeit zu freiem, üppigem Wachstum.

Ziersträucher:

Alle Ziergehölze werden, soweit es sich nicht um Topfpflanzen handelt, in kräftigen 3—5-jährigen Pflanzen geliefert, die, mehrmals verpflanzt, in weitem Stand herangezogen sind. Die ungefähre Höhe der Sträucher ist angegeben.

Zeichenerklärung:

B == Bienenweide
H == Heckenpflanzen oder für Hecken geeignet
e == niedrige Einfassung
F == Gehölze mit Fruchtschmuck
I == Immergrüne Gehölze
L == Gehölze mit schöner Laub- und Herbstfärbung
R == Rauchharte Gehölze
Sch == Pflanzen für Schatten- und Unterholzpflanzung
St == Steingartenpflanzen
Tr == Trauerbaum
V == Vogelschutzgehölz
W == Windschutz verlangend

a) In Sorten nach unserer Wahl:

1. Vorsträucher, Zier- und Decksträucher
bis zur Preislage von 80,— DM per 100 Stück
2. Vorsträucher, Zier- und Decksträucher
bis zur Preislage von 120,— DM per 100 Stück
3. Baumartige Gehölze 200—300 cm hoch aus allen Preislagen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
---------------	-------------	--------------	---------------

65,—
90,—
150,—

b) In Sorten nach Wahl des Bestellers:

Acanthopanax (Mig.) Stachelkraftwurz (Araliaceae)

F.H.S.V. sieboldianus (Mak.) (A. pentaphyllum, March.) Stacheliger Strauch mit schöner dunkelgrüner, fünfteiliger Belaubung

90—125	2,50	22,50	200,—
--------	------	-------	-------

Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)

H.R.S.V. campestre (L.). Feldahorn, sehr gute Heckenpflanze für kalkhaltige Böden, auch als Straßenbaum zu empfehlen. Mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Büsche aus weitem Stand.

Auf Wunsch liefern wir eine mittlere Qualität, deren Preise 20% niedriger liegen.

80—100	1,10	10,—	85,—
100—125	1,45	13,—	115,—
125—150	1,80	16,—	150,—
150—175	2,25	20,—	180,—
175—200	3,—	27,—	240,—
200—225	3,60	33,—	300,—
225—250	4,50	40,—	360,—
80—100	1,—	9,—	80,—
100—125	1,25	11,—	100,—
125—150	1,50	13,50	125,—
150—200	1,80	16,50	150,—
200—250	2,25	20,—	180,—

verpflanzte Heister mit natürlicher, unregelmäßiger
Bezweigung

Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig verzweigt		200—250	8,—		
		250—300	12,—		
		300—350	20,—		
Alleebäume, Stammumfang		7—8	7,15	66,—	600,—
		8—10	8,50	77,—	700,—
		10—12	11,—	100,—	900,—
		8—10	13,50		
		10—12	17,50		
In extra weitem Stand verpflanzt					
L.	cappadocicum rubrum (Nasch) (laetum rubrum (Rupr.) (A. colchicum rubr.) (Booth), bis 20 m hoch werdender Baum mit rötlicher Rinde, Blätter im Austrieb dunkelrot, später grün werdend	100—150	2,35	22,50	200,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig verzweigt		100—150	4,50		
		150—200	5,50		
		200—250	7,—		
H.R.F.L.V.	dasyacarpum (Ehrh.) siehe Acer sacharinum (L.) ginnala (Maxim.). Strauch oder Baum bis zu 7 m. Zweige dünn, Blätter dreilappig, glänzend dunkelgrün mit leuchtendroter Herbstfärbung	80—120	1,20	11,—	100,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig		100—150	6,—		
		150—200	8,—		
St.	japonicum aureum (Schwer) (A. circinatum aureum) (Schwer), schwachwachsender Strauch, Blätter 7—11 lappig, 8—14 cm breit und lang mit gelber Farbe,	30—40	15,—		
		40—60	18,—		
L.	negundo (L.) Eschen-Ahorn, bis 25 m hoch, oft mehrstämmiger Baum mit überhängender Bezweigung mit hellgrünen, drei- bis fünfflappigen Blättern, verpfl. Heister	125—150	1,—	9,—	80,—
		150—200	1,25	11,—	100,—
		200—250	1,50	13,50	125,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig		200—250	4,—		
		250—300	5,50		
		300—350	7,50		
Hochstämme, Stammumfang		7—8	4,—	36,—	330,—
		8—10	5,—	45,—	400,—
		10—12	6,—	55,—	500,—
L.	auratum (Schwer) (A. n. odessanum) (Rothe). Austriebe bronze, Blätter fettgelb	70—100	4,—	36,—	330,—
		100—125	5,—	45,—	400,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig		100—150	8,—		
		150—200	15,—		
Halbstamm, Stammhöhe		125—150	5,—	45,—	
Hochstamm, Stammhöhe		175—200	7,—	63,—	
L.	aureo variegatum (Wesm.), mit gelbgerandeten Blättern	80—125	4,—	36,—	330,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig		100—150	8,—		
		150—200	15,—		
Halbstamm, Stammhöhe		125—150	5,—	45,—	
Hochstamm, Stammhöhe		175—200	7,—	63,—	
L.	arg. variegatum (Bonamy). Blätter breit, weißrandig	80—125	4,—	36,—	330,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig		100—150	8,—		
		150—200	15,—		
Halbstamm, Stammhöhe		125—150	5,—	45,—	
Hochstamm, Stammhöhe		175—200	7,—	63,—	
L.	palmatum (Thunb.) (A. polymorphum) (Sieb u. Zucc.) Fächerahorn, seine roten Zweige tragen zierlich tiefgelappte, frischgrüne Blätter, die sich im Herbst prächtig karminrot färben	60—80	4,—		
		80—100	6,—		
L.St.	atropurpureum (Schwer.) Blätter dunkelpurpurrot	40—60	6,—		
		60—80	8,—		
		80—100	12,—		
Einzelpflanzen, breitbuschig		60—80	12,—		
		80—100	15,—		
		100—125	23,—		
		125—150	33,—		
L.St.	dissectum (Thunb.). Blätter mit bis zum Grunde gefiederten Lappen	30—40	12,—		
		40—60	16,—		
		60—80	24,—		
L.St.	dissect. atropurpureum (Hort.). Laub tiefgeschlitzt, dunkelrot	30—40	12,—		
		40—60	16,—		
		60—80	24,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)					
B.L.	platanoides (L.). Spitzahorn. Bekanntster heimischer Straßen- und Parkbaum mit spitzlappigen Blättern	125—150 150—200 200—250 250—300 300—350	1,50 1,80 2,25 2,75 3,60	13,50 16,50 20,— 25,— 33,—	125,— 150,— 180,— 225,— 300,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	250—300 300—350 350—400	6,50 7,50 9,—		
	Einzelpflanzen ab 2 Grundtrieben mit Ballen	250—300 300—350	14,— 18,—		
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	5,— 6,— 7,25	45,— 55,— 66,—	400,— 500,— 600,—
	in extra weitem Stand verpflanzt	12—14 14—16 16—18	11,— 14,— 16,50		
V.	globosum (Nichols). Kugelahorn, bildet eine schöne, regelmäßige Kugelkrone. Alleebäume, Stammumfang	7—8 8—10 10—12 10—12 12—14 14—16	6,— 7,25 8,50 12,— 16,— 19,—	55,— 66,— 77,—	500,— 600,— 700,—
	in extra weitem Stand verpflanzt	12—14 14—16	16,— 19,—		
B.L.	reitenbachii (Nichols) (rubrum) (Herd), Austrieb rötlichbraun, Laub im Spätsommer schwärzlichrot	150—200 200—250 250—300	3,60 4,40 5,30	33,— 40,— 48,—	300,— 360,— 440,—
	Alleebäume, Stammumfang	7—8 8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,— 13,50	66,— 77,— 100,— 120,—	600,— 700,— 900,— 1100,—
B.L.	schwedleri (K. Koch), Austrieb blutrot, Laub später dunkelrot-grün, Blattstiele und Nerven rot bleibend	150—200 200—250 250—300	3,60 4,40 5,30	33,— 40,— 48,—	300,— 360,— 440,—
	Alleebäume, Stammumfang	7—8 8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,— 13,50	66,— 77,— 100,— 120,—	600,— 700,— 900,— 1100,—
B.	pseudoplatanus (L.), Bergahorn. Schöner heimischer Straßenbaum mit derben, rundlichen, fünflappigen Blättern	125—150 150—200 200—250 250—300	1,50 1,80 2,25 2,75	13,50 16,50 20,— 25,—	125,— 150,— 180,— 225,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	200—250 250—300 300—350	6,50 7,50 9,—		
	Einzelpflanzen ab 2 Grundtrieben mit Ballen	250—300 300—350	14,— 18,—		
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18	5,— 6,— 7,25 8,50 16,50	45,— 55,— 66,— 77,—	400,— 500,— 600,— 700,—
	in extra weitem Stand verpflanzt	12—14 14—16 16—18	11,— 14,— 16,50		
B.L.R.	sacharinum (L.) (A. dasycarpum) (Ehrh.) (A. eriscarpum) (Michx) Silberahorn. Hoher Baum mit malerisch überhängenden Zweigen und spitz gelappten, unterseits silbergrauen Blättern	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,80 2,25 2,75 3,60 4,40	16,50 20,— 25,— 33,— 40,—	150,— 180,— 225,— 300,— 360,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	150—200 200—250 250—300 300—350	4,— 5,— 6,— 7,50		
	Einzelpflanzen ab 3 Grundtrieben mit Ballen	150—200 200—250	5,— 6,—		
	Alleebäume, Stammumfang	7—8 8—10 10—12 12—14 14—16 16—18	6,— 7,25 8,50 11,— 16,— 25,—	55,— 66,— 77,— 100,—	500,— 600,— 700,— 900,—
	in extra weitem Stand verpflanzt	12—14 14—16 16—18	11,— 16,— 25,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)					
L.R.	<i>lutescens</i> (Pax), mit leuchtendgelbem Blattaustrieb und ebensolcher Herbstfärbung	150—200 200—250 250—300	3,60 4,40 5,30	33,— 40,— 48,—	300,— 360,— 440,—
E.R.	<i>wieri laciniatum</i> (Carr) (<i>wieri</i>) (Pax), Zweige hängend, Blätter tief gespalten, Lappen fein schmalzerschnitten. Die schönste der Formen	125—150 150—200 200—250	2,75 3,60 4,40	25,— 33,— 40,—	225,— 300,— 360,—
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	8,50 11,—	77,— 100,—	700,— 900,—
Aesculus (L.) Roßkastanie (Hippocastanaceae)					
B.	<i>carnea</i> (Hayne) (<i>A. rubicunda</i>) (Loisl)- <i>A. hippocastanum</i> × <i>pavia</i> . Rotblühende Roßkastanie, bildet rundliche Kronen	7—8 8—10 10—12 12—14 14—16	7,25 8,50 11,— 13,50 17,—	66,— 77,— 100,— 120,— 155,—	600,— 700,— 900,— 1100,— 1400,—
	Alleebäume, Stammumfang				
B.L.	<i>hippocastanum</i> (L.), gem. Roßkastanie. Bekannter schöner Park- und Alleebaum	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,50 1,80 2,25 2,75 3,60	13,50 16,50 20,— 25,— 33,—	125,— 150,— 180,— 225,— 300,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	200—250 250—300 300—350	8,— 9,50 11,—		
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	6,— 7,25 8,50 11,—	55,— 66,— 77,— 100,—	500,— 600,— 700,— 900,—
	in extra weitem Stand verpflanzt	14—16 16—18 18—20 20—24	16,50 22,— 30,— 38,—		
L.	<i>plena</i> (Lem) (<i>baummanii</i>) (S. Schn.), Blüten weiß gefüllt, die Krone bildet regelmäßige Pyramiden	8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,—	66,— 77,— 100,—	600,— 700,— 900,—
	Alleebäume, Stammumfang				
B.S.	<i>parviflora</i> (Walt) (<i>A. macrostachya</i>) (Mchx.) breiter, bis 4 m hoher Strauch, Blüten weißlich-rosa, in schmalen, 20—30 cm langen Rispen über den Blättern stehend, Blütezeit Juli-August	40—60 60—100	3,50 5,—		
	Einzelpflanzen ab 2 starken Trieben mit Ballen	60—100 100—125	7,— 10,—		
	<i>rubicunda</i> (Loisl.) siehe unter <i>carnea</i> (Hayne)				
Ailanthus (Desf.) Götterb. (Simarubaceae)					
B.R.	<i>altissima</i> (Swingle) (<i>A. glandulosa</i>) (Desf.) (<i>A. japonica</i>) (hort) (<i>A. procera</i>) (Salid.), Baum bis 25 m, Rinden glatt mit weißlichen Rissen, fein gewimperte Fiederblätter, 40—60 cm lang, sehr ziehend die hellbräunlichen Fruchtsände	100—125 125—150 150—200 150—200 200—250 250—300	1,20 1,50 1,75 4,— 5,— 7,—	11,— 13,50 16,—	100,— 120,— 140,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	150—200 200—250 250—300	4,— 5,— 7,—		
	Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	7,— 8,— 9,—		
Alnus (Gaertn.) Erle (Betulaceae)					
B.S.V.	<i>glutinosa</i> (Gaertn.) (<i>A. vulgaris</i>) (Hill.) Schwarzerle. Heimischer Baum, der auch auf feuchtem Boden wächst	125—150 150—200 200—250 250—300	1,— 1,25 1,50 1,90	9,— 11,— 13,50 17,—	80,— 100,— 125,— 150,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	200—250 250—300 300—350	3,50 4,50 6,—		
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	3,30 4,— 5,50	30,— 36,— 50,—	270,— 330,— 450,—

Alnus (Gaertn.) Erle (Betulaceae)

B.S.V. *incana* (Moench) Weißerle. Heimischer Baum, wächst auf trockenem Boden

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
100—150	1,—	9,—	80,—
150—200	1,25	11,—	100,—
200—250	1,50	13,50	125,—
250—300	1,90	17,—	150,—
200—250	3,50		
250—300	4,50		
300—350	6,—		
8—10	3,30	30,—	270,—
10—12	4,—	36,—	330,—
12—14	5,50	50,—	450,—

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig
mit Ballen

Alleebäume, Stammumfang

Amelanchier (Med.) Felsenbirne (Rosaceae)

B.F.L.R.S.V. *canadensis* (Med.), Blätter verkehrt eiförmig zugespitzt, bis 8 cm lang, scharf gesägt, unterseits graugrün, Herbstfärbung orange-scharlach, Blüten weiß in dichten, nickenden Trauben

40—60	1,20	11,—	100,—
60—80	1,50	13,50	120,—
80—125	1,75	16,—	140,—
100—125	6,—		
125—150	8,—		
150—200	12,—		
200—250	16,—		

Einzelpflanzen mit mehreren Grundtrieben, natürlich gewachsen mit Ballen

B.F.L.R.S.V. *oblongifolia* (Torr u. Gray) (Am. can. obovalis) (Sarg), aufrechter Strauch, Blätter länglich, fein gesägt, Blüten weiß, in kurzen, aufrechten Trauben

40—60	1,20	11,—	100,—
60—80	1,50	13,50	120,—
80—125	1,75	16,—	140,—
100—125	6,—		
125—150	8,—		
150—200	12,—		
200—250	16,—		

Einzelpflanzen mit mehreren Grundtrieben, natürlich gewachsen mit Ballen

Amorpha (L.) Bastardindigo (Legumino-ae)

B. *fruticosa* (L.), bis 4 m hoch werdender Strauch, bis 30 cm lange gefiederte Blätter, Blüten violett-blau, in 15 cm langen aufrechten Trauben

100—150	—,85	7,50	65,—
100—150	4,—		
150—200	5,50		

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen

Amygdalus (L.) siehe unter Prunus**Andromeda (L.) Lavendelheide (Er caecae)**

I.S. *floribunda* (Pursh) (Pieris floribunda) (Benth u. Hook), bis 2 m hoher, aufrecht wachsender Strauch, Blätter ei-elliptisch, 3—8 cm lang, kerbig gesägt, weiße Blüten in dichten, 5—10 cm langen Blütenrispen, Blütezeit April bis Mai

30—40	2,65	22,—	200,—
40—60	4,—	33,—	300,—
60—80	6,—	55,—	500,—
80—100	9,40		
100—125	14,—		
125—150	23,—		

mit Ballen

I.R.S. *japonica* (Thunb) (Pieris japonica) D. Don, breit wachsender Strauch, Blätter verkehrt eiförmig bis lanzettlich, kerbig gesägt, oben dunkelgrün glänzend, Blüten weiß in hängenden 6—12 cm langen Rispen, Blütezeit April bis Mai

30—40	3,—	25,—	220,—
40—60	4,50	37,—	330,—
60—80	7,30	61,—	550,—
80—100	10,50		
100—125	16,—		
125—150	25,—		

mit Ballen

Aralia (Araliaceae)

L. *chinensis mandschurica* (Rehd) (A. elata) (Seem), Blätter doppelt gefiedert, bis 1 m lang, Blütenrispen groß, gelblichweiß, Wuchs 3—4 m hoch, baumartig

60—80	2,20	20,—	
80—100	3,—	27,—	
100—125	4,—	36,—	
80—100	7,—		
100—125	9,—		
125—150	12,—		

Einzelpflanzen ab 2 Grundtrieben mit Ballen

Artemisia (L.) Beifuß (Compositae)

L. *abrotanum* (L.), Eberraute, Halbstrauch bis 1 m hoch, Blätter doppelt fiederspaltig, unten grauhaarig, Blütenköpfe gelb, zahlreich in reihenständigen Trauben

60—80	1,—	9,—	80,—
80—125	1,20	11,—	100,—

Arundinaria (Mchx.) Winterharter Bambus (Gramineae)

L. *murielae* (Gamble) (Sinarundinaria murielae, Kakai), Winterharter Bambus, in Japan und China beheimatete, bis 2 1/2 m hoch werdende Sorte mit zierlicher frischgrüner Belaubung

40—60	3,—		
60—80	4,—		
80—100	6,50		

mit Ballen

Aucuba (Thunb.) Aukube (Cornaceae)

S. *japonica* (Thunb), immergrüner bis 5 m hoher Strauch, Blätter lederartig, ei-elliptisch, bis 20 cm lang, beiderseits glänzendgrün

40—60	6,—		
-------	-----	--	--

S. *variegata* (Dombrain), ähnlich der vorigen Art, jedoch mit gelbgefleckten Blättern

40—60	6,—		
-------	-----	--	--

Azalea (L.) Azalea (Ericaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
St.	japonica (Gray) (Rhododendron jap.) (Suring), japanische Azalee, winterhart, niedrig bleibend in verschiedenen Farben und Sorten,				
	in kleinblumigen Sorten mit Ballen				
	Amoena, lilasrot gefüllt	15—20	3,30	30,—	270,—
	Christmas Cheer, rosa	20—25	4,—	36,—	330,—
	Favorite, rosarot	25—30	5,50	50,—	450,—
	Hatsugiri, purpurrosa	30—40	7,—	64,—	580,—
	Hinodegiri, schön rot	40—50	9,50		
	in großblumigen Sorten mit Ballen				
	Orange Beauty, orange				
	Alice, lachsrot	20—25	3,30	30,—	270,—
	Betty, rosa	25—30	4,—	36,—	330,—
	Fedora, dunkelrosa	30—40	5,50	50,—	450,—
	Kathleen, rosarot	40—50	6,60	60,—	550,—
	Kaempferi, orangerot	50—60	9,20	83,—	750,—
	Ledifolia alba, weiß				
	Malvatica, lilasrosa				
	Zampa, hell orangerot				
	mollis (Bl.) (Rhododendron molle) (Don) (Rh. sinense) (Rhododendron japonicum) (Suring), blüht reich im Mai-Juni in gelben, orangen und roten Tönen mit Ballen	30—40	3,60	33,—	300,—
		40—50	5,—	45,—	400,—
		50—60	5,75	52,—	470,—
		60—70	7,30	66,—	600,—
		70—80	10,—	90,—	800,—
	mollis Hybriden in veredelten Sorten mit Ballen (Rhododendron japonicum Hybriden)				
	Alphonse Lavallee, orangerot				
	Comte de Gomer, rosa				
	Dr. M. Oostheck, tief orangegelb	30—40	5,30	48,—	440,—
	Dr. Reichenbach, lachsfarbig	40—50	6,60	60,—	540,—
	F. van der Bom, orangerot	50—60	8,80	80,—	720,—
	Hortulanus Witte, orangegelb	60—70	11,—	100,—	900,—
	Hugo Koster, orangerot				
	Kosters Brilliant Red, rot				
	pontica (L.) (Rhododendron luteum) (Sweet) (Rh. flamm.) (G. Don). Pontische Azalee. Blüten trichterförmig, gelb bis orange-goldgelb in großen, lockeren Dolden, stark duftend mit Ballen	30—40	3,30	30,—	270,—
		40—50	4,—	36,—	330,—
		50—60	5,—	45,—	400,—
		60—70	6,60	60,—	540,—
		70—80	9,—	81,—	740,—
	pontica Hybriden in veredelten Sorten mit Ballen				
	Bouquet de Flora, lachsrosa				
	Coccinea speciosa, orangerot				
	Daviesii, weiß	30—40	5,30	48,—	440,—
	Fanny (Syn. Pucella), lilasrosa	40—50	6,60	60,—	540,—
	Gloria Mundi, orangerot	50—60	8,80	80,—	720,—
	Ignac Nova, hellkarmisrot	60—70	11,—	100,—	900,—
	Narcissiflora, schwefelgelb				
	Pallas, rosarot				
	Sang de Gentbrugge, karmesinrot				
	rustica flore pleno Hybr. (Rhododendron mixtum) i. Sort.				
	Aida, purpurrosa				
	Il Tasso, scharlachrot mit Ballen				
	Norma, rosarot	30—40	6,70	60,—	540,—
	Phébe, schwefelgelb	40—50	7,50	68,—	610,—
	Phidias. nankingorange				
	Vuykiana (Hort.) Kreuzung von A. japonica und A. mollis, sehr reichblühend, großblumig .. mit Ballen				
	Beethoven, lila	20—25	3,30	30,—	270,—
	Johann. Strauß, lachsrosa	25—30	4,—	36,—	330,—
	Joh. Seb. Bach, purpurviolett	30—40	5,50	50,—	450,—
	Mozart, rosa mit lila	40—50	6,60	60,—	540,—
	Schubert, rosa	50—60	9,20	83,—	750,—
	Palestrina, elfenbeinweiß				
	Berberis (L.) Berberitze, Sauerdorn (Berberidaceae)				
e.I.S.St.	buxifolia nana (Moniller) (B. ducloux nana) (Hort.), Blätter verkehrt ei-elliptisch, Blüten orangegelb, Wuchs niedrig, dicht, rundlich, viel zu Einfassungen verwendet	15—20	—,65	5,50	50,—
	Einfassungspflanzen per lfd. m	20—25	—,85	7,50	65,—
			1,20	10,—	90,—

Berberis (L.) Berberitze, Sauerdorn (Berberidaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
e.I.S.St.	<i>candidula</i> (C. Schn.), immergrüner Strauch, klein bleibend, Blätter elliptisch mit wenigen dornigen Zähnen, oben dunkelgrün, unterseits weiße Blüten goldgelb, einzeln mit Ballen	15—20 20—25 25—30 30—40 40—60	2,50 3,— 3,60 4,80 5,40	20,— 25,— 30,— 40,— 45,—	180,— 220,— 270,— 360,— 400,—
	<i>darwinii</i> (Hook.) immergrüner Strauch, bis 3 m hoch werdend, junge Zweige braunbehaart, stachelig, dünn 3—7-teilig, Blätter verkehrt eiförmig, 1—2 cm lang, an der Spitze mit 3 Dornen, oben glänzend dunkelgrün, unten heller, Blätter goldgelb, etwas gerötet, in hängenden 4—10 cm langen Trauben, Frucht eiförmig, 8 mm lang, schwarzrot mit langen Griffeln mit Ballen	25—30 30—40 40—60	3,60 4,80 5,40	30,— 40,— 45,—	270,— 360,— 400,—
B.I.S.St. W.	<i>gagnepainii</i> (C. Schn.), bis 1,5 m hoch werdender immergrüner Strauch, Zweige leicht warzig, gelbgrau, Blätter schmal lanzettlich, leicht gewellt, leicht dornig, gesägt, Rand etwas umgerollt, ober matt dunkelgrün, unt. heller, Blüten goldgelb, zu 3—10 gebüscht, Frucht eiförmig bis 1 cm lang, blauschwarz bereift, mit Ballen	20—25 25—30 30—40 40—50 50—60 60—80	2,50 3,— 3,60 4,80 6,— 8,—	22,— 25,— 30,— 40,— 50,— 66,—	200,— 220,— 270,— 360,— 450,—
B.I.R.S.St. W.	<i>gagnepainii hybrida</i> (Hort.) Blätter etwas breiter und kürzer wie die Stammart, ein Bastard zwischen <i>Berberis gagnepainii</i> und <i>verruculosa</i> , ... mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60 60—80	3,— 3,60 4,80 6,— 8,—	25,— 30,— 40,— 50,— 66,—	220,— 270,— 360,— 450,—
I.B.St.	<i>hookeri</i> (Lem.) (B. Jamesonii) (hort.), immergr. Strauch Blätter elliptisch lanzettlich, 3—7 cm lang, buchtig dornig gesägt, oben dunkelgrün, unten weiß, Nerven hervortretend, Blüten gelb, 3—6 gebüscht, Frucht länglich, 1 cm lang, schwarzrot mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60 60—80 80—100	3,— 3,60 4,80 6,— 8,— 13,50	25,— 30,— 40,— 50,— 66,— 110,—	220,— 270,— 360,— 450,—
S.I.St.	<i>julianae</i> (Schneid.), immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, graugelbe Zweige, etwas kantig, Stacheln dreiteilig, 1—3 cm lang, Blätter 3—6 cm lang, lanzettlich, dornig gesägt, oberseits dunkelgrün, lederartig, Blüten bis zu 15 Stück in Büscheln, gelb, außen rötlich. Frucht bis 8 mm lang, bläulichschwarz ber., mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60 60—80	3,— 3,60 4,80 6,— 8,—	25,— 30,— 40,— 50,— 66,—	220,— 270,— 360,— 450,—
B.I.S.St.	<i>linearifolia</i> (Phil.), immergrüner Strauch, 1—2 m hoch werdend, Stacheln dreiteilig, 1—1,5 cm lang, Blätter 3—5 cm, linearisch, dornig zugespitzt, Rand eingerollt, oben dunkelgrün, unten bläulich, Blüten fast 2 cm, innen tief orange, außen mehr gerötet, Frucht 1,5 cm lang, schwarz bereift mit Ballen	30—40 40—60 60—80	5,— 6,— 8,—	45,— 54,— 66,—	
B.I.S.St.	<i>lologensis</i> (Sandw.) (B. darwinii × <i>linearifolia</i>), immergrüner Strauch mit etwas breiteren Blättern als <i>linearifolia</i> . Blüten orange mit Ballen	30—40 40—60 60—80	5,— 6,— 8,—	45,— 54,— 66,—	
B.I.S.St.W.	<i>stenophylla</i> (Ldl.) (B. darwinii × <i>empetrifolia</i>), immergrüner bis 3 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, Blätter schmal lanzettlich bis 3 cm lang, stachelspitz, Rand umgerollt, oben dunkelgrün, unten weißlich. Blüten goldgelb, Frucht erbsengroß, blauschwarz bereift mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100	3,60 4,50 5,40 7,25	30,— 37,— 45,— 60,—	270,— 330,— 400,— 550,—
B.F.H.L.	<i>thunbergii</i> (DC), bis 1,5 m hoch werdender, dichtzweigiger Strauch, Blätter verkehrt eiförmig, spatelig bis länglich, von frischgrüner, unten bläulicher Farbe, im Herbst sich scharlachrot färbend. Blüten gelb in kleinen Doldenbüscheln, Frucht ca. 1 cm lang, glänzend hochrot mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	—,80 1,— 1,20 5,— 6,50 9,—	7,— 9,— 11,—	65,— 80,— 100,—
B.F.H.L.	<i>atropurpurea</i> (Chenault). Blätter tief karminrot, sehr wertvolle Heckenpflanze mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	—,80 1,— 1,35 5,— 6,50 9,—	7,— 9,— 11,—	65,— 80,— 100,—

Berberis (L.) Berberitze, Sauerdorn (Berberidaceae)

B.e.H.L.St. *nana*, bis etwa 30 cm hoch werdende, niedrigere Hek-
kenpflanze, auch als Einzelpflanze im Steingarten
zierend wirkend

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
10-15	—,85	7,50	65,—
15-20	1,—	9,—	81,—
20-25	1,20	11,—	100,—

B.I.S.St.W. *verruculosa* (Hemsl. et Wils), klein bleibender immergrü-
ner Strauch, Zweige dicht mit kleinen Warzen be-
setzt, Blätter ei-elliptisch, bis 2,5 cm lang, dornig ge-
zähnt, Rand umgerollt, oberseits glänzend dunkelgrün,
unterseits blaugrün, Blüten goldgelb, Frucht länglich,
blauschwarz bereift

20-25	2,40	20,—	180,—
25-30	3,25	27,—	240,—
30-40	4,30	36,—	320,—
40-50	4,80	40,—	360,—
50-60	6,—	50,—	450,—
60-80	8,—	66,—	600,—

H.St. *wilsonae* (Hemsl. u. Wils), halbbimmergrüner, dichtbuschi-
ger, niedriger Strauch, Blätter lanzettlich bis 3 cm
lang, stachelspitz, graugrün, bis in den Winter haf-
tend, zuletzt prächtig rot. Blüten klein, hellgelb,
Frucht tief karmin, leicht bereift

30-40	1,—	9,—	80,—
40-60	1,20	11,—	100,—
60-80	1,50	13,50	120,—

Einzelpflanzen mit Ballen

80-100	3,—		
100-125	4,—		
125-150	6,—		

H.St. *subcaulata* (CS.), Blätter unterseits grauer als bei
B. *Wilsonae*, Früchte lachsfarbig, gelbrot, bis 1 m
hoch werdend

30-40	1,—	9,—	80,—
40-60	1,20	11,—	100,—
60-80	1,50	13,50	120,—

Betula (L.) Birke (Betulaceae)

St. *nana* (L.), nördliche Zwergbirke, bis 1 m hoch werdend,
mit kleinen rundlichen Blättern

20-30	1,90	17,—	
30-40	2,20	20,—	
40-60	3,—	26,—	

L.R. *pubescens* (Erh) (B. *alba*) (L.), heimische, gemeine Moor-
birke
Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung
mit feuchtem Moos verpackt geliefert.
Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisaufschlag
von 25 %.

125-150	1,50	13,50	125,—
150-200	1,80	16,50	150,—
200-250	2,25	20,—	180,—
250-300	2,75	25,—	225,—
300-350	3,80	35,—	320,—
350-400	4,80	42,—	380,—

Alleebäume, Stammumfang
mit Ballen 25 % Aufschlag

7-8	4,—	35,—	300,—
8-10	5,—	45,—	400,—
10-12	6,—	55,—	500,—
12-14	7,25	66,—	600,—

L.R. *pubescens atropurpurea* (hort.), Blutbirke, Blätter dun-
kelrot

125-150	4,50	40,—	
150-200	5,—	45,—	
200-250	6,75	60,—	
250-300	9,—	80,—	

L.R. *verrucosa* (Ehrh.) (B. *pendula*) (Rth.), bekannte heimische
Weiß- oder Maibirke
Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung
mit feuchtem Moos verpackt geliefert.
Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisaufschlag
von 25 %.

125-150	1,50	13,50	125,—
150-200	1,80	16,50	150,—
200-250	2,25	20,—	180,—
250-300	2,75	25,—	225,—
300-350	3,80	35,—	320,—
350-400	4,80	42,—	380,—

Alleebäume, Stammumfang
mit Ballen 25 % Aufschlag

7-8	4,—	35,—	300,—
8-10	5,—	45,—	400,—
10-12	6,—	55,—	500,—
12-14	7,25	66,—	600,—

Natürlich gewachsene, malerische, besonders breite
Büsche, aus extra weitem Stand

mit Ballen

mit 1 Grundstamm

1 1

1 1

1 1

mit 2 Grundstämmen

2 2

2 2

2 2

2 2

3 3

3 3

3 3

3 3

4 4

4 4

4 4

4 4

laciniata (Wahlb.) (B. *alba laciniata*) (Späth.), Blätter
tief gelappt mit unregelmäßig gesägten Zähnen
mit Ballen

250-300	5,—		
300-350	8,—		
350-400	10,—		
400-450	14,—		
250-300	8,—		
300-350	12,50		
350-400	16,—		
400-450	22,—		
450-500	36,—		
250-300	16,—		
300-350	22,50		
350-400	36,—		
400-450	50,—		
450-500	66,50		
250-300	22,50		
300-350	36,—		
350-400	50,—		
400-450	66,50		
450-500	88,—		

150-200	5,—	45,—	
200-250	6,75	60,—	
250-300	9,—	80,—	

Betula (L.) Birke (Betulaceae)

- L.Tr.R. *pendula youngii* (C. Schn.) (B. pend. eleg.) (Winkel)
(B. alba pend. Youngii) (Th. Moore), bekannte Trauer-
birke, Zweige senkrecht herabhängend . . . mit Ballen

Alleebäume, Stammumfang
mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
150—200	5,—	45,—	
200—250	6,75	60,—	
250—300	9,—	80,—	
300—350	10,—	90,—	
7—8	10,—	90,—	
8—10	12,—	108,—	
10—12	14,—	125,—	

- L.Tr.R. *tristis* (Hort), Trauerbirke, feinzweigige Hängeform mit
aufreichtwachsendem Spitzentrieb mit Ballen

Alleebäume, Stammumfang
mit Ballen

150—200	5,—	45,—	
200—250	6,75	60,—	
250—300	9,—	80,—	
300—350	10,—	90,—	
7—8	10,—	90,—	
8—10	12,—	108,—	
10—12	14,—	125,—	

Bruckenthalia (Reichenb.) Ährenheide (Ericaceae)

- J.St. *spiculifolia* (Reichenb.) (*Erica spiculifolia*), niedriger, im-
mergrüner Strauch, Zweige dünn, sehr dicht beblättert,
Blätter gegenständig, 3—5 mm lang, schwach behaart.
Blüten hellrosa in dichten 2—3 cm langen Ähren im
Juni-Juli Durchmesser in cm

8—12	—,75	6,75	60,—
------	------	------	------

Buddleia (L.) Sommerflieder (Loganiaceae)

- R. *alternifolia* (Maxim.), bis 2 m hoher, winterharter
Strauch, mit lebhaft lavendelpurpurroten Blüten . . .
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . . .
mit Ballen

50—80	2,25	20,—	180,—
80—100	5,—		
100—125	6,—		

- R.B.W. *dauidii* (Franch.) (B. *variabilis*) (Hemst.), Blätter ei-lan-
zettlich, bis 25 cm lang, zugespitzt, dicht gesägt, oben
dunkelgrün, unten weißfilzig, Blüten lila in aufrechten
bis 25 cm langen Ähren

60—80	—,85	7,50	65,—
80—125	1,—	9,—	80,—

- B.R.W. *Empire Blue* (Hort.) eine besonders intensiv blau ge-
färbte, sehr wertvolle Sorte

60—80	1,75	16,—	140,—
80—100	2,25	20,—	180,—

- B.R.W. *Fascination* (Hort.) lilarsa, mit bis 60 cm langen
Blütenähren

60—80	1,75	16,—	140,—
80—100	2,25	20,—	180,—

- R.B.W. *Ile de France* (Nonin), Blüten purpurviolett, bis 40 cm
lange Ähren

60—80	1,50	13,50	120,—
80—100	2,25	20,—	180,—

- B.R.W. *Royal Red* (Hort.), Blüte tief purpurrot, auf langen
Ähren, sehr reichblühend

60—80	1,75	16,—	140,—
80—125	2,25	20,—	180,—

- B.R.W. *White Bouquet* (Hort.), reinweiße, lange Blütenrispen
80—125

60—80	1,75	16,—	140,—
80—125	2,25	20,—	180,—

Buxus (L.) Buchsbaum (Buxaceae)

- e.R. *suffruticosa* (L.), Einfassungsbuchsbaum, wird in Nor-
malbunden von 5 lfd. Metern geliefert, deren jedes
etwa 30 cm oberen Durchmesser hat.
verpfl.

per lfd. mtr.	1 m	10 m	100 m	1000 m
—,70	6,—	48,—	440,—	
—,90	8,—	74,—	700,—	

- B.e.H.I.R.S.V. *sempervirens arborescens* (L.), mehrmalig verschulte
Heckenpflanzen ohne Ballen

Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung
in Moos verpackt geliefert.

Heckenpflanzen mit Ballen, geschnitten

Höhe in cm	1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM	1000 Stk. DM
10—15	—,45	4,—	35,—	300,—
15—20	—,55	4,50	40,—	360,—
20—25	—,70	5,50	50,—	450,—
25—30	—,80	6,75	60,—	540,—
30—40	1,—	9,—	80,—	720,—
Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
20—25	1,—	8,50	75,—	
25—30	1,20	10,—	90,—	
30—40	1,60	13,50	120,—	
40—50	2,40	20,—	180,—	
50—60	4,—	33,—	300,—	
60—70	6,50	55,—	500,—	

Buxus (L.) Buchsbaum (Buxaceae)

Pyramiden mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—59	4,40	36,—	330,—
50—60	6,—	50,—	450,—
60—70	7,70	64,—	600,—
70—80	9,60	80,—	720,—
80—90	11,—	90,—	
90—100	13,50	110,—	
100—125	16,—		

Kugeln und Halbkugeln mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
20—25	3,40	27,50	250,—
25—30	4,10	33,—	300,—
30—35	6,—	48,—	440,—
35—40	8,75	70,—	630,—
40—50	12,—	94,—	
50—60	15,—	120,—	

Büsche, breite, natürlich gewachsene Pflanzen, teilweise breiter als hoch mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	7,20	65,—	590,—
60—80	9,—	77,—	700,—
80—100	12,—	100,—	900,—
100—125	20,—	160,—	

sempervirens aurea (Loud.) (*japonica aurea*) (hort.),
Blätter goldgelb, wird 2 m hoch, liebt Halbschatten,
Höhe oder Breite mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
25—30	2,80		
30—40	3,75		
40—50	4,50		

Callicarpa, Schönfrucht (Verbenaceae)

F. *bodinieri giraldui*, bis 2 m hoch werdender Strauch mit
lilarosa Blüten und in achselständigen Trugdol-
den, kleine lila Perlfrucht im Herbst

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	3,—		
60—80	4,—		

Calluna (Salisb.) Besenheide (Ericaceae)

B.e.I.St. *vulgaris* (Hull) (*Erica vulgaris* (L.), gemeine Besen-
heide, Blüten rosa

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
—,35	3,—	25,—	200,—

B.e.I.St. *alba* (Br. Bl.), weißblühend

B.e.I.St. *alportii* (Beij), stärker wachsend, Blüten karmin

B.e.I.St. *aurea* (Beij), Blüte rosa, Blätter goldgelb

B.e.I.St. C. W. Nix (M. + B.), leuchtend dunkelrot, früh blühend

B.e.I.St. *elegantissima* (Beij), niedrigblühend, rotblühend

B.e.I.St. *flore pleno* (Hort.) (C. *multiplex*) (Sweet), niedr-
gbleibend, Blüte gefüllt, rosa

B.e.I.St. *Hammondii* (Beij), stärker wachsend, Blüte weiß, spät-
blühend

B.e.I.St. H. E. Beale (M. + B.), besonders lange Blütenrispen
mit dicht gefüllten rosaroten Blüten, spätblühend

B.e.I.St. *stricta alba*, straff aufrecht wachsend, Blüte reinweiß

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
8—12	—,80	6,60	60,—
über 12	1,10	9,—	80,—

Calycanthus (L.) Gewürzstrauch (Calycanthaceae)

R. *floridus* (L.), bis 2 m hoch werdender Strauch, Blätter
ei-elliptisch bis 10 cm lang, spitz, oben lebhaft grün,
unten graugrün, dicht behaart, Blüten dunkelrot-
braun, stark erdbeerartig duftend mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	3,—		
60—80	4,—		
80—100	9,—		
100—125	15,—		

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, aus extra weitem
Stand mit Ballen

Caragana (Lam.) Erbsenstrauch (Leguminosae)

H.V. *aborescens* (Lam.), baumartiger bis 6 m hoher Strauch,
gefiederte Blätter, Blüten gelb, geeignet für hohe Hek-
ken und als Vogelschutzgehölz

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
80—125	—,85	7,50	65,—
100—150	6,—		
150—200	8,—		

Einzelpflanzen natürlich gewachsen mit Ballen

Carpinus (L.) Hainbuche, Weißbuche (Betulaceae)

L.H.R.S. *betulus* (L.), gemeine Hainbuche, mehrmals verpflanzt,
regelmäßig geschnittene Pyramiden an Stäben gezogen,
I a Qualität

Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung
in feuchtem Moos verpackt.

Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisauflschlag
von 25 %

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
60—80	1,—	9,—	80,—
80—100	1,25	11,—	100,—
100—125	1,60	14,50	130,—
125—150	2,25	20,—	180,—
150—175	3,—	27,—	240,—
175—200	3,50	33,—	300,—
200—225	4,50	40,—	360,—
225—250	5,50	50,—	450,—

Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert
werden. Die Preise derselben liegen 20 % niedriger.

Carpinus (L.) Hainbuche Weißbuche (Betulaceae)

3—4jähr. verpfl. für Hecken gezogen

Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
40—60	—,35	3,—	27,—	240,—
60—80	—,45	4,—	36,—	330,—
80—100	—,55	5,—	44,—	400,—
100—125	—,65	6,—	55,—	470,—

3mal verschulte Ballenware aus extra weitem Stand
mit besonders vollkommener Garnierung, mehrfach
geschnitten

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
150—175	5,—	45,—	490,—
175—200	6,—	50,—	450,—
200—225	7,—	55,—	500,—
225—250	8,50	66,—	600,—
250—275	10,—	77,—	700,—
275—300	11,—	88,—	800,—

Alleebäume, Stammumfang
in extra weitem Stand verpflanzt, mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
7—8	9,—		
8—10	12,—		
10—12	15,—		
12—14	20,—		

ungeschnittene, natürlich gewachsene, mehrmals ver-
pflanzte Büsche aus weitem Stand

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
80—100	1,25	11,—	100,—
100—125	1,50	13,50	125,—
125—150	1,80	16,50	150,—
150—200	2,25	20,—	180,—
200—250	2,75	25,—	225,—

Einzelpflanzen, malerisch, natürlich gewachsen aus
extra weitem Stand, breitbuschig verzweigt
mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
200—250	10,—		
250—300	15,—		
300—350	25,—		
350—400	38,—		
400—500	45,—		
500—600	60,—		
600—700	80,—		

Einzelpflanzen ab 2 Grundtrieben

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
200—250	35,—		
250—300	40,—		
300—350	50,—		
350—400	60,—		
400—500	70,—		
500—600	80,—		
600—700	95,—		

Castanea (Mill.) Edelkastanie (Fagaceae)B.R.F. sativa (Mill.) (C. vesca) (Gaertn.), eßbare Edelkastanie,
Blätter länglich lanzettlich bis 20 cm lang, Oberseite
sattgrün, glänzend, Frucht dunkelbraun, wohl-
schmeckend

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
100—125	2,25	20,—	180,—
125—150	2,75	25,—	225,—
150—200	3,60	33,—	300,—
200—250	4,40	40,—	360,—

Hochstämme, Stammumfang

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
8—10	8,—		
10—12	10,—		
12—14	13,50		

Catalpa (L.) Trompetenbaum (Bignoniaceae)B.R. bignonioides (Walt.) (C. syriaca), (C. cordifolia) (Mill.), bis 15 m hoher, breitkroniger Baum, Blätter
bis 30 cm lang, blüht im Juni-Juli mit bis 25 cm langen,
weißlichen Blütenrispen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
80—100	1,80	16,50	150,—
100—125	2,25	20,—	180,—
125—150	2,75	25,—	225,—
150—200	3,60	33,—	300,—
200—250	4,40	40,—	360,—

Hochstämme, Stammumfang

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
8—10	8,50	77,—	700,—
10—12	11,—	100,—	900,—
12—14	13,50	120,—	1100,—

Ceanothus (L.) Säckelblume (Rhamnaceae)B.R.W. americanus (L.), bis 1 m hoher stark aufreichtwachsen-
der Strauch, Blätter eiförmig, bis 10 cm lang, spitz,
fein gesägt, oben leuchtgrün, unten etwas behaart, Blü-
ten weiß in großen zusammengesetzten Rispen ...
Hybriden in Sorten, wie mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	3,—	25,—	
40—60	5,—	45,—	

Coelestis, himmelblau

Gloire de Versailles, (Christen), dunkelblau, Wuchs

Henri Desfossé, dunkelblau

Marie Simon, (Sim.-Louis), lilarosa

Topaze, (Lem.) zart indigoblau

Cercidiphyllum Judasbaumblatt (Cercidiphyllaceae)
(S. et. Z.)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
L.V.	japonicum (S. et. Z.) in Japan beheimateter, laubabwerfender Baum mit breitpyramidaler Krone; im Austrieb rotbraun, schöne Herbstfärbung	60—90	2,25	20,—	180,—
		80—100	2,80	25,—	225,—
		100—125	3,60	33,—	309,—
		100—125	7,—		
		125—150	8,50		
	Einzelpflanzen aus extra weitem Stand .. mit Ballen	150—175	10,—		

Cercis (L.) Judasbaum — (Leguminosae)

B.L.W.	siliquastrum (L.) Ein in Asien bis 8 m hoher sommergrüner, reichverästelter Baum, mit purpurrosa Schmetterlingsblüten bei Laubausbruch am alten Holz	40—60	3,—	26,60	240,—
--------	--	-------	-----	-------	-------

Chaenomeles (Ldl.) Scheinquitte (Rosaceae)

B.F.H.R. St.V.	japonica (Ldl.) (C. Maulei) (C. Schn.) (Cydonia Maulei) (T. Morel), bis 1 m hoher Strauch. Zweige dornig. Blätter breit-eiförmig stumpf, bis 4 cm lang, grob kernig gesägt, Blüten ziegelrot, 2—4 zusammenstehend, Frucht rundlich, 3—4 cm dick, gelblich-grün	40—50	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen mit Ballen	60—80	3,50		
		80—100	5,—		
B.F.H.R. St.V.	langenaria (Koidz) (Cydonia japonica) (Pers.), bis 2 m hoher Strauch, Zweige dornig, Blätter eilänglich spitz, scharf gesägt, Blüten scharlachrot, 3—4 cm breit in kleinen Büscheln	50—70	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen mit Ballen	60—80	3,50		
		80—100	5,—		
B.F.H.R. St.V.	sanguinea , Hybriden in Sorten wie: Andenken an Karl Ramecke, leuchtend zinnoberrot Boule de Feu, scharlachrot Crimson and Gold, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen moerlosii, hellrosa nivalis, reinweiß rosea plena, lachsrosa gefüllt simonii, dunkel samtrot, Zwergform umbilicata, leuchtend rosarot, starkwachsend.				
	mit Ballen	40—50	3,—	27,—	
		60—80	4,—	36,—	

Chionanthus (L.) Schneeflockenbaum, Schneeblume (Oleaceae)

R.	virginica (L.) großer, bis 3 m hoher, in Nordamerika beheimateter, spät austreibender Strauch mit weißen, überhängenden, lockeren, 20 cm langen Blütenrispen im Juni	30—40	4,50		
	mit Ballen	40—60	6,—		
		60—80	8,—		

Clethra (L.) Scheineller (Clethraceae)

L.R.S.	alnifolia (L.), Strauch bis 3 m hoch, Blätter verkehrt eilänglich kurz zugespitzt, scharf gesägt, Blüten weiß, duftend, in aufrechten Traubenrispen	40—60	3,—	27,—	
		60—90	4,—	36,—	
		80—100	5,—		
		100—125	7,—		

Colutea (L.) Blasenstrauch (Leguminosae)

B.R.F.V.	arborescens (L.), bis 4 m hoher Strauch, Fiederblätter, oben frischgrün, unten heller, Blüten gelb zu 6—8 in Trauben	100—125	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—150	5,—		
	mit Ballen	150—200	6,—		

Cornus (L.) Hartriegel (Cornaceae)

F.L.R.S.V.	alba (L.) (C. tatarica) (Mill.), bis zu 3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Zweige braunrot, Blätter eiliptisch, spitz, oben lebhaft grün, unten bläulich, Blüten gelblich-weiß in Trugdolden, Frucht schmutzig weiß bis blau	80—125	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—150	5,—		
	mit Ballen	150—200	7,—		

L.	alba argenteo-marginata (Rehd.) (C. alba elegantissima var.) (Hort.), Blätter weißrandig, sich im Herbst karminrot färbend	80—100	1,75	16,—	140,—
----	---	--------	------	------	-------

Cornus (L.) Hartriegel (Cornaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.L.	<i>florida</i> (L.) Blumenhartriegel, breitbuschiger, bis 5 m hoher Einzelstrauch, mit leuchtendroter bis violetter Herbstfärbung und weißen Brakteen im Mai-Juni, scharlachrote Früchte im August-September mit Ballen	40-60 60-80 80-100 80-100 100-125	4,50 5,50 8,— 13,— 16,—	40,— 50,— 72,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
L.	<i>gouchaultii</i> (Rehd.), stark wachsd., Blätter gelb gerandet	60-100	1,50	13,50	120,—
L.S.V.	<i>kesselringii</i> (Rehd.) (C. <i>kesselringii</i>) (E. Wolf), Zweige tief schwarzbraun, Blätter im Austrieb dunkelbraun, später bräunlich-grün	60-80 100-150 150-200	1,20 6,— 8,—	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
F.L.	<i>kousa</i> (Bueg.) bis 7 m hoher, in Japan beheimateter Strauch mit weißen Blüten im Juni und scharlachroter Herbstfärbung	40-60 60-80 80-100 100-125	4,50 5,50 13,— 16,—	40,— 50,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
B.F.H.R.S.V.mas. (L.)	Kornelkirsche. Junge Triebe grünlich behaart, Blätter ei-elliptisch, spitz, bis 10 cm lang, Blüten bereits im Februar, goldgelb in kleinen Dolden, Frucht rot, etwa 1,5 cm lang, Ekbar, regelmäßig geschnittene, mehrmals verpflanzte, an Stäben gezogene Büsche und Heckenpflanzen	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	1,25 1,70 2,— 2,75 3,60 4,80	11,— 15,50 18,— 25,— 33,— 44,—	100,— 140,— 160,— 225,— 300,— 400,—
	mehrmals verpflanzte, breite, ungeschnittene, locker gewachsene Büsche	60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	2,— 2,75 3,60 4,80 6,—	18,— 25,— 33,— 44,— 55,—	160,— 225,— 300,— 400,— 500,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	125-150 150-175 175-200	9,— 12,— 16,—		
F.H.R.S.V.	<i>sanguinea</i> (L.), Strauch bis 4 m hoch, Zweige bräunlich-grün, sonnenseitig gerötet, Blätter breit elliptisch, zugespitzt, bis 8 cm lang, unten heller, Blüten weißlich in behaarten dichten Trugdolden, Frucht schwarz	60-80 80-100 80-100 100-150	—,80 1,— 5,— 6,—	7,— 9,—	60,— 80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
F.R.S.V.	<i>sibirica</i> (Lodd.) (C. <i>tatarica sibirica</i>) (Koehe), Zweige leuchtend korallenrot	60-80 80-100 100-150	1,50 6,— 7,—	13,50	120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
	<i>spaehtii</i> (Wittm.), Blätter im Austrieb bronze, später breit goldgelb gerandet, teils ganz goldgelb	60-80 80-100 100-150	1,50 6,— 7,—	13,50	120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
	<i>stolonifera flaviramea</i> (Rehd.), Zweige mit hellgelber Rinde	60-80 80-100 100-150	1,20 5,— 6,—	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Corylopsis (S. & Z.) Scheinhasel (Hamamelidaceae)

F.St.S.W.	<i>pauciflora</i> (S. u. Z.), bis 150 cm hoher, in Japan beheimateter, mit primelgelben Blütenähren im Mai-April, schöne Herbstfärbung	40-60 60-70	5,— 8,50	45,—	
	mit Ballen				

Corylus (L.) Haselnuß (Betulaceae)

B.H.R.S.V.	<i>avellana</i> (L.), bekannter heimischer Waldhasel, guter Schattenstrauch	60-80 80-100 100-125	1,20 1,60 1,75	11,— 14,50 16,—	100,— 130,— 150,—
	<i>aurea</i> (C. Schn.) goldgelb belaubt, schwachwachsend	40-60 60-80	2,25 2,75	20,— 25,—	180,— 225,—
	<i>columna</i> , (L.) Baumhasel, in Osteuropa beheimateter, bis 20 m hoch werdender Baum mit korkiger, grauweißer Borke und großen dunkelgrünen Blättern	100-125 125-150 150-200 8-10	2,25 2,75 3,60 12,—	20,— 25,— 33,—	180,— 225,— 300,—
	Hochstamm, Stammumfang				
B.H.L.S.	<i>maxima purpurea</i> (Rehd.), Blatnuß. Mittelhoher Strauch, Blätter dunkelpurpur, Frucht rot, auch für Halbschatten geeignet	60-80	2,25	20,—	180,—

Cotinus (Adans.) Perückenstrauch (Anacardiaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F. cogggyria (Scop.) (Rhus cotinus) (L.), buschiger bis 5 m hoher, sehr schöner Strauch, Blätter wechselständig, verkehrt eiförmig bis 8 cm lang, Blüten klein in 15–20 cm langen perückenähnlichen Rispen mit rötlich oder grünlich behaarten Fruchtsielen .. mit Ballen	40–60 60–80	2,— 2,50	18,— 22,50	
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	80–100 100–125 125–150	5,— 6,50 8,—		
F.L. rubrifolia (Spaeth) (Rhus cotinus fol. purpurea, Hort.) sehr schöne Form mit roter Färbung und tiefroten Blütenenden .. mit Ballen	40–60 60–100	4,— 5,—	36,— 45,—	
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	80–100 100–125 125–150	7,— 9,— 16,—		

Cotoneaster (Med.) Zwergmispel (Rosaceae)

F.B.H.R.V. acutifolia (Turcz.) (C. pekinensis) (Zbl), bis 3 m hoher, breit wachsender Strauch, Blätter elliptisch, ei-läng- lich, spitz, 2–5 cm lang, oben stumpfgrün, unten heller, Blüten rötlich in kurzen Trugdolden, Frucht schwarz, elliptisch, etwa 1 cm lang .. mit Ballen	40–60 60–80	—,80 1,—	7,— 9,—	65,— 80,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	80–100 100–125	5,— 6,50		
B.e.F.I.R.St. adpressa (Bois), niederliegender Strauch, Zweige krie- chend, Blätter breit-eiförmig, stachelspitz, etwa 1 cm lang, Rand wellig, oben stumpfgrün, Blüten zu 1–2 festsitzend, rötlich, Frucht ei-rundlich, hellrot mit Ballen	10–15 15–20 20–30 30–40 40–60	1,— 1,25 1,75 2,25 3,—	9,— 11,— 16,— 20,— 27,—	80,— 100,— 140,— 180,— 225,—
H.B.F.L.V. bullata (Bois), bis 2 m hoher Strauch, Blätter ei-läng- lich, spitz, 3–7 cm lang, oben dunkelgrün, runzlig, unten grau-grün, Blüten rötlich, zu 3–7 in Trugdol- den. Frucht lebhaft rot, erbsengroß .. mit Ballen	40–60 60–100	—,85 1,—	7,50 9,—	65,— 80,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100–150	5,—		
e.F.I.R.S.St. dammeri (C. Schn.) (C. humifusa) (Duthie), kleinblei- bend, Zweige dem Boden auflegend und wurzelnd, Blätter elliptisch-länglich, 1–3 cm lang, dunkelgrün glänzend, unten bläulich, Blüten einzeln, weiß, etwa 1 cm groß, Frucht scharlachrot, kugelig .. mit Ballen	15–20 20–30 30–40 40–60	1,50 1,90 2,40 3,—	13,50 16,— 20,— 27,—	120,— 143,— 180,— 240,—
B.F.H.R.V. dielsiana (Pritz.) (C. applanata) (Duthie), bis 2 m hoher Strauch, Zweige bogig abstehend, Blätter ei-rundlich, derb, 2–3 cm lang, oben dunkelgrün, etwas behaart, unten graugelb filzig, Blüten rötlich in kurzen 3–7- blütigen, behaarten Doldentrauben, Frucht scharlach- rot bis in den Winter hinein haftend .. mit Ballen	40–60 60–100	—,85 1,—	7,50 9,—	65,— 80,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100–150	5,—		
F.B.H. divaricata (Rhed. et Wils.), bis 2 m hoher aufrechtwach- sender Strauch, Zweige breit abstehend, Blätter spitz elliptisch bis 2 cm lang, oben glänzend dunkelgrün, unten heller, Blüten rosa, kurzstielig, Frucht rot, lang- oval, etwa 8 mm lang .. mit Ballen	40–60 60–100	1,— 1,20	9,— 11,—	80,— 100,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100–125	5,—		
F.H.I.St. franchettii (Bois), fast Immergrüner aufrechter bis zu 3 m hoher Strauch, Zweige schön überhängend, Blätter elliptisch, derb, spitz, bis 3 cm lang, oben lebhaft grün, leicht glänzend, unten gelb oder grau-weiß filzig. Blüten rötlich zu 5–10 in behaarten Trugdolden, Frucht längl., orange-scharl., sehr lange haftend mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125	1,50 1,75 6,50 9,—	13,50 16,—	120,— 140,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100–125 125–150 150–175	10,— 13,— 18,—		
frigida aldenhamensis, Immergrüner, überhängender Strauch mit roten Früchten, bis Weihnachten haf- tend .. mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125	3,60 5,50 6,— 8,—	30,— 44,— 50,— 64,—	270,— 400,— 450,— 520,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100–125 125–150 150–175	10,— 13,— 18,—		

Cotoncaster (Med.) Zwergmispel (Rosaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.F.I.L.R. S.St.	<i>frigida vicaryi</i> (Gibbs.) bis 2 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit großen auffallend roten, zahlreichen Früchten und großen, grünen Blättern mit Ballen	40—60 60—80 80—100 100—125	3,60 5,50 6,— 8,—	30,— 44,— 50,— 64,—	270,— 400,— 450,— 520,—
	<i>horizontalis</i> (Dene), niedriger Strauch, Zweige waagrecht gestellt, Seitenzweige zweizellig, Blätter fast kreisrund, 5—10 mm lang, oben dunkelgrün, unten heller, im Herbst orange und scharlach. Blüten fest-sitzend, rötlich, Frucht hellrot mit Ballen	15—20 20—30 30—40 40—60 60—80	1,20 1,50 1,75 2,25 3,—	11,— 13,50 16,— 20,— 27,—	100,— 120,— 140,— 180,— 240,—
	<i>hybrida Gloire de Versailles</i> , immergrüner, starkwüchsiger, leicht überhängender Strauch mit einem zahlreichen Fruchtbehang im Herbst mit Ballen	40—60 60—80 80—100	3,60 5,50 6,—	30,— 44,— 50,—	270,— 400,— 450,—
	<i>hybrida pendula</i> (Grootend.) (C. <i>frigida pendula</i> , Hort.) Eine halbimmergrüne, dekorative Pflanze mit hängen-den Zweigen und überaus reich mit roten Beeren be-setzt bis in den Winter hinein mit Ballen	40—60 60—80 80—100 100—125	3,60 5,50 6,— 8,—	30,— 44,— 50,— 64,—	270,— 400,— 450,— 580,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100—125 125—150 150—175	10,— 13,— 18,—		
F.B.I.L.R. S.St.	<i>microphylla</i> (Wall), immergrüner, dichtverzweigter, schwachwachsender Strauch, Blätter verkehrt ei-läng-lich, 5—8 mm lang, oben dunkelgrün glänzend, unten dicht graufilzig. Blüten meist einzeln, weiß, Frucht scharlachrot, kaum erbsengroß mit Ballen	20—30 30—40 40—60	2,25 2,75 3,50	20,— 25,— 30,—	180,— 225,— 270,—
	<i>thymifolia</i> (Koehne), schwach wachsend, in der Belau-bung noch bedeutend kleinblättriger als die Stamm-form mit Ballen	15—20 20—30	2,25 2,75	20,— 25,—	180,— 225,—
	<i>moupinensis</i> (Franch.), bis 5 m hoher, sparrig wachsen-der Strauch, Blätter elliptisch länglich 5—10 cm lang, oben glänzend grün, etwas runzelig, unten hellgrau-grün, filzig. Herbstfärbung dunkelbraun, Blüten röt-lich in kleinen Doldenrispen, Frucht schwarz, stark erbsengroß mit Ballen	40—60 60—80 100—150	—,80 1,— 5,—	7,— 9,—	60,— 80,—
B.F.H.R. S.V.	<i>multiflora</i> (Bge.), Strauch bis 3 m hoch werdend. Zweige bogig überhängend, zuerst behaart, dann kahl. Blät-ter breit eiförmig bis elliptisch 2—5 cm lang, lebhaft grün, unten hell graugrün. Blüten weiß, Frucht schar-lachrot, erbsengroß, reich fruchtend mit Ballen	40—60 60—80 80—100	1,— 1,20 1,50	9,— 11,— 13,50	80,— 100,— 120,—
	<i>praecox</i> (Vilm) (C. <i>nanshanica</i>) (Regel) (C. <i>Nan-Shan</i>) (Hort) (<i>adpressa praecox</i>) (Bois + Berth), niedrig bleibend, weit kriechender Strauch, Blätter oval, 2—3 cm lang, Rand wellig und behaart, oben oft metall-glänzend, nach Herbst sich rot verfärbend und abfal-lend. Blüten zu 1—3 sitzend, dunkelrosa, Frucht kuge-lig, 8—12 mm dick, rot mit Ballen	15—20 20—30 30—40 40—60 40—60 60—80 80—100	1,20 1,50 1,75 2,25 4,50 5,50 7,50	11,— 13,50 16,— 20,—	100,— 120,— 140,— 180,—
	<i>praecox Hessei</i> (Hort.) (C. <i>adpressa praecox</i> Hessei), in allen Teilen kleiner als die Stammform, von dichterem, langsameren Wuchs, ... mit Ballen	20—30 30—40	1,75 2,25	16,— 20,—	140,— 180,—
F.I.R.St.V.	<i>salicifolia floccosa</i> (Rehd. et Wils.), immergrüner Strauch, Zweige überhängend, Blätter länglich lanzettlich, oben dunkelgrün glänzend, unten flockig, wollig. Blüten klein, weiß in dichten Doldentrauben. Frucht lebhaft rot, erbsengroß, ... mit Ballen	40—60 60—80 80—100 100—125 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,60 5,50 6,— 8,— 7,50 9,— 10,— 12,— 14,—	30,— 44,— 50,— 64,—	270,— 400,— 450,— 580,—
	<i>simonsii</i> (Bak), oft halb-immergrüner bis 3 m hoher Strauch, Blätter ei-rundlich, spitz, bis 3 cm lang, oben glänzend dunkelgrün, unten blaßgrün, Blüten zu 2—4 hellrosa, Frucht erbsengroß, scharlachrot mit Ballen	40—60 60—80 80—100 100—150	1,20 1,50 5,— 7,—	11,— 13,50	100,— 120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Crataegus (L.) Dorn (Rosaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.F.L.R.V.	<i>carrierei</i> (Vauvel) (<i>Cr. crus-galli</i> × <i>pubescens</i>) (Stend), bis 7 m hoch werdender Baum, Dornen bis 5 cm lang, Blätter elliptisch länglich, spitz, 5–10 cm lang, oben dunkelgrün glänzend, unten behaart, Blüten weiß, Früchte elliptisch bis 18 mm dick, orangerot, lange haftend. Kleinkroniger Straßenbaum, besonders geeignet für Industriegebiet	100–125 125–150 150–200 200–250 250–300	1,80 2,25 2,75 3,60 4,40	16,50 20,— 25,— 33,— 40,—	150,— 180,— 225,— 300,— 360,—
	Alleebäume, Stammumfang	7–8 8–10 10–12	6,— 7,25 8,50	55,— 66,— 77,—	500,— 600,— 700,—
B.F.H.L.V.	<i>coccinea</i> (L.) (Scharlachdorn) (<i>C. intricata</i>) (Lgl.), kleiner Baum oder Strauch 5–6 m hoch werdend. Blätter ei-elliptisch, kurz und spitzlappig, doppelt gesägt, oben lebhaft grün, Blüte weiß in Dolden, Frucht kugelig braunrot	70–100 100–150	1,50 1,75	13,50 15,50	120,— 140,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	100–150	5,—		
B.F.H.R. S.V.	<i>monogyna</i> (Jacq.), gem. Weißdorn, bekannte heimische, zu Hecken viel verwandte Pflanze	40–60 60–80 100–125	—,60 —,85 1,—	5,50 7,50 9,—	50,— 65,— 80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100–150 150–200	4,— 6,—		
	<i>kermesina plena</i> (Hort.) (<i>C. oxyacantha paulii</i>) (Rehd.), Blüten leuchtend karmesin, der bekannte Rotdorn ..	100–125 125–150 150–200 200–250	1,80 2,25 2,75 3,60	16,50 20,— 25,— 33,—	150,— 180,— 225,— 300,—
	Halbstämme	125–150 150–175	4,— 5,—	36,— 45,—	330,— 400,—
	Alleebäume, Stammumfang	7–8 8–10 10–12	5,— 6,— 7,25	45,— 55,— 66,—	400,— 500,— 600,—
B.F.L.H. R.V.	<i>prunifolia</i> (Pers.), Strauch oder kleiner Baum, Blätter breit elliptisch bis 8 cm lang, scharf gesägt, glänzend dunkelgrün, unten heller, im Herbst gelb und rot. Blüten weiß in dichten Doldenrispen. Frucht erbsen-groß, scharlachrot	70–100 100–125	1,50 1,75	13,50 16,50	120,— 140,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100–150	5,—		
	<i>pyracantha</i> (Brokh) siehe <i>Pyacantha coccinea</i> (Roem)				

Cydonia (Mill.) Quitte (Rosaceae)*japonica* (Pers.) siehe *Chaenomeles*.**Cytisus (L.) Geissklee (Leguminosae)**

St.	<i>decumbens</i> (Spach.) (<i>Genista Halluri</i>) (D. C.), niedriger, mit großen, leuchtendgelben Blüten im April-Mai, reichblühender Strauch	20–30	2,—	18,—	
B.St.	<i>hirsutus</i> (L.) (<i>C. elongatus</i>) (Hort.), bis 60 cm hoch, Zweige zottig behaart, Blättchen verkehrt eiförmig, Blüten gelb, Fahne gelb mit braun, .. mit Topfballen	15–30	1,50	13,50	
B.St.	<i>kewensis</i> (Bean.) Zwergelfenbein†nster, niedriger, zierlich überhängender Strauch mit elfenbeinfarbenen Blüten im Mai	30–50	2,—	18,—	
	<i>laburnum</i> (L.) siehe <i>Laburnum vulgare</i> (Bercht. et Prst).				
	<i>nigricans</i> , Wuchs aufrecht, Zweige stielrund, leicht behaart, Blätter dreizählig gestielt, unten behaart, Blüten gelb in 8–20 cm langen Trauben sitzend, blüht Juni-Juli	50–80	1,—	9,—	80,—
	mit Topfballen				
B.E.St.	<i>praecox</i> (Bean) (<i>C. multiflorus</i> × <i>purgans</i>), bis 3 m hoch, Zweige überhängend, Blätter meist einfach lanzettlich bis 2 cm lang. Blüten lichtgelb, sehr reichblühend, mit Topfballen	30–40 40–60 60–80 80–100	1,50 1,75 5,— 6,50	13,50 16,—	120,— 140,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen				

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Cytisus (L.) Geissklee (Leguminosae)					
B.E.St.	<i>praeox albus</i> (Smith), etwas schwächer wachsend und mehr hängend, Blüte weiß, häufig verwendeter Treibstrauch mit Topfballen	30—40 40—60	1,50 1,75	13,50 16,—	120,— 140,—
B.St.	<i>purpureus</i> (Scop), bis 50 cm hoch, niederliegend, aufstrebende Blättchen verkehrt ei-elliptisch, bis 2,5 cm lang, dunkelgrün, Blüten purpurrot .. mit Topfballen	25—40	2,—	18,—	
	<i>incarnatus</i> (Hort.), Blüten violett-rosa, mit Topfballen	25—40	2,—	18,—	
B.St.W.	<i>scoparius</i> (Lk) (<i>Spartium scoparium</i>) (L.) (<i>Sarothamnus scoparius</i>) (Wimm) (<i>Genista scoparia</i>) (Lam.), Besen pflriemen, aufrechter bis ausladender Strauch, dunkelgrün, Blätter dreizählig, Blüten goldgelb mit Topfballen	20—40 40—60 60—80	—,85 1,— 1,20	7,50 9,— 11,—	65,— 80,— 100,—
	Hybriden in Sorten wie:				
	<i>Andreanus</i> , dunkelsamtrot				
	<i>Butterfly</i> , sattgelb, Flügel rot gestreift				
	<i>C. E. Pearson</i> , hellgelb bis rotviolett				
	<i>Dorothy Walpole</i> , hellgelb bis dunkelsamtrot				
	<i>Firefly</i> , dunkelsamtrot mit Topfballen	40—60 60—80	2,50 3,—	23,50 27,—	200,— 225,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	60—80 80—100	6,— 7,50		
B.St.	<i>versicolor</i> (Dipp) (<i>C. purpureus</i> × <i>hirsutus</i>), bis 50 cm hoch, niedrigliegend, aufstehend, Blüten mehrfarbig, meist Fahnen weißlich, Flügel gelblich, Kiel purpur-lila mit Topfballen	30—50	1,80		
Daboecia (D. Don) Kriechheide (Ericaceae)					
J.St.	<i>polifolia</i> (D. Don) (<i>D. cantabrica</i>) (Koch) (<i>Boretta cantabrica</i>) (Khe) (<i>Menziesia polifolia</i>) (Juss), immergrüner, niedrigbleibender Strauch, Blätter oben dunkelgrün, glänzend, unten weißfilzig, Blüten krugförmig, 1 cm lang, purpur in endständigen Trauben .. mit Ballen		—,65	6,—	
Daphne (L.) Seidelbast (Thymelaeaceae)					
J.St.	<i>genkium</i> (L.), Rosmarinseidelbast, niederhängender, kleiner, immergrüner Strauch, Blätter lanzettlich 1—2 cm lang, oben dunkelgrün glänzend, unten blaugrün, Blüten karmin-rosa, duftend mit Ballen	12—20 20—30 30—40	5,— 6,— 7,—		
B.F.R.	<i>mezereum</i> (L.), bis 1 m hoher Strauch, Blätter wechselständig lanzettlich 3—8 cm lang, oben lebhafte grün, unten graugrün, Blüten blaßkarmin, stark duftend, sehr früh im Frühjahr blühend, Frucht scharlachrot, mit Ballen	30—40 40—60 60—80	5,— 6,— 7,50		
S.St.	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	40—60 60—80 80—100	8,— 10,— 14,—		
B.F.R.S.St.	<i>alba</i> (West), Blüte weiß mit Ballen	30—40 40—60	5,— 6,—		
Decaisnea (H. & T.) — Blauschote (Lardizabalaceae)					
e.F.I.	<i>fargesii</i> (Franch.), Ein Strauch, der in Westchina bis 5 m hoch wird und mit seinen bis 60 cm langen Fiederblättern außerordentlich interessant ist. Eine Zierde mit seinen grünlich-gelben Blütenrispen im Juni und den bohnenförmigen, blau bereiften Früchten im Herbst mit Ballen	40—60 60—100 80—100 100—125	3,— 3,50 6,— 7,50	27,— 32,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
Deutzia (Thbg.) Deutzia (Saxifragaceae)					
	<i>crenata</i> siehe <i>D. scabra</i>				
H.St.	<i>gracilis</i> (S. et Z.), niedrigbleibender, kaum 1 m hoch werdender Strauch, Blätter lanzettlich, 3—6 cm lang, ungleich gesägt, Blüten in aufrechten Rispen oder Trauben, weiß, hellster Treibstrauch mit Ballen	40—60 40—60 60—100	1,— 5,— 6,—	9,—	80,—

Deutzia (Thbg.) Deutzia (Saxifragaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.St.	lemoniei (Lem.) (D. parviflora × gracilis), schwach wachsender Strauch, bis 1 m hoch werdend. Blätter lanzettlich bis 6 cm lang, scharf gesägt. Blüten weiß in 3–8 cm hohen Rispen. Sehr viel für Treiberei verwendet	40–60	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	40–60	5,—		
	mit Ballen	60–100	6,—		
	Boule de neige (Hort.), Blüte reinweiß, etwas größer als die Stammform	40–60	1,—	9,—	80,—
	compacta Avalanche (Hort.), reinweiß	60–80	1,—	9,—	80,—
H.	magnifica (Rehd.) (D. crenata magnifica) (Lemoine), stark aufrecht wachsender Strauch, Blätter länglich lanzettlich bis 6 cm lang, feinkerbig gesägt. Blüten 2,5 cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt in 4–6 cm langen rundlichen Rispen	80–125	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	4,—		
	mit Ballen	150–200	5,—		
H.St.	rosea (Rehd.) (D. gracilis rosea) (Lem.), kein bleibender Strauch, eilanzettlich scharf gesägt. Blüten außen gerötet, innen weiß, glockenförmig in kurzen Rispen ..	40–60	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	60–100	5,—		
	mit Ballen				
H.St.	rosea multiflora (Rehd.) (D. gracilis multifl.) (Lemoine), Blüten weiß	60–80	1,—	9,—	80,—
H.St.	venusta (Rehd.) (D. gracilis venusta Lemoine), Blüten groß weiß	60–80	1,—	9,—	80,—
H.	scabra (Thunb.) (D. crenata) (S. et Z.), bis 3 m hoher Strauch, Blätter eiförmig lanzettlich, 10–14 cm lang, gezähnt, Blüten reinweiß in schmalen 8–12 cm aufrechten Rispen	80–125	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	5,—		
	mit Ballen				
H.	candidissima (Rehd.) (D. crenata candidissima plena) (Carr) (D. Welsii) (Hort.) (Froeb), Blüten dicht gefüllt, reinweiß, rosettenartige Knospen rötlich überlaufen ..	80–125	—,85	7,50	65,—
H.	plena (Rehd.) (D. crenata plena) (Hort.) (D. crenata purpur-plena) (Späth), Blüten dicht gefüllt weiß, außen rosa	80–125	—,85	7,50	65,—
H.	Pride of Rochester (Ellw. et Barry), Wuchs aufrecht, leicht überhängend. Blüten weiß, dicht gefüllt, außen scharlachrot gestreift	80–125	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	5,—		
	mit Ballen				

Diervilla (Adams) siehe Weigela

Dimorphantus siehe Aralia

Elacagnus (L.) Oelweide (Elaeagnaceae)

B.R.F.H.	augustifolia (L.), schmalblättrige Oelweide, bis 7 m hoher Strauch, oft dornig. Blätter länglich-lanzettlich, 4–8 cm lang, weißfilzig. Blüten glockig, innen gelb, 1 cm lang, duftend. Frucht länglich, gelb. Wertvoll für trockene Böden	60–80	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	80–120	1,20	11,—	100,—
	mit Ballen	100–150	6,—		
	argentea (Pursh.), mittelhoher, 2 bis 3 m hoch werdender Strauch, mit silbrigem Laub und hellgelben Blüten	60–100	3,60	33,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	8,—		
	mit Ballen				
	multiflora (Thunb.) (E. edulis, Sieb.) (E. longipes-) (Gray), niedriger, dornloser Strauch mit hellgelben, duftenden Blüten	60–100	1,50	13,50	120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	8,—		
	mit Ballen				

Elsholtzia, Blauähre (Kaminze) (Labiatae)

stauntonii, wertvoller Spätblüher, bis 1,50 m hoch werdend mit aufrecht stehenden, violettblauen Blütenständen, stark aromatisch duftend

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
50—70	2,50		

Enkianthus (Lour.) Prachtglocke (Ericaceae)

campanulatus (Nichols), hochwachs. Strauch, Blätter elliptisch, 3—7 cm lang, gesägt, im Herbst lebhaft rot. Blüten etwa 1 cm lang, gelblich mit rötlicher Zeichnung in hängend. Doldentrauben im zeitigen Frühjahr. Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen

60—100	4,50
100—125	6,—
80—100	7,—
100—150	9,50

Erica (L.) echte Heide (Ericaceae)

B.e.I.St. *carnea* (L.) (E. herbacea) (Auct.). Schneehaide. Kleiner Strauch, Blätter lebhaft grün, Blüten fleischrot an den Zweigenden in einseitigen Trauben. Staubblätter dunkelrot. Blütezeit März-April

B.e.I.St. *alba* (Bean), Blätter gelblich grün, Blüten weiß

B.e.I.St. *atrorubra*, Blüten dunkelscharlachrot

B.e.I.St. *King George* (Hort.), niedrig bleibend, sehr reich blühend, mit rosa Blüten

B.e.I.St. *James Backhouse* (Hort.), frühblühend, starkwachsend, mit großen Rispenblüten, Lichtrosa

8—12	—,80	6,60	60,—
über 12	1,10	9,—	80,—

rubra (Hort.), Blüten leuchtend scharlachrot

B.e.I.St. *Schneekönigin* (Hort.), Blüte reinweiß

B.e.I.St. *Springwood White* (Hort.), weiß blühend in langen Rispen

B.e.I.St. *vivellii* (Hort.), Blätter bräunlich, Blüten leuchtend karmin

B.e.I.St. *Winter Beauty* (Hort.), Wuchs niedrig u. gedrungen, Blüten dunkelpurpur, blüht etwa 14 Tage früher als die anderen Sorten

B.e.I.St. *mediterranea* (L.), Blüte Hla-rosa, ähnl. der *E. carnea* hybr. Silberschmelze (Arends), weißblühend

B.e.I.St. *tetralix* (L.) Glockenheide. Zweige u. Blätter grau, weichhaarig, Blüten nickend, rosa, zu 5—12 in Dolden ..

8—12	—,80	6,60	60,—
8—12	—,80	6,60	60,—

B.e.I.St. *mollis* (Bean), weißblühend, Laub weißfilzig

B.e.I.St. *vagans* Mrs. D. F. Maxwell (M. & B.), mit sehr großen im August-September erscheinenden kirschrosa bis fast lachsrosa Blüten

8—12	—,80	6,50	60,—
12—20	1,10	9,—	80,—

B.e.I.St. *St. Keverne*, sehr große, reinrosa Blüten im August-September

8—12	—,80	6,50	60,—
12—20	1,10	9,—	80,—

Escallonia (Mutis.) (Saxifragaceae)

I.L.St. *hybrida* Donard Seedling (Donard), immergrüner, niedriger Blütenstrauch mit kremweißem Blütenbehang im Juli-August

40—60	1,65	16,—	140,—
60—80	2,25	20,—	180,—

Evonymus (L.) Spindelbaum (Celastraceae)

E.F.L.St. *alata* (Reg.) Geflügelter Spindelbaum, bis 4 m hoch werdender, breit und sparrig wachsender Strauch mit schöner Herbstfärbung

30—40	4,—
40—60	5,—
60—80	9,—
80—100	11,50

F.H.L.R. *europaea* (L.), Paffenhütchen, bis 7 m hoher Strauch, Blätter ei-elliptisch 3—8 cm lang, gesägt. Blüten gelblich-grün, besonders durch seine rosa bis roten Früchtezierend

60—80	1,20	11,—	100,—
80—125	1,50	13,50	120,—
80—100	4,—		
100—125	5,—		
125—150	6,—		
150—175	9,—		

I.R.S.St. *nana* (Bieb.) niederliegender etwa 30 cm hoch werdender Strauch. Blätter wechselständig lanzettlich, bis in das Frühjahr haftend, zuletzt braunrot gefärbt. Blüten bräunlich, Frucht rosa

30—40	1,—	9,—	80,—
-------	-----	-----	------

Evonymus (L.) Spindelbaum (Celastraceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
I.R.S.St.	Koopmannii (Beißner) (E. nana turkestanica) (Dieck), bis 60 cm hoher Strauch, Blätter breiter als die Stammform, sehr schöne Herbstfärbung . . . mit Ballen	30—40 40—60	—,75 1,—	6,50 9,—	60,— 80,—
e.I.S.St.	radicans (Sieb.) (E. japonica radicans) (Regel) (E. fortunei radicans) (Rehd.), niederliegender oder an Gegenständen emporkletternder Strauch, Zweige leicht wurzelnd, Blätter elliptisch bis 3 cm lang, gesägt, stumpf grün, mit helleren Nerven, Blüten unbedeutend . . . mit Ballen	20—30 30—40	1,10 1,35	9,— 11,—	30,— 100,—
e.I.L.S.St.	argenteo variegata (Hort.) (E. picta) (Jacob-Makoy) (E. fortunei gracillis) (Rehd.), weißbunte Form der vorigen mit Ballen	15—20 20—30 30—40	—,75 1,— 1,25	6,50 9,— 11,—	60,— 80,— 100,—
I.St.	minima (Sim-Louis) (E. rad. kewensis) (Hort.) (E. fortunei minima) (Rehd.), Zwergform mit sich eng an den Boden schmiegenden Blättern, klein, oval grün mit heller Aderung . . . mit Ballen	10—15 15—20	—,75 1,—	6,50 9,—	60,— 80,—
F.I.S.St.V.	vegeta (Rehd.) (E. fortunei vegeta) (Rehd.), breitbuschig wachsend, großlaubig mit rundlichen dunkelgrünen Blättern. Wahrscheinlich Altersform von E. radicans . . . mit Ballen	20—30 30—40 40—60 40—60 60—80 80—100	2,75 3,30 4,— 6,50 8,— 11,—	22,50 27,— 33,— 30,— 3,—	200,— 240,— 300,—

Exochorda (Ldl.) Prunkspiere (Rosaceae)

B.R.	albertii (Regel) (E. korolkowii) (Lav.), Bis 4 m hoher Strauch, Blätter ei-länglich frischgrün. Blüten 3—4 cm breit, fast sitz. zu 5—8 Trauben . . . mit Ballen	60—80 80—100	3,50 4,—	30,— 36,—
	grandiflora (Hook) (E. racemosa) (Rehd.), bis 4 m hoher Strauch, Blätter elliptisch länglich, 3—8 cm lang, hellgrün, Blüten weiß, April-Mai erscheinend an etwa 1 cm langem Stiel, 4 cm breit in 6—10blütigen Trauben . . . mit Ballen	60—80 80—100	3,50 4,—	30,— 36,—

Fagus (L.) Buche (Fagaceae)

B.H.F.R.V.	sylvatica (L.), bekannte heimische Rotbuche, mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Pyramiden an Stäben gezogen aus weitem Stand, 1a Heckenpflanzen mit Erdballen 25 % Aufschlag. Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert. Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert werden, deren Preis um 20 % niedriger liegt.	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	1,10 1,30 2,— 2,70 3,30 4,—	10,— 12,— 13,— 24,— 30,— 36,—	90,— 110,— 160,— 210,— 270,— 330,—
------------	---	---	--	--	---

3—4jähr. verpfl. für Hecken gezogen

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
	40—60 60—80 80—100				27,— 36,— 44,— 240,— 330,— 400,—
	150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300	5,— 6,— 7,50 9,— 11,— 13,50	45,— 55,— 68,— 80,— 100,— 120,—		400,— 590,— 620,— 750,—
	8—10 10—12 12—14	12,— 14,— 18,—	108,— 125,— 160,—		

Alleebäume, Stammumfang

ungeschnittene, natürlich gewachsene, mehrmals verpflanzte Büsche aus weitem Stand	100—125 125—150 150—200 200—250	1,80 2,75 2,75 3,60	16,50 20,— 25,— 33,—	150,— 130,— 225,— 300,—
mit Erdballen 25 % Aufschlag	200—250	12,—		
Einzelpflanzen, malerisch, natürlich gewachsen aus extra weitem Stand, breitbuschig verzweigt mit Ballen	250—300 300—350 350—400 400—500 500—600 600—700	18,— 25,— 40,— 50,— 65,— 85,—		

Fagus (L.) Buche (Fagaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.H.R.	<i>silvatica atropurpurea macrophylla</i> (hort.) u. Swat Margret (Frahm), veredelte Blütbuchen mit schwärzlich-roter Belaubung. Pyramiden mit Ballen	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	6,— 8,— 12,— 20,— 30,—		
	Hochstämme mit Ballen	8—10	30,—		
	Stammumfang	10—12 12—14 14—16	36,— 45,— 60,—		
Tr.F.R.	<i>purpureo pendula</i> (Rehd.), Trauerblutbuche . . mit Ballen	100—125 125—150 150—200 200—250	10,— 15,— 25,— 35,—		
	Hochstämme mit Ballen	8—10	30,—		
	Stammumfang	10—12	36,—		
Tr.F.R.	<i>pendula</i> (Loud), grüne Trauerbuche mit Ballen	100—125 125—150 150—200 200—250	6,— 8,— 12,— 20,—		
	Hochstämme mit Ballen	8—10	30,—		
	Stammumfang	10—12 12—14	36,— 45,—		
H.L.R.	<i>purpurea</i> (Ait.) Blütbuche aus Samen, von dunkel- und großblättrigen Samenträgern gewonnen . . mit Ballen	80—100 100—125 125—150 150—200 200—250	3,30 4,40 5,50 8,— 10,—	30,— 36,— 44,— 72,— 90,—	
	Hochstämme mit Ballen	8—10	30,—		
	Stammumfang	10—12	36,—		

Forsythia (Vahl.) Goldglöckchen (Oleaceae)

B.R.H.S.	<i>intermedia</i> (Zbl.), wertvoller Frühlingsblüher. Blätter länglich-lanzettlich, am Rande gesägt. Blüten tiefgelb, meist zu 2—3 stehend	100—150	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—150 150—200	6,— 8,—		
	mit Ballen	80—100	3,—	27,—	
	Halbstämme	100—125	3,75	33,—	
B.R.H.	<i>spectabilis</i> (Späth) (F. spect.) (Koehne), Blüten dottergelb, kurz gestielt, sehr reich blühend	100—150	1,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—150 150—200	6,— 8,—		
B.R.H.	<i>vitellina</i> (Koehne), Blüten dottergelb, sehr zahlreich	100—150	1,—	9,—	80,—
B.R.	<i>suspensa</i> (Vahl), bis 1 1/2 m hoch werdender Strauch, Wuchs überhäng., dünntrieb., Blätter meistens dreizählig, Blüten gelb	80—120	1,50	13,50	120,—
B.R.	<i>fortunei</i> (Rehd.), Blätter ei-länglich, meist dreilappig bis dreizählig, Blüten tiefgelb, kurz gestielt. Pflanze kräftig aufrechtwachsend. Zweige bogig überhängend	60—100	2,25	20,—	180,—
B.R.	<i>sieboldii</i> (Zbl.) (F. sieboldii) (Dipp.), Zweige sehr dünn, überhängend, oft auf dem Boden kriechend und wurzelnd. Blätter meist einfach, eiförmig, Blüten tiefgelb	60—100	1,50	13,50	120,—
B.R.H.S.	<i>viridissima</i> (Ldl), Strauch aufrechtwachsend, Blätter elliptisch, länglich, fast ganzrandig dunkelgrün. Blüten bis zu 3 zusammenstehend, leuchtend gelb mit grünlichem Anflug mit Ballen	100—150 100—150 150—200	1,— 6,— 8,—	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				

Fraxinus (L.) Esche (Oleaceae)

R.	<i>excelsior</i> (L.), gemeine Esche, bekannter heimischer Baum, liebt feuchte Lagen, gedeiht aber auch auf anderen Böden, Heister	125—150 150—200 200—250 250—300	1,50 1,80 2,25 2,75	13,50 16,50 20,— 25,—	125,— 150,— 180,— 225,—
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18	5,— 6,— 7,25 8,50 9,50	45,— 55,— 66,— 77,— 88,—	400,— 500,— 600,— 700,— 800,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Fraxinus (L.) Esche (Oleace)					
R.V.	<i>globosa</i> (Degen) (F. <i>excelsior</i> , <i>nana</i> , Hayne) Kugel- esche, dicht geschlossene, kugelige Krone, kleinkroni- ger, gesunder Alleebaum				
	Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,—	66,— 77,— 100,—	600,— 700,— 900,—
	<i>pendula</i> (Alt.), die bekannte Traueresche	8—10 10—12	7,25 8,50	66,— 77,—	600,— 700,—
	Hochstämme, Stammumfang				
Gaultheria (L.) Scheinbeere (Ericaceae)					
F.J.S.St.	<i>procumbens</i> (L.), Niederliegende Scheinbeere, kleines, bis 30 cm hohes, bodenbedeckendes Gehölz mit roten Beeren	8—12 12—20	1,— 1,25	9,— 11,—	80,— 190,—
	mit Ballen				
Genista (L.) Ginster (Leguminosae)					
	<i>germanica</i> (L.) aufrecht wachsend, bis 60 cm hoch wer- dend, Zweige zottig behaart, Blätter einfach, elliptisch länglich, Blüten gelb, klein, in 3—5 cm langen Trau- ben, Blütezeit Juni-Juli	30—50	1,75	16,—	140,—
St.	<i>radiata</i> (Scop.) (<i>Cytisus radiatus</i>) (Koch), Strahlengin- ster, bis 50 cm hoch werdender Strauch, mit gelben Blüten im Juni	15—20 20—30	2,25 2,75	20,— 22,50	
	<i>praecox</i> siehe unter <i>Cytisus</i>				
	<i>scoparius</i> siehe unter <i>Cytisus</i>				
St.	<i>sagittalis</i> (L.), Pfeilginster, niederliegend, Zweige bis 20 cm ansteigend, 3kantig oder 2schneidig flügelkan- tig, Blätter eilanzettlich bis 2 cm lang, Blüten gold- gelb in kurzen Trauben	20—30	2,75	22,50	
B.St.	<i>tinctoria</i> (L.) (<i>G. sibirica</i>) (hort.), Färbeginster bis 1 m hoch werdend, aufrechtwachsender Strauch, Blätter einfach elliptisch-länglich frisch-grün, Blüten goldgelb in vielblütigen, bis 6 cm langen Trauben, für leichten Boden geeignet	40—60 60—80	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
St.	<i>plena</i> (Rehd.), Strauch niedrig bleibend, Blüten gefüllt goldgelb	15—20 20—30	2,25 2,75	20,— 22,50	180,— 200,—
	mit Topfballen				
Hamamelis (L.) Zaubernuß (Hamamelidaceae)					
F.L.R.	<i>japonica</i> (S. et Z.), breiter Strauch mit abstehenden Zweigen, Blätter ei-rundlich 5—10 cm lang, unten hell- grün, Blüten bereits im Januar-März erscheinend, Petale lebhaft gelb, Kelch purpurviolett, zurückge- rollt	40—60 60—80 80—100 100—125	8,— 10,— 12,— 16,—		
	mit Ballen				
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—125 125—150 150—175	20,— 28,— 40,—		
	<i>mollis</i> (Oliv.), hoher Strauch, junge Zweige dicht, weich behaart, Blätter ei-rundlich, 8—16 cm lang, gezähnt, oben behaart, unten graufilzig, Blüten bereits im Jan- uar-März erscheinend, bis 2 cm lang, tief goldgelb, am Grunde rötlich, Kelch außen braunfilzig, innen purpur	40—60 60—80 80—100	10,— 14,— 18,—		
	mit Ballen				
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—125 125—150	27,— 35,—		
	<i>virginiana</i> (L.), hoher Strauch bis Baum, breit und locker wachsend, Blätter spitz verkehrt ei-elliptisch, grob ge- zähnt, unten hellgrün, Blüten hellgelb, Kelch innen stumpf hellbraun	60—80 80—100 100—125	8,— 10,— 12,—		
	mit Ballen				
Hedera (L.) Efeu (Araliaceae)					
J.St.	<i>helix conglomerata</i> (Nichols), Felsenefeu, langsam wach- send, Blätter klein, ganz randig bis dreilappig	10—15 15—30	1,50 1,75	13,50 16,—	120,— 140,—
	mit Topfballen				
J.R.S.St.	<i>minima</i> (Hibb.), Eine straff aufrecht wachsende Form mit sehr dicht gestellten 3—5lappigen Blättern	15—20 20—30	1,50 1,75	13,50 16,—	120,— 140,—
	mit Topfballen				
	Kletternde Varietäten siehe unter Kletterpflanzen.	30—40	2,25	20,—	180,—

Helianthemum (Adans.) Sonnenröschen (Cistaceae)

- B.I.St.W. immergrüne oder halblimmergrüne zwergige Halbsträucher, blühen nur auf bei voller Sonne. Mit Topfballen
- Fire Flame, gelblich rosa
Golden Queen, rein goldgelb
Rose Queen, hellrosa
Rubin, rot gefüllt
sulphureum plenum, gelb gefüllt

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	—,75	6,60	60,—

Hibiscus (L.) Eibisch (Malvaceae)

- St.W. syriacus (L.), bis 3 m hoher Strauch, junge Zweige zottig behaart, zuletzt kahl, Blätter eirhombisch, 5—10 cm lang, 3lappig, grob gezähnt. Blüten achselständig, einzeln, breit glockig, bis 6 cm breit

Hybriden in Sorten:

- Boule de Feu, rot
Coelestis, blau, einfachbl.
Duc de Brabant, rot, gefüllt mit Ballen
elegantissima, weiß, gefüllt
Jeanne d'Arc, weiß, gefüllt
Rubin, rot, einfachblühend
Totus albus, weiß, einfachblühend
Woodbridge, tief rosarot, einfachblühend.
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ...
mit Ballen

30—40	3,—	25,—
40—60	3,50	28,—
60—80	6,—	
80—100	8,—	

Hippophae (L.) Sanddorn (Elaeagnaceae)

- F.H.L.V. rhamnoides (L.), bis 6 m hoher sparrig wachsender, dorniger Strauch, wurzelläufertreibend, Triebe silbrig, Blätter linealisch-lanzettlich bis 7 cm lang, glänzend silbrig. Blüten unscheinbar gelblich, Früchte sehr zierend, ei-rundlich 6—8 mm lang, orangegelb. Wächst auch auf sehr sandigen Böden
- Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ...
mit Ballen

60—80	1,—	9,—	80,—
80—125	1,20	11,—	100,—
100—125	4,—		
125—150	5,—		
150—175	6,—		

Holodiscus (Maxim) Scheinspiere (Rosaceae)

- H.B.S. discolor ariaefolius (Aschers. et Graebn.) (pirea ariaefolia) (Sm.), bis 3 m hoher Strauch mit bogig überhängenden Zweigen, Blätter breit, eiförmig bis 8 cm lang, doppelt gezähnt, Blüten gelblich weiß in dichten zierlich überhängenden bis 25 cm langen Rispen

80—125	1,50	13,50	120,—
--------	------	-------	-------

Hydrangea (L.) Hortensie (Saxifragaceae)

- R.S. arborensens grdf. (Rehd.), meterhoher buschiger Strauch, Blätter ei-elliptisch bis 20 cm lang, gesägt, hellgrün. Blüten weißlich in flachen 10—15 cm breiten Doldenrispen. Für Halbschatten sehr geeignet
- Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ...
mit Ballen

40—60	1,50	13,50	120,—
60—80	1,75	16,—	140,—
60—80	3,—		
80—100	4,—		

- L.R.S. opuloides acuminata (Dipp.) (H. acuminata) (Sieb u. Zucc.) (serrata acuminata) (Wils), bis 1,50 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch 5—10 cm lang, gezähnt. Doldenrispen 4—8 cm breit, ziemlich flach, Randblüten blau
- mit Ballen

40—60	1,50	13,50	120,—
-------	------	-------	-------

- L.R.S. otaksa (Schn.) (H. macrophylla otaksa) (Wils), bis 2 m hoher Strauch, Blätter verkehrt eiförmig, grob gezähnt, Doldenrispen bis 20 cm breit. Blüten blau oder rosa, Randblüten sehr groß
- mit Ballen

40—60	1,50	13,50	120,—
-------	------	-------	-------

- L.R.S. japonica Belzoni imperialis (Hort.) (macrophylla coerulesa Wils), mit sehr großen, flachen Doldenrispen mit porzellanblauen Randblüten
- mit Ballen

40—60	1,50	13,50	120,—
-------	------	-------	-------

- xanthoneura wilsonii (Rehd.), bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter länglich lanzettlich. Blüten in flachen Doldenrispen, Randblüten weiß, Mittelblüten gelblich-weiß

50—80	1,50	13,50	120,—
-------	------	-------	-------

Hydrangea (L.) Hortensie (Saxifragaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	
R.	<i>paniculata</i> Gräfl. (Sieb.), bis über 2 m hoher Strauch, Blätter ei-elliptisch bis 12 cm lang, gesägt. Blüten weiß, im Verblühen rötlich, in 15–25 cm langen Rispen. Außerordentlich zierend	3–5 Triebe 5–8 Triebe 8–12 Triebe Halbstämme	50–70 60–80 70–90 80–100 100–120	1,20 1,50 1,75 6,— 7,—	11,— 13,50 16,— 54,— 63,—	100,— 120,— 140,—
	extra starke Büsche zum Treiben					

Hypericum (L.) Johanniskraut (Guttiferae)

I.S.St.W.	<i>calycinum</i> (L.), immergrüner Halbstrauch, Ausläufer treibend, Blüten goldgelb, 4–5 cm breit	mit Ballen	15–20 20–30 30–40	1,20 1,50 1,75	11,— 13,50 16,—	100,— 120,— 140,—
St.	<i>olympticum minor</i> (L.), immergrüner Strauch, schwachwachsend, Blüten goldgelb, 3–4 cm breit mit Topfballen		15–20	1,50	13,50	120,—
I.S.St.W.	<i>moserianum</i> (André) (H. <i>patulum</i> × <i>calycinum</i>), bis 40 cm hoher Strauch, Blätter eiförmig bis 5 cm lang, wintergrün. Blüten bis zu 5 in Trugdolden sitzend, goldgelb, 5–6 cm breit	mit Ballen	30–50	1,50	13,50	120,—
I.S.St.W.	<i>patulum henryi</i> (Bean), Blätter eilänglich, 5–7 cm lang, Blüten goldgelb, 5–6 cm breit	mit Ballen	30–40 40–50	1,— 1,20	9,— 11,—	89,— 100,—

Ilex (L.) Stechpalme (Aquifoliaceae)

I.R.S. B.F.H.	<i>aquifolium</i> (L.), bekannte heimische Stechpalme oder Hülse, Blätter stachelig, Beeren korallenrot	mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125	5,20 8,— 10,— 15,—	47,— 72,— 90,— 135,—	425,— 650,— 819,— 1200,—
I.R.S. B.F.H.	<i>pyramidalis</i> (Dipp), mit ausgeglichener, pyramidalem Wuchs und leuchtend roten Früchten, ...	mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125 125–150	5,20 8,— 10,— 15,— 22,—	47,— 72,— 90,— 135,— 200,—	425,— 650,— 810,— 1200,—
H.I.R.S.	<i>J. C. van Tol</i> (Hort.) (I. <i>aquif. polycarpa</i> , Hendr.), mit pyramidalem Wuchs und fast stachellosen, glänzenden dunkelgrünen Blättern und sehr gutem Fruchtbehang	mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125 125–150	5,20 8,— 10,— 15,— 22,—	47,— 72,— 90,— 135,— 200,—	425,— 650,— 810,— 1200,—
H.I.R.St.	<i>crenata</i> (Thunb.) (I. <i>Fortunei</i>) (Hort.), 2–3 m hoch wachsender Strauch, Blätter kurz gestielt, elliptisch bis länglich lanzettlich, 2–3 cm lang, kerbig gesägt, dunkelgrün, Beeren schwarz	mit Ballen	40–60 60–80 80–100	5,20 8,— 10,—	47,— 72,— 90,—	425,— 650,— 810,—
B.F.I.Sch.	<i>glabra</i> (Gray.) (Prinus <i>glaber</i> , L.) bis 1,50 m hoch werdender, feinzweigiger, halbbimmergrüner Strauch	mit Ballen	40–60 60–80 80–100	5,20 8,— 10,—	47,— 72,— 90,—	425,— 650,— 810,—

Jasminum (L.) echter Jasmin (Oleaceae)

	<i>beesianum</i> (Forest & Diels.) bis 1,40 m hoch werdender, leicht schlingender Strauch mit leuchtend karminroten Blüten im Mai-Juni	mit Ballen	30–40 40–60	2,50 3,—	22,50 27,—	
St.	<i>nudiflorum</i> (Ldl.), bis 5 m hoher Strauch mit schlanken überhängenden Zweigen, Blätter dreizählig ei-länglich, Blüten gelb, einzeln, achselständig, bereits im Februar erscheinend, häufig als Spalierstrauch verwendet	mit Ballen	30–40 40–60 60–80	2,50 3,— 3,50	22,50 27,— 31,—	

Juglans (L.) Walnuß (Juglandaceae)

regia (L.) siehe Obstbäume

Kalmia (L.) Lorbeerrose (Ericaceae)

I.R.St.W.	<i>angustifolia</i> (L.), bis 1 m hoch werdend, Blätter kurz gestielt, länglich-lanzettlich, bis 6 cm lang werdend, oben frischgrün, Blüten purpur, 1 cm breit, in vielblütigen achselständigen Büscheln im Juni-Juli erscheinend	mit Ballen	20–30 30–40 40–60	3,— 4,— 6,—		
I.R.St.W.	<i>latifolia</i> (L.), 1–1,5 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch-lanzettlich, bis 10 cm lang werdend, oben dunkelgrün, Blüten 2–2,5 cm breit, karminrosa in großen Doldentrauben, Blütezeit Mai-Juni, mit Ballen		30–40 40–50 50–60	6,— 8,— 10,—	50,— 66,— 82,—	

Kerria Ranukelstrauch (Rosaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.S.	<i>japonica</i> (D. C.), bis 2 m hoch werdender Strauch, grünläuzend, Blätter ei-länglich bis 5 cm lang, doppelt gesägt, oben frischgrün, Blüten orange-gelb, einzeln 3-4 cm breit	40-60 60-80 60-80 80-100	1,50 1,75 5,- 6,-	13,50 16,-	120,- 140,-
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
H.S.	<i>flore pleno</i> (hort.) (K. pleniflora) (Witte), mit gefüllten gelben Blüten, Mai-Juni erscheinend	40-60 60-80 60-80 80-100	1,75 2,- 5,- 6,-	16,- 18,-	140,- 160,-
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Koelreuteria (Laxm.) Blasenbaum, (Koelreuteria-Sapindaceae)

paniculata (Laxm.) in China und Japan beheimateter bis 10 m hoch werdender Baum mit doppelt gefiederten 30 cm langen Blättern und fächerförmig ausgebreiteter Krone, gelbe, bis 30 cm lange Blütenrispen im Juli-August

60-100 2,50 22,50

Kolkwitzia (Graebn.) Kolkwitzie (Caprifoliaceae)

S.	<i>amabilis</i> (Graebn.), in China beheimateter, bis 2 m hoch werdender, schattenverträglicher Blütenstrauch im Mai-Juni mit glockigen, rosafarbenen Doldentrauben bedeckt	40-60 60-80 60-80 80-100 100-125	1,50 1,75 5,- 6,- 7,-	13,50 16,-	120,- 140,-
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Laburnum (Med.) Goldregen (Leguminosae)

R.S.	<i>alpinum</i> (Bercht & Prsl), Alpengoldregen bis 10 m hoch werdend, Zweige grün oder gelb-grün, Blätter gelappt, elliptisch-länglich, 4-7 cm lang. Blüten bis 1,5 cm lang in 25-30 cm langen hängenden Trauben, im Mai-Juni blühend	60-80 80-125	1,50 1,75	13,50 16,-	120,- 140,-
R.S.	<i>vulgare</i> (Bercht & Prsl) (<i>anagyroides</i>) (Med.) (<i>Cytisus laburn.</i>) (L.), gemeiner Goldregen bis 7 m hoch werdend, Zweige grau-grün. Blättchen elliptisch-länglich bis 8 cm lang, Blüten goldgelb in hängenden bis 30 cm langen Trauben. Mai-Juni blühend	80-100 100-150 150-200 125-150 150-200 125-150 150-175 175-200	1,20 1,50 1,75 5,- 6,- 6,- 8,- 9,-	11,- 13,50 16,-	100,- 120,- 140,-
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
	Halbstämme, Stammhöhe				
	Hochstämme, Stammhöhe				
R.S.	<i>vossii</i> (Boem), besonders reichblühend, Blüten kräftig goldgelb, 40-50 cm lange Trauben 2-4 Triebe 5-8 Triebe	80-125 100-150 125-150 150-200 125-150 150-175 175-200	4,- 6,- 10,- 15,- 7,50 9,- 11,-	36,- 54,-	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
	Halbstämme, Stammhöhe				
	Hochstämme, Stammhöhe				

Lavendula (L.) Lavendel (Labiatae)

J.St.	<i>officinalis</i> (Chaix) (L. vera) (D. C.) (L. angustifolia) (Ehrh.), echter Lavendel, immergrüner Zwergstrauch, Blätter linearförmig bis 5 cm lang, graufilzig, sehr aromatisch, Blüten lavendelblau, klein, in 3-6 cm langen quirligen Ähren, im Juli-August erscheinend	20-30	—,50	4,50	40,-
-------	--	-------	------	------	------

Ledum (L.) Sumpfpfornst (Ericaceae)

I.S.St.	<i>palustre</i> (L.), 1 m hoch werdender aufrechtwachsender Strauch, Blüte weiß in dichten Büscheln stehend, Blütezeit Mai-Juni, Blätter 1-4 cm lang .. mit Ballen	25-30 30-40	2,40 3,50	22,- 32,-	
---------	--	----------------	--------------	--------------	--

Lеспедеза (Mchz.) Buschkiee (Leguminosae)

	<i>bicolor</i> (Turcz.) in Nordchina beheimateter, bis 3 m hoch werdender Halbstrauch mit purpurroten Blüten im Juli-September.	60-100	2,50		
--	--	--------	------	--	--

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Lespedeza (Mch.) Buschklee (Leguminosae)					
	<i>formosa</i> (Koehne) (L. thunb. Nalkai, Desmondium penduliflorum, Ouden), in Nordchina beheimateter, bis 2 m hoher, überhängender Strauch mit 20 cm langen Blütenrispen im Spätsommer	60—100	2,50		
Leucothoe, Lorbeerkrüglein (Ericaceae)					
I.L.R.S.	<i>catesbaei</i> (Gray), immergrüner Strauch, bis 2 m hoch werdend, Blüte weiß	30—40 40—60 60—80	3,— 4,50 7,30	25,— 37,— 61,—	220,— 330,— 550,—
Ligustrum (L.) Rainweide (Oleaceae)					
e.H.I.R.	<i>iodense</i> (Hort.) (L. vulgare nanum) (Rehd.), Wuchs niedrig dicht, Blätter schmal elliptisch, tiefgrün, sehr lange haftend, im Winter bronzebraun	20—30 30—40 40—50 50—60	—,55 —,75 —,85 1,—	5,— 6,50 7,50 9,—	45,— 55,— 65,— 80,—
H.I.R.S.V.	<i>ovalifolium</i> (Hassk.) (L. californic.) (Hort.), wintergrüner Strauch, bis 5 m hoch werdend, straff aufrecht wachsend, Blätter elliptisch, oben glänzend dunkelgrün. Blüten in Rispen gelblich-weiß. Besonders wertvoll für Hecken	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
	2 j. b. St. 2—4 Triebe	30—50 50—80 80—100		9,— 11,— 15,—	80,— 100,— 135,—
	3jähr. Büsche 5—8 Triebe	50—80 80—100		25,— 30,—	225,— 270,—
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe	40—60 60—80 80—100		27,— 30,— 33,—	240,— 270,— 300,—
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe	60—80 80—100 100—125		36,— 40,— 50,—	330,— 360,— 440,—
F.H.R.V.	<i>vulgare</i> (L.), bis 5 m hoch werdender, wertvoller Schatten- und Heckenstrauch, Blätter ei-länglich bis lanzettlich. Blüten weiß in 4—6 cm langen Rispen. Frucht glänzend schwarz				
	2 j. b. St. 2—4 Triebe	30—50 50—80 80—100		9,— 11,— 15,—	80,— 100,— 135,—
	3jähr. Büsche 5—8 Triebe	50—80 80—100		25,— 30,—	225,— 270,—
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe	40—60 60—80 80—100		27,— 30,— 33,—	240,— 270,— 300,—
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe	60—80 80—100 100—125		36,— 40,— 50,—	330,— 360,— 440,—
H.I.R.S.V.	<i>vulgare atrovirens</i> (Späth), Wuchs sparrig, Blätter breit elliptisch, tief grün, im Winter tief purpurbraun und sehr lange haftend, fast immergrün				
	2 j. b. St. 2—4 Triebe	30—50 50—80 80—100		11,— 15,— 18,—	100,— 135,— 150,—
	3jähr. Büsche 5—8 Triebe	30—50 50—80 80—100		25,— 30,— 36,—	225,— 270,— 330,—
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe	40—60 60—80 80—100		36,— 40,— 44,—	330,— 360,— 400,—
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe	40—60 60—80 80—100		44,— 50,— 55,—	400,— 450,— 500,—
Liriodendron (L.) Tulpenbaum (Magnoliaceae)					
B.F.L.R.	<i>tulipifera</i> (L.), bis 60 m hoher Baum, Blätter lang gestielt, meist eckig gelappt, 7—20 cm lang, glänzend grün, im Herbst goldgelb, Blüten einzeln, tulpenartig, gelblichgrün, bis 6 cm breit. Blütezeit Mai-Juni, mit Ballen	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
		60—80 80—100 100—125 125—150	4,— 5,— 7,70 10,—	36,— 45,—	

Liquidambar (L.) Amberbaum (Hamamelidaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.L.R.	<i>styraciflua</i> (L.) bis 40 m hoch werdender, in Nordamerika beheimateter Baum mit rotbraunen korkigen Zweigen und dunkelgrünen, gelappten Blättern, mit tieferer Herbstfärbung	60—80 80—100 100—125	4,— 5,— 7,—	36,— 45,—	

Lonicera (L.) Heckenkirsche (Caprifoliaceae)

siehe auch unter Kletterpflanzen

B.H.R.S.	<i>amoena alba</i> (Zabl.), bis 4 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten	80—100	1,20	11,—	100,—
B.H.R.S.	<i>coerulea</i> (L.), bis 1,5 m hoher aufrecht wachsender Strauch. Zweige im Winter braunrot mit abblätternder Rinde. Winterknospen waagrecht, oft zu 4 nebeneinander. Blätter ei-rundlich bis länglich, frischgrün. Blüten gelblich-weiß, röhren-trichterförmig, 1,5 cm lang an kurzen, nickenden Stielen. Blütezeit April-Mai. Früchte rundlich, dunkelblau bereift	60—80 80—100	1,— 1,20	9,— 11,—	80,— 100,—
B.F.L.R. S.V.	<i>Ledebourii</i> (Esch), aufrecht wachsender bis 2 m hoher Strauch. Blätter länglich bis lanzettlich derb, 6—12 cm lang, oben dunkelgrün und etwas glänzend, Blüten tiefgelb, braunrot überlaufen, bis 2 cm lang, an aufrechten 2—4 cm langen Stielen. Früchte erbsengroß, schwarzrot	60—80 80—120	1,— 1,20	9,— 11,—	80,— 100,—
F.B.R.	<i>maackii</i> (Maxim.), breiter, aufrechtwachsender, in Korea beheimateter Strauch mit gelblichweißen Blüten im Mai und Juni, leuchtendroter Beerenbehang im Herbst Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	80—120 100—150	1,— 5,—	9,—	80,—
B.H.L. R.V.	<i>morrowii</i> (A. Gray), bis 2 m hoher, breit wachsender Strauch. Blätter elliptisch bis verkehrt ei-länglich, 3—5 cm lang, Blüten weiß, später gelblich, bis 1,5 cm lang. Früchte blutrot	80—125	1,—	9,—	80,—
	<i>nitida</i> (Wils.) niedriger, in Mittelchina beheimateter, schattenliebender Strauch mit kleiner, myrtenartiger Belaubung	20—30 30—40 40—50	1,20 1,70 2,—	11,— 13,50 16,50	100,— 120,— 150,—
e.F.H.I.R. St.W.	<i>pileata</i> (Oliv.), immergrüner, stark verzweigter und breit wachsender Strauch bis 30 cm hoch werdend. Blätter eiförmig bis länglich-lanzettlich, bis 1 cm lang werdend, oben glänzend dunkelgrün, Blüten blaßgelb, röhrig, trichterförmig, duftend. Früchte rundlich, purpurviolett	20—30 30—40 40—60	1,20 1,70 2,—	11,— 13,50 16,50	100,— 120,— 150,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	60—80 80—100	5,— 7,50		
e.F.H.I.R. St.W.	<i>yunnanensis</i> (Rhed.), kleiner immergrüner Strauch. Wuchs ähnlich <i>L. nitida</i> , in der Blattfarbe und Winterhärte jedoch der <i>L. pileata</i> sehr ähnelnd mit Ballen	20—30 30—40 40—60 60—80 80—100	1,20 1,70 2,— 5,— 7,50	11,— 13,50 16,50	100,— 120,— 150,—
B.F.H.R. S.V.	<i>tatarica</i> (L.), aufrecht wachsender bis 3 m hoher Strauch. Blätter eiförmig bis lanzettlich, oben dunkelgrün, Blüten hellrosa bis weiß im Mai-Juni. Frucht rundlich rot	60—80 80—125 100—150 150—200	—,65 —,85 4,— 5,—	6,— 7,50	55,— 65,—
B.F.H.R. S.V.	<i>xylostemum</i> (L.), bis 3 m hoher Strauch, breit aufrecht wachsend. Blätter breit eiförmig, oben dunkelgrün, Blüten gelblich-weiß, rötlich überlaufen. Früchte erbsengroß, dunkelrot	60—80 80—125 100—150 150—200	—,65 —,85 4,— 5,—	6,— 7,50	55,— 65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen				

Lycium (L.) Bocksdorn (Solanaceae)

B.F.R.H.V.	<i>halimifolium</i> (Mill) (<i>L. vulgare</i>) (Dun), bis 3 m hoher Strauch. Zweige schlank, zuerst aufrecht, später bogenförmig überhängend, hellgrau, meist dornig. Blätter länglich-lanzettlich, grau-grün. Blüten bis zu 4 zusammenstehend, purpurila. Frucht ei-länglich bis zu 2 cm lang, korallenrot	100—150 125—175	—,85 5,—	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen				

Magnolia (L.) Magnolie (Magnoliaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
kobus (Thunb.) baumartige, bis 10 m hohe, schneeweiß blühende Sorte im April-Mai vor dem Blattaussbruch blühend mit Ballen	60—80 80—100 100—125	5,50 8,— 10,—	50,— 72,— 90,—	
parviflora (S. & Z.) (M. sieboldii, K. Koch.) Sommerblüher mit zahlreichen, schneeweißen Blüten und rosa Staubgefäßen mit Ballen	60—80 80—100 100—125	12,— 15,— 20,—		
R. soulangeana (Soul.) (M. denudata × liliflora), bis 6 m hoch werdender Baum oder Strauch, Blätter verkehrt eiförmig, Blüten glockig, bis 10 cm lang, purpur bis weißlich, im Mai blühend mit Ballen	60—80 80—100 100—125 125—150	12,— 15,— 20,— 25,—		
soulangeana Hybriden wie:				
alba superba , (Graebn.) eine sehr frühe, weißblühende Spielart der Sorte soulangeana mit Ballen				
alexandrina , eine rosa Sorte der Stammform mit weißer Mitte mit Ballen				
amabilis (Hendr.), sehr großblumig, weiß mit Ballen	60—80 80—100 100—125 125—150	12,— 15,— 20,— 25,—		
Lennei (Rehd.) (M. Mennei) (Topf), Blätter breit, eiförmig, Blüten außen purpurrosa, innen weiß mit Ballen				
nigra (Nichols.) lange, schmale, tiefrosa Blüten, später Blüher mit Ballen				
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	80—100 100—125 125—150 150—175	22,— 30,— 38,— 45,—		
stellata (Maxim) (M. Halleana) (Hort.), niedriger, bis 2 m hoch werdender reich verzweigter Strauch, Blätter schmal elliptisch, bis 10 cm lang, oben tiefgrün, Blüten schon an ganz jungen Pflanzen, schalenförmig, weiß, wohlriechend. Blütezeit März-April. Außerordentlich reichblühend mit Ballen	40—60 60—80 80—100 80—100 100—125 125—150	12,— 15,— 20,— 28,— 35,— 43,—		
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Mahonia (Nutt) Mahonie (Berberidaceae)

F.B.H.I.	aquifolium (Nutt.) (Berberis aquifolia) (Pursh), bekannte,	20—30	—,75	6,50	60,—
L.R.S.St.V.	gemeine Mahonie, mit gelben Blüten und blau-schwarzen Früchten	30—40 40—50	—,90 1,15	8,— 10,—	70,— 90,—
	Büschen mit Ballen	30—40 40—50	1,35 1,50	12,— 14,—	110,— 125,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	50—60 60—80 80—100	5,— 6,— 8,—		
	einmal verschulte Pflanzen siehe unter Junggehölzen				

Malus (Mill.) Apfel (Rosaceae)

B.e.F.V.	Zierapfel oder Kirschapfel in schönblühenden und schönfrüchtigen Sorten, deren Früchte zu Gelee verarbeitet werden können.				
	adstringens Hopa (Hort.), blüht hellrosa, sehr reichblühend	100—125	2,50	22,50	200,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	125—150 150—200	6,— 7,—		
	Halbstämme, Stammhöhe	125—150	3,60	33,—	300,—
	Hochstämme, Stammhöhe	175—200	5,—	45,—	400,—
	baccata fructo flavo (Hort.), Früchte im Herbst gelb ..	100—125	2,50	22,50	200,—
	Halbstämme, Stammhöhe	125—150	3,60	33,—	300,—
	Hochstämme, Stammhöhe	175—200	5,—	45,—	400,—
	John Downing (Hort.), Frucht gelb und rot	100—125	2,50	22,50	200,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	125—150 150—200	6,— 7,—		
	Halbstämme, Stammhöhe	125—150	3,60	33,—	300,—
	Hochstämme, Stammhöhe	175—200	5,—	45,—	400,—

Malus (Mill.) Apfel (Rosaceae)

kaido in Japan beheimateter, kleiner aufrechtwachsender Baum mit bis 4 cm breiten im April-Mai erscheinenden Blüten. Die kugelige Frucht ist 1,5 cm breit und rot

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	3,60	33,—	300,—
175—200	5,—	45,—	400,—

The Fairy (Hort.), Früchte scharlachrot, haften bis weit in den Winter hinein

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	3,60	33,—	300,—
175—200	5,—	45,—	400,—

floribunda arnoldiana (Rehd.), Blüte groß, blaßrosa, Früchte gelb

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen

100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	6,—		
150—200	7,—		

micromalus (Mak.) (Kaido), Blüten rosa, Knospen karmin, Früchte rot

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	3,60	33,—	300,—
175—200	5,—	45,—	400,—

prunifolia rinki (Rehd.) (M. ringo) (Carr.), Blüten zartrosa

100—125	2,50	22,50	200,—
---------	------	-------	-------

pumila (Mill.) communis (DC), heimischer Wildapfel, Früchte hellgelb, kugelig

100—125	—,75	6,50	60,—
---------	------	------	------

pendula Elise Rathke, Trauerzierapfel, breite Krone, überhängender Trauerbaum mit zartrosaweißen Blüten im Mai

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

125—150	3,60	33,—	300,—
175—200	5,—	45,—	400,—

Aldenham purple (Hort.), mit rötlichen Blättern, tiefroten Blüten und purpurroter Frucht

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen

100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	6,—		
150—200	7,—		

purpurea aldenhamensis (Rehd.), Blüten halbgefüllt, weinrot, Frucht rundlich, tiefrot

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

100—125	2,50	22,50	200,—
125—150	3,60	33,—	300,—
175—200	5,—	45,—	400,—

eleyi (Rehd.), Holz und Belaubung dunkelrot, Blüten weinrot, Frucht bis 2,5 cm groß, dunkelpurpur

100—125	2,50	22,50	200,—
---------	------	-------	-------

sargentii (Rehd.), niedrig bleibender, wertvoller, männlich gewachsener Strauch mit reinweißen Blütendolden

70—100	2,50	22,50	200,—
--------	------	-------	-------

Scheideckeri (Zabl.), Blüten hellrosa, Knospen dunkelrosa, halb gefüllt, Früchte kirschgroß

100—125	2,50	22,50	200,—
---------	------	-------	-------

Veitch scarlet (Hort.), Blüten weiß, große scharlachrote Früchte

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen

Halbstämme, Stammhöhe
Hochstämme, Stammhöhe

100—125	2,50	22,50	200,—
100—150	6,—		
150—200	7,—		

yunnanensis (C. Schn.), Zweige filzig, Blüten weiß in dichten, vielblütigen Doldentrauben, Frucht fast kugelig, rot punktiert

100—125	2,50	22,50	200,—
---------	------	-------	-------

Morus (L.) Maulbeere (Moraceae)

H.R. alba (L.), weiße Maulbeere, bis 15 m hoch werdend, Blätter breit, eiförmig zugespitzt, 6—12 cm lang, grob gezähnt, oben hellgrün, braucht warme, sonnige Lage. Das Laub dient als Futter der Seidenraupe

60—80	1,—	9,—	80,—
80—125	1,20	11,—	100,—

Nepeta (L.) (Labiatae)

H. Mussini (Spreng.), Laub blaugrau, violett-rote Blüten, außerordentlich reichblühend, gute Einfassungspflanze

20—30	—,45	4,—	35,—
-------	------	-----	------

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Osmanthus (Lour.) Duftblüte (Oleaceae)					
	<i>illicifolius</i> (Mouill.) in Japan beheimateter, bis 6 m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch mit glän- zend dunkelroten Blättern im Juni-Juli mit Ballen	30—40 40—50	4,— 5,—	32,— 40,—	
Pachysandra (Mchx) (Buxaceae)					
I.St.	<i>terminalis</i> (Sieb. et Zucc.), vorzügliche Schattenpflanze mit lederartiger grüner Belaubung, bis 30 cm hoch werdend	3—5 Tr. 6—8 Tr.	—,85 1,10	7,— 9,—	65,— 80,—
Parrotia (G. A. M.) Parrotie (Hamamelidaceae)					
L.	<i>persica</i> (A.M.) malerisch wachsender, bis 5 m hoch weidender baumartiger Strauch mit platanenartiger Rinde, in Nordpersien beheimatet mit Ballen	60—80	7,—		
Pernettya (Gaud.) Torfmyrte (Ericaceae)					
F.I.St.Sch.	<i>mucronata alba</i> (Gaud.) in China beheimateter, bis 1,50 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit stachelspit- zigen Blättern, blüht im Mai bis Juni mit einzeln stehenden, weiß bis rosa Blüten und wirkt zierend mit seinen bis 12 mm dicken, weißen Früchten.				
	ohne Beeren, mit Ballen	20—30	2,50	20,—	
	mit Beeren, mit Ballen	20—30 30—40 40—50	3,— 3,60 4,80	25,— 30,— 40,—	
F.I.St.Sch.	<i>purpurea</i> (Voss.) unterscheidet sich von <i>mucronata</i> <i>alba</i> durch rote dicke Früchte				
	ohne Beeren, mit Ballen	30—40 40—50	3,— 4,—	25,— 32,—	
	mit Beeren, mit Ballen	30—40 40—50	3,60 4,80	30,— 40,—	
Phellodendron (Rupr.) Korkbaum — (Rutaceae)					
	<i>amurense</i> (Rupr.) In der Mandchurei beheimateter, malerischer, flachkroniger Korkbaum mit korkiger Rinde und gesunden gefiederten Blättern	100—125 125—150 150—200 200—250	2,25 2,75 3,60 4,40	20,— 25,— 35,— 40,—	180,— 225,— 300,— 360,—
Philadelphus (L.) Pfeifenstrauch (Saxifragaceae)					
a) hochwachsende Sorten:					
B.H.R.S.	<i>coronarius</i> (L.), bis 3 m hoch werdender Strauch, Rinde dunkelbraun, abblätternd, Blätter ei-länglich, zuge- spitzt, Blüten bis 3 cm breit, rahmweiß, stark duftend, in 6—8blütigen Trauben. Blütezeit Ende Mai-Juni. . .	100—150	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . .	100—150	4,—		
	mit Ballen	150—200	5,—		
B.H.R.S.V.	<i>gordonianus</i> , (Lind.), Zweige leicht behaart, Rinde grau- gelb, nicht abblätternd, Blätter eiförmig, zugespitzt, grob gezähnt, Blüten weiß, 3—4,5 cm breit, etwas duftend in 7—9blütigen dichten Trauben	100—150	—,85	7,50	65,—
B.H.R.S.V.	<i>inodorus grandiflorus</i> (Gray) (P. <i>grandiflorus</i>) (Wild), bis 3 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch zugespitzt, oben stumpfgrün, Blüten 4—4,5 cm breit, duftlos	100—150	—,85	7,50	65,—
B.H.R.S.V.	<i>pubescens</i> (Loisl.) (P. <i>latifolius</i>) (Schr.) (P. <i>grandiflo- rus floribundus</i>) (Gray), 3—4 m hoch werdender Strauch, Zweige hellgrau berindet, Blätter ei-elliptisch, oben lebhaft grün, Blüten 3—4 cm breit, duftlos, in 5—9blütigen Trauben	100—150	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . .	100—150	4,—		
	mit Ballen	150—200	5,—		
b) mittelhoch wachsende Sorten:					
B.H.R.S.V.	<i>lemoinei erectus</i> (Lem.), Zweige straff aufrecht, im Alter überhängend, Blätter ziemlich klein, dunkelgrün, Blü- ten reinweiß bis 3 cm breit	60—100 80—100 100—125	1,— 5,— 6,50	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . .				
	mit Ballen				
B.H.R.S.	<i>virginalis</i> (Rehd.) (<i>virginal</i>) (hort.), kräftig aufrecht- wachsend. Zweige lang überhängend. Rinde braun bis grau-braun, wenig abblätternd. Blätter spitz-oval, oben dunkelgrün. Blüten schalenförmig, gefüllt, reinweiß, duftend, 5—6 cm breit, in 5—7blütigen Trauben . . .	80—125 100—150 150—200	1,20 5,— 6,50	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . .				
	mit Ballen				

Philadelphus (L.) Pfeifenstrauch (Saxifragaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.R.S.	Bouquet blanc (hort.), aufrecht wachsend, bis 1,5 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen, Blüten milchweiß, sehr reichblühend	60—100	1,20	11,—	100,—
H.R.S.	girandol (hort.), nicht ganz so hoch werdend wie <i>virginialis</i> , Blüten dichtgefüllt, 5 cm breit, milchweiß, in dichten 7—10blütigen Trauben, sehr blühwillig schon als junge Pflanze	60—100	1,20	11,—	100,—
c) niedrig bleibende Sorten:					
H.R.S.St.	coronarius aureus (Rehd.), Blätter besonders im Austrieb gelb, später grünlich-gelb	40—60	1,20	11,—	100,—
H.R.S.St.	lemoncel Avalanche (hort.), Zweige schlank, bogig überhängend Blätter hellgrün, klein bis mittelgroß, Blüten milchweiß, sehr reichblühend	40—60	1,20	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	70—100	5,—		
	mit Ballen	100—125	6,50		
H.R.S.St.	Dame blanche (Lem.), Wuchs gedrungen, aufrecht, Blätter mittelgroß, hellgrün, Blüten milchweiß, leicht gefüllt Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	50—70	1,20	11,—	100,—
	mit Ballen	70—100	5,—		
		100—125	6,50		
H.R.S.St.	Manteau d'hermine (Lem.) (<i>Ochroleucus</i>), Wuchs dicht, rundlich, Zweige schlank überhängend, Blätter klein, lebhaft grün, Blüten reinweiß, halb bis ganz gefüllt	40—60	1,20	11,—	100,—

Physocarpus (Maxim) Blasenspiere (Rosaceae)

H.S.V.	opulifolius (Maxim) (<i>Spirea opulifolia</i>) (L.), bis 3 m hoher Strauch, Blätter ei-rundlich, meist fünflappig, Blüten weiß bis rötlich in vielblütigen etwa 5 cm breiten Doldentrauben	125—175	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100—150	4,—		
	mit Ballen	150—200	5,—		
H.L.V.	luteus (Zahl) (<i>Spirea opulifolia lutea</i>) (Kirchn.), Blätter anfangs lebhaft gelb, schließlich gelb-grün	100—150	—,85	7,50	65,—

Pirus (L.) Birne (Rosaceae)

B.F.H.V.	communis (L.), heimische Wildbirne	80—100	—,85	7,50	65,—
----------	---	--------	------	------	------

Platanus (L.) Platane (Platanaceae)

F.L.R.	acerifolia (Willd.) (<i>Pl. occidentalis</i> × <i>orientalis</i>), Zweige weitausladend, Borke in großen Platten ablösend, Blätter im Grunde abgestutzt bis herzförmig, 12—25 cm breit, 3—5lappig, Lappen 3eckig	125—150	1,80	16,50	150,—
		150—200	2,25	20,—	180,—
		200—250	2,75	25,—	225,—
		250—300	3,60	33,—	300,—
	Alleebäume, Stammumfang	8—10	6,—	55,—	500,—
		10—12	7,25	66,—	600,—
		12—14	8,50	77,—	700,—
		14—16	11,—	100,—	900,—
	dreimal in extra weitem Stand verpflanzt	10—12	10,—		
		12—14	14,—		
		14—16	16,50		
		16—18	22,—		

Populus (L.) Pappel (Salicaceae)

L.R.	alba nivea (Alt.), Silberpappel. Mit gelappten, unten dicht schneeweiß filzigen Blättern, bis 35 m hoch werdend, 2× verpflanzte Heister aus weitem Stand	125—150	1,50	13,50	125,—
		150—200	1,80	16,50	150,—
		200—250	2,25	20,—	180,—
		250—300	2,75	25,—	225,—
		300—350	3,60	33,—	300,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	200—250	4,50		
	mit Ballen	250—300	5,50		
		300—350	7,—		
		350—400	8,50		
	Alleebäume, Stammumfang	10—12	6,—	55,—	500,—
		12—14	7,25	66,—	600,—
L.R.	pyramidalis (Bge.) (<i>P. alba Bolleana</i>) (Lauche), Pyramiden-Silberpappel, Wuchs schmal pyramidal	125—150	3,—	27,—	
		150—200	4,—	36,—	
		200—250	6,—	54,—	
		250—300	8,—	72,—	

Populus (L.) Pappel (Salicaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.R.	<i>angulata cordata robusta</i> (hort.) (P. robusta) (C. Schneid.), sehr rasch wachsender Baum mit aufstrebenden stark kantigen Zweigen, Blätter breit, spitz, dreieckig ge- kerbt 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand .. Alleebäume, Stammumfang	125-150 150-200 200-250 250-300 8-10 10-12 12-14 14-16	1,— 1,25 1,50 1,90 3,30 4,— 5,50 6,—	9,— 11,— 13,50 17,— 30,— 36,— 50,— 55,—	80,— 100,— 125,— 150,— 270,— 330,— 450,— 500,—
	<i>bacheleri</i> Kreuzung von Bachelier, Metz., geradschäf- tiger, hervorragender Robusta-Typ mit guten Wuchs- leistungen und Holzeigenschaften 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125-150 150-200 200-250 250-300	1,— 1,25 1,50 1,90	9,— 11,— 13,50 17,—	80,— 100,— 125,— 150,—
	<i>vernubens</i> (Henry) geradschäftiger Robusta-Typ mit denselben Eigenschaften wie bacheleri, besonders für trockene Böden geeignet 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125-150 150-200 200-250 250-300	1,— 1,25 1,50 1,90	9,— 11,— 13,50 17,—	80,— 100,— 125,— 150,—
	<i>balsamifera</i> (L.) (P. monilifera) (Ait.) (P. deltoidea) (Bartr.) (P. tacamahaca) (Mill.). Balsampappel. Bis 30 m hoher breitkroniger Baum. Blätter eiförmig dreieckig, 7-12 cm lang, oben lebhaft grün. 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125-150 150-200 200-250 250-300 8-10 10-12 12-14	1,— 1,25 1,50 1,90 3,30 4,— 5,50	9,— 11,— 13,50 17,— 30,— 36,— 50,—	80,— 100,— 125,— 150,— 270,— 330,— 450,—
	Alleebäume, Stammumfang				
	<i>berolinensis</i> (Dipp.) (P. laurifolia × nigra italica). Ber- liner Lorbeerpappel. Bis 25 m hoch werdend, säulen- förmig, Äste aufstrebend, etwas kantig, gelb-grau. Winterknospen grünlich, klebrig. Blätter spitz eiför- mig, 8-12 cm lang, kerbig gesägt, oben dunkelgrün 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125-150 150-200 200-250 250-300 150-200 200-250 250-300 300-350 8-10 10-12 12-14 14-16	1,— 1,25 1,50 1,90 1,60 1,80 3,40 4,80 3,30 4,— 5,50 6,—	9,— 11,— 13,50 17,— 14,50 16,50 27,— 44,— 30,— 36,— 50,— 55,—	80,— 100,— 125,— 150,— 130,— 150,— 250,— 400,— 270,— 330,— 450,— 500,—
	Alleebäume, Stammumfang				
	<i>canadensis</i> (Mnch.) (P. balsamifera × nigra), schnell- wüchsiger bis 45 m hoch werdender Baum mit auf- strebender Krone. Winterknospen klebrig. Blätter dre- eckig 7-10 cm lang, kerbig gesägt, oben bläulich- grün, 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand .. Alleebäume, Stammumfang	125-150 150-200 200-250 250-300 7-8 8-10 10-12 12-14 14-16	1,— 1,25 1,50 1,90 2,70 3,30 4,— 5,50 6,—	9,— 11,— 13,50 17,— 25,— 30,— 36,— 50,— 55,—	80,— 100,— 125,— 150,— 220,— 270,— 330,— 450,— 500,—
	<i>nigra</i> (L.), bekannte Schwarzpappel. Bis 30 m hoch werdend, Krone locker, breit ausladend, Winter- knospen klebrig. Blätter ei-rhombisch, lang, zugespitzt, fein kerbig gesägt	125-150 150-200 200-250	1,50 1,80 2,25	13,50 16,50 20,—	125,— 150,— 180,—
	<i>nigra pyramidalis</i> (Spach) (P. italica) (Dur.) (P. nigra fastigiata) (Dest) (P. dilatata) (Ait.), italien. Pyramiden- pappel. Bekannter Zier- und Straßenbaum, auch als hohe Einfriedigung und als Baumwand geeignet, Wuchs säulenförmig oder schmal pyramidal. 2 × ver- pflanzte Heister aus weitem Stand	125-150 150-200 200-250 200-250 250-300 300-350 350-400 8-10 10-12 12-14	1,50 1,80 2,25 1,80 3,40 4,80 8,— 5,— 6,— 7,25	13,50 16,50 20,— 16,50 27,— 44,— 72,— 45,— 55,— 66,—	125,— 150,— 180,— 150,— 250,— 400,— 400,— 400,— 500,— 500,—
	Alleebäume, Stammumfang				
	<i>simonii</i> (Carr.), 12-15 m hoher schmalkroniger Baum. Sehr früh austreibend. Winterknospen spitz, klebrig. Blätter elliptisch, 6-12 cm lang, kerbig gesägt, oben frisch grün	125-150 150-200 200-250 250-300 8-10 10-12 12-14	1,50 1,80 2,25 2,75 6,— 7,25 8,50	13,50 16,50 20,— 25,— 55,— 66,— 77,—	125,— 150,— 180,— 225,— 500,— 600,— 700,—
	Alleebäume, Stammumfang				

Populus (L.) Pappel (Salicaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R.B.V.	<i>tremula</i> (L.), Zitterpappel, Baum bis 30 m hoch, Krone rundlich, Borke glatt, graugelb, später rissig und schwarz-grau, Winterknospen klebrig, Blätter eiförmig, buchtig, kerbig gezähnt, 3–8 cm lang, Kätzchen 8–10 cm lang	100–125 125–150 150–200 200–250 250–300	1,80 2,25 2,75 3,60 4,40	16,50 20,— 25,— 33,— 40,—	150,— 180,— 225,— 390,— 360,—
B.R.	Hochstämme, Stammumfang	8–10 10–12	7,25 8,50	65,— 77,—	600,— 700,—
	<i>trichocarpa</i> (Torr. et Gray), Westliche Balsampappel, Krone breit aufstrebend, junge Zweige leicht kantig, olivbraun, Blätter breit eiförmig 8–10 cm lang, fein kerbig gesägt, oben dunkelgrün	150–200 200–250 250–300	1,25 1,50 1,90	11,— 13,50 17,—	109,— 125,— 150,—

Potentilla (L.) Fingerkraut (Rosaceae)

St.B.H.	<i>fruticosa</i> (L.), bis 1 m hochwerdender, aufrechtwachsender, feinblättriger Strauch, Blättchen elliptisch, 1–3 cm lang, Blüten leuchtendgelb, einzeln oder zu wenigen stehend, Blütezeit Mai–August	40–60 60–80 60–80 80–100	—,85 1,— 5,— 6,50	7,50 9,—	65,— 80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
St.B.H.	<i>farrerri</i> (hort.), bis 3 cm große goldgelbe Blüten	40–60 60–80	1,— 5,—	9,—	30,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
St.B.H.	<i>friedrichsenii</i> (Rehd.) (P. Friedrichsenii) (Spaeth) (P. dahurica × <i>fruticosa</i>), Blätter ziemlich groß, hellgrün, Blüten hellgelb	40–60	1,—	9,—	30,—
St.B.e.	<i>mandschurica</i> (Maxim.), niederliegend, Blättchen klein, dicht seidig behaart, Blüten weiß	20–40	1,50	13,50	
	mit Ballen				
St.B.H.	<i>parvifolia</i> (Wolf), schwachwachsend, Blätter schmal elliptisch, Blüten hellgelb	40–60 60–80 80–100	1,— 5,— 6,50	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
St.B.H.	<i>purdumii</i> (Rehd.), aufrechtwachsend, Blättchen oben hellgrün, Blüten hellgelb, Rückseite weiß	40–60	1,—	9,—	80,—

Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln (Rosaceae)

B.H.F.V.	<i>avium</i> (L.), heimische Vogel- der Wildkirsche.	125–150 150–200 200–250	1,50 1,80 2,25	13,50 16,50 20,—	125,— 150,— 180,—
	2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	8–10 10–12	5,— 6,—	45,— 55,—	400,— 500,—
	Hochstämme, Stammumfang				
B.H.R.F.V.	<i>cerasifera</i> (Ehrh.) (P. myrobalana) (Loisl.) Kirschpflaume. Bis 8 m hoher Baum, Blätter elliptisch, fein stumpf gesägt, spitz hellgrün, Blüten weiß, meist einzeln, Frucht fast kugelig, rot, 2–3 cm lang	80–125 125–150	—,85 1,—	7,50 9,—	65,— 90,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	150–200	5,—		
B.e.H.L.	<i>Pissardii</i> (Bayley) (P. Pissardii) (Carr) (<i>cerasifera atropurpurea</i> (Jaeg.), Blätter dunkelrot, Blüten rosa, Frucht dunkelrot	100–150 125–150 175–200	2,25 3,60 5,—	20,— 33,— 45,—	180,— 300,— 400,—
	Halbstämme, Stammhöhe				
B.H.e.L.	<i>blireana</i> (Lem.) (Pr. <i>blireana</i>) (André) (P. <i>cerasifera</i> × <i>mume</i>), Blätter breiter eiförmig, als bei Pissardii, Blätter halb gefüllt, hübsch rosa	100–150	2,25	20,—	180,—
B.e.H.L.	<i>nigra</i> (Hort. Gall) (Pr. <i>ceras. nigra</i>) (Bayley), Laub tief dunkelpurpur, Verbesserung der Pissardii	100–150 125–150 175–200	2,25 3,60 5,—	20,— 33,— 45,—	180,— 300,— 400,—
	Halbstämme, Stammhöhe				
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	150–200	6,—		
St.	<i>glandulosa albiplena</i> (Koehe) (P. <i>jap. albo plena</i>) (hort.) (P. <i>sinensis albo plena</i>) (hort.), bis 1,5 m hoch werdender Strauch, Blätter eiförmig bis lanzettlich spitz, feinkerbig gesägt, Blüten zu 1–2 stehend, weiß gefüllt, Blütezeit Mai, Für Treibereien sehr geeignet	40–60 80–100 100–125	2,25 6,— 8,—	20,—	180,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				

Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln (Rosaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.H.I.R. S.St.	laurocerasus caucasica (Zbl.). Kirschlorbeer. Strauch oder Baum, bis 6 m hoch werdend, Blätter länglich b's verkehrt eiförmig, bis 15 cm lang, zugespitzt, oberseits glänzd. dunkelgrün, verträgt Schatten mit Ballen Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,— 3,70 6,— 9,60 14,— 20,—	25,— 31,— 50,— 80,—	225,— 280,— 450,— 725,—
I.R.S.St.	macrophylla (Hort.), eine kräftige, breitwachsende, sich durch hohe Frosthärte auszeichnende Pflanze mit glänzend dunkelgrüner Belaubung mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100	3,30 4,30 6,60 10,50	27,50 36,— 55,— 88,—	250,— 320,— 500,— 890,—
F.H.I.R. S.St.	reynvanii (Hendr.), Wuchs kräftig straff aufrecht, grobblättrig mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100	3,— 3,70 6,— 9,60	25,— 31,— 50,— 80,—	225,— 280,— 450,— 725,—
F.H.I.R. S.St.	schipkaensis (Zbl.), Wuchs strauchig bis 2 m hoch werdend, Blätter bis 10 cm lang, länglich-elliptisch, oberseits glänzend dunkelgrün, derb, besonders, winterhart verträgt Schatten mit Ballen Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	3,— 3,70 6,— 9,60 14,— 20,— 30,—	25,— 31,— 50,— 80,—	225,— 280,— 450,— 725,—
F.H.I.R. S.St.	zabeliana (Späth.), Wuchs flach ausgebreitet, Blätter länglich-lanzettlich mit Ballen	30—40 40—60 60—80 80—100	3,30 4,30 6,60 10,50	27,50 36,— 55,— 88,—	250,— 320,— 500,— 800,—
F.H.B.S.V.	mahaleb (L.). Steinweichsel. Bis 10 m hoher Baum mit sparrigen überhängenden Zweigen, Blätter breit eiförmig, stumpf zugespitzt, oberseits glänzend grün, Blüten weiß, wohlriechend, zu 6—10 in Doldentrauben. Frucht rundlich schwarz. Das Holz ist wohlriechend	60—100	—,85	7,50	65,—
	myrobalana siehe <i>Pr. cerasifera</i>				
B.F.S.H.V.	padus (L.) (<i>Pr. racemosa</i>) (Lam.). Faulbaum, Traubenkirsche. Bis 15 m hoher Baum, Krone dicht, etwas überhängend. Blätter elliptisch, plötzlich zugespitzt, scharf gesägt, oberseits dunkelgrün, Blüten weiß, wohlriechend, zu 15—20 in lockeren, hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai. Frucht kugelig, erbsengroß, schwarz mit Ballen Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	60—80 80—100 100—150 150—200 7—8 8—10	1,20 1,50 5,— 6,50 10,— 12,—	11,— 13,50	100,— 120,—
	Hochstämme, Stammumfang				
	persica albiplena (E. Schn.) (<i>Amygdalus persica alba plena</i>) (L.), bis 4 m hoch werdender Zierpfirsich, Blätter lanzettlich gesägt, Blüten meist einzeln fast sitzend, weiß gefüllt. Blütezeit April-Mai	80—100	4,—	36,—	
	persica rosea plena Clara Mayer (Hort.) (<i>Amygdalus persica Clara Mayer</i>) (Hort.), Blüten rosarot, regelmäßig gefüllt	80—100	4,—	36,—	
	rubra plena (hort.) (<i>Amygdalus persica rubra plena</i>) (hort.), Blüten leuchtend rot, gefüllt, von sehr großer Schönheit	80—100	4,—	36,—	
	Pissartii , Blutpflaume, siehe <i>Prunus cerasifera</i> Pissartii.				
F.B.S.H.V.	serotina (Ehrh.), spät blühende Traubenkirsche, Baum bis 20 m hoch, Krone locker, schmal, Blätter länglich zugespitzt, feinkerbig gesägt, derb, oberseits glänzend dunkelgrün, Blüten weiß in 10—14 cm langer walzenförmiger Traube. Blütezeit Mai-Juni, Frucht kugelig schwarz mit Ballen Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ... mit Ballen	60—80 80—125 100—150 150—200	—,60 —,85 4,— 5,—	5,50 7,50	50,— 65,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln (Rosaceae)					
B.	<i>serrulata</i> Hisakura (Koehne). Japanische Blütenkirsche. Mittelhoher Baum, Blätter eiförmig zugespitzt, scharf gesägt, oberseits dunkelgrün. Blüten zu 3–5 zusammen, rosa rosettenförmig gefüllt, Blütenstiele sehr lang. Wohl die bekannteste japanische Kirsche. Sehr wertvoll.				
	3–4 Triebe	80–100	2,75	25,—	225,—
	5–8 Triebe	100–140	3,75	34,—	300,—
	Halbstämme, Stammhöhe	125–150	3,60	33,—	300,—
	Hochstämme, Stammhöhe	175–200	5,—	45,—	400,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–150	5,—		
	mit Ballen	150–200	8,—		
		200–250	17,—		
H.Tr.B	<i>shidare sakura</i> (Koehne) (Pr. serr. rosea) (Wills). Aste stark hängend, dünn, Blüten zartrosa, sehr dicht gefüllt in Büscheln zu 4–6. Blütezeit Mai. Die beste aller Hängekirschen	60–100	4,50	40,—	
		100–150	5,50	50,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	125–150	8,—		
	mit Ballen	150–175	10,—		
	Halbstämme, Stammhöhe	125–150	3,60	33,—	300,—
	Hochstämme, Stammhöhe	175–200	5,—	45,—	400,—
	<i>sinensis alba pleno</i> siehe Pr. glandulosa albiplena				
B.F.H.R.V.	<i>spinosa</i> (L.), bekannte heimische Schlehe. Verzweigter dorniger Strauch. Blätter klein, eiförmig, fein gesägt. Blüten bereits im April erscheinend, weiß. Gutes Vogelschutzgehölz	40–60	—,60	5,50	50,—
		60–100	—,85	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	100–125	5,—		
	mit Ballen	125–150	6,—		
St.	<i>triloba plena</i> (Dipp.) (<i>triloba multiplex</i>) (Rehd.). Mandelbäumchen, Strauch oder kleiner Baum, Blätter breit elliptisch, dop. gesägt, sattgrün. Blüten lebhaft rosa, dicht gefüllt, in den Gärten sehr häufig anzutreffen				
	Büsche 3–5 Triebe		1,75	16,—	140,—
	Büsche 5–8 Triebe		2,25	20,—	180,—
	Büsche 8–12 Triebe		3,—	25,—	220,—
	Treibsträucher extra stark ..				
	Halbstämme, Stammhöhe	60–80	3,50	32,—	
		80–100	4,—	36,—	
		100–120	4,80	42,—	
		120–140	5,50	50,—	
		140–160	6,60		
Ptelea Lederblume, Kleeulme, Hopf-netrauch (Rutaceae)					
	<i>trifoliata</i> aromatisch, glänzend grüner Strauch mit ulmenähnlichen Früchten	80–125	1,20	11,—	100,—
Pterocarya (Knuth) Flügelnuß (Juglandaceae)					
F.	<i>fraxinifolia</i> (Spach.) (P. caucasica) (C. A. Mey), über 20 m hoher Baum, Borke schwarzgrau, tief gefurcht, Blätter 20–50 cm lang, Blättchen eilängl'ch zugespitzt, Frucht ein halbkreisförmig, geflügeltes Nüßchen	150–200	2,75	25,—	225,—
		200–250	3,60	33,—	300,—
		250–300	4,40	40,—	360,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	150–200	4,—		
		200–250	6,—		
	mit Ballen	250–300	10,—		
Pyracantha (Roem) Feuerdorn (Rosaceae)					
F.H.I.St.V.	<i>coccinea</i> (Roem) (<i>Crataegus pyracantha</i>) (barkh.) (Cotoneaster pyrac.) (Spach), bis 3 m hoher dicht und sparrig wachsender Strauch. Blätter fast immergrün, elliptisch bis lanzettlich, 2–4 cm lang, oben dunkelgrün glänzend. Blüten in 3–4 cm breiten Doldentrauben. Blütezeit Mai–Juni, Frucht 5–6 mm dick, scharlachrot, sehr reich fruchtend	20–30	2,—	16,—	140,—
	mit Topfballen	30–40	2,40	20,—	180,—
		40–60	3,30	27,—	240,—
		60–80	4,—	33,—	300,—
F.H.I.St.	Kasan (Hort.) starkwüchsige, winterharte Sorte, die bis 4 m hoch wird	20–30	2,—	16,—	140,—
	mit Topfballen	30–40	2,40	20,—	180,—
		40–60	3,30	27,—	240,—
		60–80	4,—	33,—	300,—
F.H.I.St.	<i>landi major</i> (Dipp.), mit großen, leuchtend roten Früchten und guter Winterhärte	20–30	2,—	16,—	140,—
	mit Topfballen	30–40	2,40	20,—	180,—
		40–60	3,30	27,—	240,—
		60–80	4,—	33,—	300,—

Quercus (L.) Eiche (Fagaceae)

palustris (L.) Sumpfeiche, bis 25 m hoch werdender Laubbaum mit prächtiger Herbstfärbung, 2 × verpfl. Heister aus weitem Stand

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
150—200	2,75	25,—	225,—
200—250	3,60	33,—	300,—

B.F.H.

pedunculata (Ehrh.) (Qu. robur) (L.), Stieleiche, bekannte heimische Eiche, 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand

100—125	1,80	16,50	150,—
125—150	2,25	20,—	180,—
150—200	2,75	25,—	225,—
200—250	3,60	33,—	300,—
250—300	4,40	40,—	360,—

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen

200—250	10,—		
250—300	16,—		
300—350	28,—		
350—400	45,—		
400—450	60,—		

Hochstämme, Stammumfang mit Ballen 25 % Aufschlag

8—10	8,50		700,—
10—12	11,—	100,—	900,—

Alleebäume, Stammumfang in extra weitem Stand verpflanzt mit Ballen

8—10	14,—		
10—12	18,—		
12—14	24,—		
14—16	31,—		

fastigiata (Schwarz), Pyramiden-eiche. Wuchs straff aufrecht, säulenförmig, mit im Winter haftendem Laub, mit Ballen

125—150	8,—		
150—175	10,—		
175—200	14,—		
200—250	20,—		

rubra (L.) (Qu. borealis maxima) (Sarg.) Roteiche. Bis 25 m hoher Baum. Krone breit und abgerundet. Blätter länglich, tief ausgeschweift, spitz gelappt, oben stumpf dunkelgrün, im Herbst sich orange bis scharlach oder braunrot färbend. Wertvoller Park- u. Straßenbaum, 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand

100—125	1,50	13,50	125,—
125—150	1,80	16,50	150,—
150—200	2,25	20,—	180,—
200—250	2,75	25,—	225,—
250—300	3,60	33,—	300,—

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen

200—250	8,—		
250—300	12,—		
300—350	23,—		
350—400	38,—		
400—450	50,—		

Alleebäume, Stammumfang mit Ballen 25 % Aufschlag

7—8	6,20	55,—	500,—
8—10	7,25	66,—	600,—
10—12	8,50	77,—	700,—
12—14	11,—	100,—	900,—

Alleebäume, Stammumfang in extra weitem Stand verpflanzt mit Ballen

8—10	11,—		
10—12	15,—		
12—14	20,—		
14—16	25,—		

Rhamnus (L.) Wegdorn, Faulbaum (Rhamnaceae)

B.F.H.

R.S.V.

cathartica (L.). Kreuzdorn. Baumartiger Strauch mit sparrigem Wuchs bis 6 m hoch werdend. Blätter eiförmig, kerbig gesägt, oben stumpf grün. Blüten gelblich-grün zu 2—5 gebüschelt. Blütezeit Mai-Juni, Frucht erbsengroß, schwarz

80—100	1,—	9,—	80,—
100—150	5,—		
150—200	6,50		

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen

frangula (L.), Strauch oder kleiner Baum, Blätter eiförmig, kurz zugespitzt, ganzrandig, oben mattglänzend dunkelgrün. Blüten klein, weiß zu 10—20 stehend. Beeren erbsengroß, zuerst rot, später tiefrot bis violett-schwarz

80—100	—,85	7,50	65,—
100—150	5,—		
150—200	6,50		

Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen

Rhododendron (L.) Alpenrose (Ericaceae)

I.R.S.

**atawbiense Boursault, lila
catawbiense grandiflorum, lila
Cunninghams white, weiß
maximum roseum, rosa**

30—40	6,20	57,—	520,—
40—50	8,—	71,—	650,—
50—60	9,40	85,—	770,—
60—70	11,—	99,—	900,—
70—80	13,—	120,—	1100,—
80—90	16,—	145,—	1300,—
90—100	21,—	190,—	1700,—
100—125	30,—	275,—	

Rhododendron (L.) Alpenrose (Ericaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hybriden wie:					
J.R.S.	Caractacus, purpurrot				
	fastuosum flore pleno, blaviolett gefüllt				
	John Walter, karminrot	30—40	6,90	63,—	570,—
	Käte Waterer, hellrosa	40—50	8,50	79,—	715,—
	Henriette Sargent, rosa	50—60	10,30	93,—	850,—
	Mad. Carvalho, reinweiß	60—70	12,—	110,—	990,—
	Mad. Wagner, weiß mit rotem Rand	70—80	15,—	132,—	1200,—
	Pink Pearl, dunkelrosa	80—90	18,—	160,—	
	Prince Camille de Rohan, weiß mit rosa und andere Sorten	90—100	23,—	210,—	
	Solitärpflanzen 70/150 10% Aufschlag				
	Treibqualität zum Topfen 20% Preisaufschlag				
I.R.St.	dahuricum (L.), sibirische Alpenrose. Fast wintergrün, reich verzweigt, Blätter ei-elliptisch, oben dunkelgrün, Blüten meist einzeln, flach, tellerförmig, purpurrosa, 3 cm breit, Blütezeit in milden Wintern schon ab Jan.-Febr., sonst März-April mit Ballen	30—40	4,30	36,—	330,—
I.R.St.	ferrugineum (L.), die echte Alpenrose, 50—80 cm hoch werdend. Junge Zweige dicht bräunlich behaart, Blätter länglich-elliptisch, oben glänzend dunkelgrün, unten dicht bräunlich behaart. Blüten scharlach-rosa zu 6—12 zusammenstehend, trichterförmig, 1—2 cm breit, Blütezeit Juli-August mit Ballen	15—20 20—30 30—40	4,— 4,90 5,50	36,— 44,— 50,—	320,— 400,—
I.S.St.	hippophaeoides (Balf. et W. W. Smith) in China behelmateter, reich- und feinverzweigter, bis 1 m hoch werdender Strauch, mit lila-rosa Blüten im Juni anspruchslose Pflanze für den Steingarten, mit Ballen	20—30 30—40 40—50	3,65 4,90 5,50	33,— 44,— 50,—	300,— 400,—
R.J.St.	hirsutum (L.), Alpenrausch. In den Alpen häufig vorkommend. Bis 50 cm hoch werdend, junge Triebe haarig. Blätter elliptisch-länglich, oben frischgrün, Blüten scharlach-rosa. Blütezeit Juni, . . mit Ballen	20—25 25—30 30—40	3,50 4,50 5,50	32,— 40,—	
I.S.St.	imbricatum (Hort.) kleinblumige, dunkelgrüne Zwerg-rhododendronart mit nach unten gewellten, glänzenden Blättern und rötlich-violetten Blüten im Mai-Juni . . mit Ballen	30—40	6,—	50,—	440,—
I.S.St.	impeditum (Balf. et W. W. Smith), niedrig gedrungene, bis 30 cm hoch werdende Gebirgsrhododendronart mit tief lilapurpur bis veichenblauen 3—8blütigen Köpfchen im Juni-Juli mit Ballen	15—20 20—30	4,30 6,—	36,— 50,—	330,— 440,—
I.S.St.	impeditum Blue Tit (Hort.) (Rh. impeditum augustanum) neue, sehr wertvolle Kreuzung, deren Endtriebe mit hyazinthenblauen, kugelförmigen Blütenköpfchen übersät sind. mit Ballen	15—20 20—30	4,30 6,—	36,— 50,—	330,— 440,—
I.R.S.St.	minus (Michx.) (R. punctatum) (Andr.), Blüten karmin-rosa, wild, breit, dicht, buschig mit Ballen	30—40 40—50	4,40 6,—	40,— 50,—	360,— 440,—
I.R.S.St.	praecox (Carr.) (R. dahuricum × ciliatum) (hook), fast immergrüner bis 1 m hoher Strauch, Blätter elliptisch, oben tiefgrün und glänzend. Blüten zu wenigen zusammenstehend, tief karmin-rosa, 4 cm breit, Blütezeit März-April mit Ballen	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	4,— 4,90 5,50 7,— 10,—	36,— 44,— 50,— 64,—	320,— 400,— 450,— 580,—
	punctatum siehe R. minus				
I.S.St.	williamsianum (Rehd. & Wils.) in Szechuan behelmatete, niedrig bleibende, lederartige Sorte mit prächtigem rotbraunem Austrieb	30—40 40—50	6,— 7,50		

Rhodotypus (S. et Z.) Scheinkerrrie (Rosaceae)

F.S.	kerrioides (S. et Z.) (R. scandens) (Mak), breit aufrecht wachsender bis 2 m hoher Strauch, Zweige oliv-bräunlich, Blätter gegenständig, eilänglich doppelt gesägt, oben dunkelgrün. Blüten einzeln, vierzählig, reinweiß, 4—5 cm breit. Blütezeit Mai-Juni, Frucht erbsengroß, glänzend schwarz	60—100 80—100 100—150	1,— 5,— 6,50	9,—	80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig . . mit Ballen				

Rhus (L.) Sumach (Anacardiacaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.L.R.	cotinifolia (L.) siehe <i>Cotinus coggygria</i> .				
	typhina (L.) (<i>R. hirta</i>) (Sudw.). Essigbaum. Bis 12 m hoher Baum, ausläufertreibend, ziemlich dichte, samthaarige, sehr groß gefiederte Blätter, satgrün, im Herbst sich orange bis scharlach färbend. Blüten grünlich in dichthaarigen bis 20 cm langen Rispen. Blütezeit Juni-Juli. Früchte kolbenartig karmesinrot, dichthaarig	80—100 100—150	2,25 3,—	20,— 27,—	180,—
	Einzelpflanzen mehrtriebig	100—125 125—150 150—200	10,— 12,— 15,—		
	dissecta (Rehd.) (<i>R. typhina laciniata</i>), Blättchen fiederschnittig, farnartig aussehend, sonst wie die Stammart	80—100	3,50	32,50	
	Einzelpflanzen mehrtriebig	100—125 125—150 150—175	10,— 12,— 16,—		
Ribes (L.) Stachelbeere, Johannisb. (Saxifragaceae)					
F.H.R.S.V.	alpinum (L.). Alpenjohannisbeere. Bis 3 m hoher Strauch. Blätter rundlich, 3—5lappig, sehr guter Schatten- und Heckenstrauch				
	2 × verpfl. Büsche 3—5 Triebe	30—40 40—60	—,50 —,60	4,50 5,50	40,— 50,—
	2 × verpfl. Büsche 5—8 Triebe	30—40 40—60 60—80	—,70 —,85 —,90	6,50 7,79 8,80	60,— 70,— 80,—
	2 × verpfl. Büsche 8—15 Triebe	40—60	—,95	8,80	80,—
	1- und 2jährige Pflanzen siehe unter Junggehölzen.	60—80	1,25	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	80—100 100—125	5,— 6,—		
H.R.S.V.	aureum (Pursh) (<i>R. tenuiflorum</i>) (Ldl.). Goldtraube. Bis 2 m hoher Strauch. Blätter rundlich, dreilappig, grob gezähnt, Blüten gelb in hängenden Trauben zu 5—15 sitzend. Blütezeit April-Mai. Frucht erbsengroß, purpurbraun bis schwarz	80—120	—,85	7,50	65,—
H.R.S.V.	divaricatum (Dougl.) (<i>R. arboreum</i>) (hort.), bis 3 m hoher Strauch. Zweige stark bewehrt, Blätter rundlich-herzförmig, meist fünfflappig, Blüten grünlich purpur, zu 2—4 an dünnen Stielen. Frucht schwarz oder dunkelrot, gutes Vogelschutzgehölz	80—120	—,85	7,50	65,—
H.L.R.S.V.	floridum (L'Her) (<i>R. americanum</i>) (Mill.). Amerikanische Ahlbeere. Bis 1,5 m hoher Strauch. Blätter fast kreisrund, drei- bis fünfflappig, Herbstfärbung gelb- und braunrot, Blüten gelblich-weiß, glockig, in vielblütigen 10 cm langen hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai, Frucht schwarz	80—120 125—150 150—200	—,85 5,— 6,50	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				
R.S.V.	nigrum (L.), bekannte Ahlbeere. Bis 2 m hoher Strauch mit rundlichen 3—5lappigen Blättern. Blüten grünlich- oder rötlich-weiß, glockig, in 4—10blütigen, hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai. Beeren rundlich, schwarz, eßbar	60—80 80—125	—,65 —,85	5,50 7,50	50,— 65,—
H.L.R.S.V.	sanguineum (Pursh.). Blutjohannisbeere. Bis 4 m hoch werdender Strauch. Blätter nierenförmig, rundlich, oberseits dunkelgrün. Blüten karminrot in hängenden, vielblütigen Trauben	60—100 100—125	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
H.S.	King Edward VII. Strauch mit kompaktem Wuchs und tief dunkelroten Blütentrauben. Später Blüher und ist eine der schönsten Formen	60—100	1,50	13,50	120,—
H.L.R.S.V.	atrosanguineum (Kirchn.). Blüten dunkelkarmin, sonst wie die Stammform. Einer der schönsten Blütensträucher für das Frühjahr	60—100 100—125	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	80—100 100—150	5,— 6,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Robinia (L.) Schotendorn (Leguminosae)					
B.R.	hispida (L.) , rotblühende Akazie, kleiner Baum oder Strauch, Zweige mit dichten Borsten, Blätter gefiedert, oben tief grün, Blüten rosa bis hellpurpur, in lockeren Trauben, Blütezeit Mai-Juni	60—80 80—120 80—100 100—150	2,50 3,— 8,— 10,—	22,50 27,—	
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100—120 120—140	6,— 7,—		
	Halbstämme, Stammhöhe				
B.H.R.V.	pseudoacacia (L.) , Gemeine Akazie. Bis 25 m hoher, locker wachsender Baum. Blätter gefiedert, oben sattgrün. Blüten weiß, stark duftend, in dichten 10—20 cm langen Trauben. Blütezeit Ende Mai-Juni. Wertvolle Bienenweide und zur Bepflanzung auch schlechter Böden. 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125—150 150—200 200—250 250—300 300—350	1,— 1,25 2,25 2,75 3,60	9,— 11,— 20,— 25,— 33,—	80,— 100,— 180,— 225,— 390,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	200—250 250—300 300—350 350—400	5,— 6,— 8,— 10,—		
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	5,— 6,— 7,—	45,— 55,— 66,—	400,— 500,— 600,—
R.V.	bessoniana (Kirchn.) , starkwachsende Kugelakazie, eine geschlossene, aber weniger dichte ovale Krone bildend	8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,—	66,— 77,— 100,—	600,— 700,— 900,—
	Alleebäume, Stammumfang				
B.R.V.	monophylla (Carr.) , mit meist nur einem, höchstens 2—3 gefiederten Blättern. 2 × verpfl. Heister aus weitem Stand	100—150 150—200 200—250 250—300	2,25 2,75 3,60 4,40	20,— 25,— 33,— 40,—	180,— 225,— 300,— 360,—
	Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	7,25 8,50	66,— 77,—	600,— 700,—
R.V.	umbraculifera (DC) (R. inermis Kirchn.) , echte Kugelakazie, geschätzter, kleinkroniger Straßenbaum	8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,—	66,— 77,— 100,—	600,— 700,— 900,—
	Alleebäume, Stammumfang				
Rosa (L.) Rose (Rosaceae)					
	siehe auch unter Rosen Seite 11—16				
	blanda (Ait.) schöne Parkrose aus den Vereinigten Staaten, bis 2 m hoch werdend mit rosa Blüten	60—80 80—120	—,65 —,85	5,50 7,50	50,— 65,—
B.F.H.V.	canina (L.) , bekannte Hundsrose, bis 3 m hoch werdend, mit einfachen rosa Blüten	60—80 80—125	—,65 —,85	5,50 7,50	50,— 65,—
B.F.H.V.	multiflora (Thbg.) (R. polyantha (Roessig)) , dünnzweigiger fast rankender Strauch, Blüten weiß in zahlreichen gr. pyramidalen Doldentrauben. Früchte erbsengroß braun-rot	60—80 80—125	—,65 —,85	5,50 7,50	50,— 65,—
B.F.H.V.	pimpinellifolia (L.) (R. spinosissima (L.)) , Bibernelle. Kaum 1 m hoher Strauch, stark ausläufertreibend, mit dünnen sparrigen Zweigen, dicht stachelig und borst'g. Blüten weiß, zahlreich, einzeln an kurzen Seitenzweigen. Frucht braun-schwarz	60—80 80—125	1,— 1,20	9,— 11,—	80,— 100,—
B.F.H.R.V.	rubiginosa (L.) (R. eglanteria (L.)) , Schottische Zaunrose, bis 3 m hoch werdend, aufrecht wachsend, stark bestachelt, Blätter apfelartig duftend. Blüten frisch rosa. Frucht scharlachrot	60—80 80—125	—,60 —,85	5,50 7,50	50,— 65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100—125 125—150	5,— 6,—		
B.F.L.H.R.V.	rubrifolia (Vill.) (R. ferruginea (Dsègl) (R. glauca (Pourr.)) , bis 3 m hoher schlanktriebiger Strauch, Zweige braun bereift, Blätter bräunlich-purpur und bläulich, Blüten karmesinrot, Frucht scharlachrot ..	40—60 60—80 80—125	—,85 1,— 1,20	7,50 9,— 11,—	65,— 80,— 100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	100—125	5,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Rosa (L.) Rose (Rosaceae)					
B.F.H.R.V.	<i>rugosa</i> (Thunb.) (R. <i>regelliana</i>) (Andr. u. Lind). Japanische Apfelrose. Bis 2 m hoher buschiger Strauch. Zweige sehr stark bestachelt. Blüten einzeln oder zu wenigen sitzend, rot-rosa. Vom Mai bis zum Herbst blühend, Frucht flach, kugelig, leuchtendrot. Früchte im Haushalt verwendbar	30—40 40—60 60—80	—,60 —,85 1,—	5,50 7,50 9,—	50,— 65,— 80,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	60—100	4,—		
	mit Ballen	100—125	5,—		
	alba wie die Art, aber mit weißen Blüten	40—60 60—80	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
B.F.H.R.V.	<i>hollandica</i> (hort.). stark wachsender mittelhoher Strauch mit roten Blüten	60—80 80—125	—,75 —,85	6,— 7,50	50,— 65,—
B.F.H.L.V.	<i>virginiana</i> (Mill) (R. <i>lucida</i>) (Ehrh.), bis 1,5 m hoher dichtzweigiger Strauch, stark ausläufertreibend. Blüten rosa, meist einzeln oder zu wenigen, reichblühend, Frucht scharlachrot	60—80 80—125	—,75 —,85	6,— 7,50	50,— 65,—
Rubus (L.) Brombeere, Himbeere (Rosaceae)					
B.F.R.S.V.	<i>fruticosus</i> (L.) (R. <i>plicatus</i>) (Weihe et Oees), die heimische bekannte Brombeere	60—100	—,60	5,50	50,—
	<i>idaeus</i> (L.), bekannte heimische Himbeere	80—100	—,60	5,50	50,—
B.R.S.V.	<i>odoratus</i> (L.) (R. <i>grandifolius</i>) (Salisb), wohlriechender Himbeerstrauch, aufrechtwachsender, bis 3 m hoher Strauch, ausläufertreibend. Blätter herzförmig, fünf-lappig, fein gesägt, sattgrün. Blüten karminrot, duftend, in kurzen vielblütigen Rispen	70—100 80—100 100—125	1,50 6,— 8,—	13,50	120,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				
	mit Ballen				
B.F.R.V.	<i>phoenicolasius</i> (Maxim.). Japanische Weinbeere, interessantes, leicht überhängendes, in Japan beheimatetes Gehölz, deren Triebe mit roten Drüsenborsten besetzt sind, dunkelgrüne Belaubung, unterseits silbergrün, Blüten hellrosa, Früchte karmesinrot und essbar	70—100	1,50	13,50	120,—
B.F.R.S.	<i>spectabilis</i> (Pursh.), bis 2 m hoher aufrechtwachsender Strauch. Blättchen dreiteilig, eiförmig, eingeschnitten gesägt, Blüten einzeln, karminrot, an einzelnen Seitenzweigen sitzend. Blütezeit April-Juni, Frucht groß, dunkelgelb, essbar	60—80	1,20	11,—	100,—
Salix (L.) Weide (Salicaceae)					
B.R.	<i>alba</i> (L.). Weiß- oder Kopfweide, bis 25 m hoch werdendes, heimisches Gehölz, welches als eine sehr wertvolle Windschutzpflanze betrachtet wird, wirkt zierend mit seinem malerischen, leicht überhäng. Wuchs und seiner silbr. Belaub. 2 × verpfl. Heister aus w. Stand	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,25 1,50 1,80 2,25 2,75	11,— 13,50 16,50 20,— 25,—	100,— 125,— 150,— 180,— 225,—
	Hochstämme, Stammumfang	7—8 8—10 10—12	4,— 5,— 6,—	36,— 45,— 55,—	330,— 400,— 500,—
	<i>argentea</i> (Wimm) (S. <i>alba sericea</i>) (Gaud) (S. <i>alba egalis</i>) (hort.). Silberweide, rasch wachsender Baum mit abstehenden Zweigen. Blätter lanzettlich zugespitzt, beiderseitig behaart und silbrig glänzend	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>Britzensis</i> (Spaeth). Zweige besonders im Winter lebhaft rot bis orange, vorzügliche Bindeweide	125—175	—,85	7,50	65,—
R.Tr.L.	<i>vitellina pendula</i> (Rehd.) (S. <i>alba tristis</i>) (Gaud.). Trauer-goldweide, Zweige hellgelb, lang und senkrecht niederhängend. Bekannteste Trauerweide. 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	125—150 150—200 200—250 250—300	2,25 2,75 3,60 4,40	20,— 25,— 33,— 40,—	180,— 225,— 200,— 360,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen	200—250 250—300 300—350	5,50 6,50 8,—		
	Hochstämme, Stammumfang	7—8 8—10 10—12 12—14	4,50 6,— 7,75 8,50	40,— 55,— 66,— 77,—	360,— 500,— 690,— 790,—
B.R.S.	<i>aurita</i> (L.). ein dichtwachsendes Gehölz, mit kleinen stumpfgrünen, leicht runzeligen Blättern, bis 2 m hoch werdend, wertvolle Bienenweide, zur Bepflanzung von Böschungen, Autobahnen usw.	60—100 100—125	1,— 1,25	9,— 11,—	80,— 100,—

Salix (L.) Weide (Salicaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R.B.S.V.	<i>caprea</i> (L). Salweide. Strauch oder kleiner Baum, Zweige anfangs grau behaart, dann glänzend braun. Knospen sehr dick, Blätter breit elliptisch, kurz zugespitzt, kerbig gesägt, glänzend grün. Vorzügliche Bienenweide. Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	60—80 80—125 100—150 150—200	—,60 —,85 5,— 6,—	5,50 7,50	50,— 65,—
R.B.S.	<i>mas.</i> (L). Männliche Form der Salweide. Wohl die schönste aller Kätzchenweiden	100—150	1,50	13,50	120,—
	<i>cinerea</i> (L.). Aschweide. Bis 5 m hoher Strauch. Zweige graufilzig, Blätter elliptisch, meist an ihren oberen Teilen gekerbt, oben stumpfgrün, unten dicht grau behaart	60—100	—,85	7,50	65,—
R.B.	<i>daphnoides</i> (Vill). Reifweide. Großer Strauch oder Baum. Zweige gelblich-braun, stark bereift, Blätter verkehrt lanzettlich, fast ganzrandig, lebhaft glänzend dunkelgrün, unten bläulich, derb. Wertvolle Kätzchenweide	125—175 8—10 10—12	—,85 3,30 4,—	7,50 30,— 36,—	65,— 270,— 330,—
	Hochstämme, Stammumfang				
B.R.	<i>daphnoides praecox</i> (hort.). Frühe Kätzchenweide, etwa 2 m hoch werdende Form der Reifweide, besonders reich- und frühblühend. Als Kätzchenweide sehr wertvoll	125—175	—,85	7,50	65,—
Tr.B.	<i>elegantissima</i> (K. Koch.) (S. Siboldi) (Hort.). mittelhoher, breitt Kroniger Baum mit abstehenden Ästen und langen herabhängenden Zweigen, gelblich bis bräunlich grün	125—175	—,85	7,50	65,—
	<i>laurifolia</i> siehe <i>S. pentandra</i> .				
B.R.	<i>macrolepis</i> (Larxch), stark wachsender Strauch, hellholzige, Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blau-grau, Kätzchen groß, grau, eine sehr wertvolle Kätzchenweide	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>medemii</i> (Boiss), bis 4 m hoher Strauch, Zweige filzig behaart, Blätter länglich-elliptisch, grob kerbig gesägt, oben sattgrün, unten bläulich-grau. Männliche Kätzchen, sehr dick, bis 4 cm lang, schon im März erscheinend. Sehr wertvolle Kätzchenweide	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>muscina</i> (Dode), Holz sehr dunkelgrün, Blätter seidig-flaumig, bis 4,5 cm breit und bis 10 cm lang werdend, Ränder stark gewellt, Kätzchen dicht zusammenstehend, mittelgroß, silbriggrau. Auffallend lange Hüllblätter. Sehr gute Kätzchenweide	100—150	—,85	7,50	65,—
R.	<i>nigricans</i> (Sm) (S. myrsinifolia) (Salisb.). Negerweide, Bindeweide. Mit langen, dünnen, zähen Ruten, Strauch sparrig, Blätter spitz, elliptisch bis 10 cm lang, oberseits dunkelgrün	100—150	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>pentandra</i> (L.) (S. laurifolia) (hort.). Lorbeerweide, Strauch oder Baum. Zweige glänzend bräunlich-grün, Blätter elliptisch bis 1—2 cm lang, derb, stark glänzend, tiefgrün. Kätzchen goldgelb, bis 5 cm lang werdend. Schöne Zier- und Kätzchenweide	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>pontederana</i> (Wild) (S. purpurea × <i>cinerea</i>). Bis 4 m hoher Strauch. Blätter verkehrt eiförmig bis lanzettlich gesägt, oben dunkelgrün. Kätzchen anfangs rötlich, schmal, zylindrisch. Gute Kätzchenweide	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.	<i>pulehra ruberrima</i> (Hort.). Holz sehr glänzend, auf der Sonnenseite prächtig rot, Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blau. Kätzchen früh erscheinend, sehr groß, erheblich gerötet. Eine sehr gute Kätzchenweide	125—175	—,85	7,50	65,—
B.R.St.	<i>simulatrix</i> (B. White) (S. herbacea × <i>formosa</i>). Kriechender Strauch mit Kätzchen an belaubten Zweigen mit Ballen	20—30	1,65	15,—	

Salix (L.) Weide (Salicaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Tr.	sacramentana (hort.), Trauerweide, grünholzige mit tiefgrünen Blättern und weit auslagernden, hängenden Zweigen	150—200 200—250	2,75 3,60	25,— 33,—	225,— 300,—
B.R.	smithiana (Willd) (S. viminalis × caprea), bis 6 m hoch werdender Strauch, Zweige behaart, Blätter länglich lanzettlich, dunkelgrün, unten grau und weichhaarig, Kätzchen März-April, etwa 3 cm lang, sehr dick. Eine der besten Kätzchenweiden	150—200 200—250 250—300	—,85 5,— 6,—	7,50	65,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen				
B.R.V.	viminalis (L.), Korbweide. Aufrechter Wuchs, 5—10 m hoch werdend, Zweige schlank, grau-grün, Blätter schmal lanzettlich, oben stumpfgrün, unten seidig silbriggrau behaart, Wertvolle Nutzweide	150—200	—,85	7,50	65,—
B.R.St.	wehrhanii, niedrige Zwergweide, ca. 80 cm hoch werdend mit langen, weißen Kätzchen	30—50 50—80	1,65 2,—	15,— 17,50	

Sambucus (L.) Holunder (Caprifoliaceae)

	canadensis (Hort.) starkwüchsig, blüht im Juli-August mit flachen Scheindolden, Beeren schwarz bereift ..	70—100	1,—	9,—	80,—
F.H.R.S.V.	nigra (L.), bekannter heimischer Holunder, bis 4 m hoher Strauch mit prächtig stark duftenden gelblich-weißen Blütenständen	80—125	—,85	7,50	65,—
F.R.S.	laciniosa (Mill.), Eine feingeschlitzte Nigraart mit reichem Fruchthehang	80—150	1,—	9,—	80,—
F.H.R.S.V.	racemosa (L.), Traubenholunder. Bis 4 m hoher Strauch, Zweige hellbraun, Blätter gelappt, scharf, grob gesägt, Blüten gelblich-weiß in dichten, eiförmigen, 6 cm langen Rispen. Blütezeit April-Mai, Frucht scharlachrot	80—120	1,20	11,—	100,—

Skimmia (Thunb.) (Rutaceae)

F.I.S.St.	foremannii (Knight) (S. japonica × reevesiana) kleiner Strauch mit großen abgerundeten dunkelgrünen Blättern und mit weißen Blüten im Mai und rein roten Früchten	25—30 30—40 40—50	3,30 4,50 5,50	30,— 40,— 50,—	
	mit Ballen				
F.I.S.St.	japonica (Thunb.), bis 1,5 m hoch, Blätter an den Zweigenden gehäuft, elliptisch bis verkehrt eiförmig, 7-12 cm lang, oben frischgrün, unten gelblich, Blüten gelblich-weiß, 8 mm breit, in 5—8 cm langen Rispen, Frucht kugelig, hochrot	25—30 30—40 40—50	3,30 4,50 5,50	30,— 40,— 50,—	
I.S.St.	reevesiana rubella (Rehd.) breitwachsende, männliche Form mit schwarzgrünem Laub, sehr winterhart	25—30 30—40 40—50	3,30 4,50 5,50	30,— 40,— 50,—	

Sophora (L.) Schnurbaum (Leguminosae)

B.L.	japonica (L.), bis 15 m hoch werdender Baum mit dunkelgrünen, gefiederten Blättern und runder Krone, ca. 15 cm langen gelblich-weißen Blütenrispen im August	100—125 125—150 150—200 200—250	3,— 3,60 5,— 6,—	27,— 33,— 44,— 54,—	240,— 300,— 400,— 480,—
	2× verpflanzte Heister aus weitem Stand				
	Hochstämme, Stammumfang	7—8 8—10	11,— 14,—	100,— 125,—	

Sorbaria (A. Br.) Ebereschenspiere (Rosaceae)

B.S.	aitchisonii (Hemsl.) in Afghanistan beheimateter bis 3 m hoch werdender, Spätsommerblüher mit bis 25 cm langen weißen Blütenrispen	60—80	1,20	11,—	100,—
V.B.S.	sorbifolia (A. Br.) (Spiraea sorbifolia) (L.), aufrechter, bis 2 m hoher Strauch, stark ausläufertreibend, Blätter geschlitzt, 5—10 cm lang, doppelt gesägt, beiderseits grün, Blüten in 25 cm langen, fein behaarten Rispen	60—80	1,20	11,—	100,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	
Sorbus (L.) Eberesche (Rosaceae)						
L.	aria (Crantz). Mehlbeere. Bildet pyramidenförmige Kronen. Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits weiß .. Hochstämme, Stammumfang	8—10	6,—	55,—	500,—	
		10—12	7,75	66,—	600,—	
		12—14	8,50	77,—	700,—	
B.L.	lutescens (Hartw.), in Europa behelmateter, bis 15 m hoch werdender Baum mit leuchtend gelbem Austrieb und großblättrigen, stark filzigen Blättern, 2× verpflanzte Heister aus weitem Stand Hochstämme, Stammumfang	125—150	2,25	20,—	180,—	
		150—200	2,75	25,—	225,—	
		200—250	3,60	33,—	300,—	
		250—300	4,40	40,—	360,—	
		7—8	4,50	40,—	360,—	
		8—10	6,—	55,—	500,—	
10—12	7,75	66,—	600,—			
B.F.R.S.V.	aucuparia (L.). Gemeine Eberesche. Bis 15 m hoher Baum mit rundlicher Krone, Blätter bis 20 cm lang mit 9—15 cm länglich-lanzettlich scharf gesägten, sattgrünen Blättchen. Blüten weiß, in 15 cm breiter behaarter Doldentraube. Frucht scharlachrot, im Hochsommer den Baum zierend. 2× verpflanzte Heister aus weitem Stand Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen Einzelpflanzen 3—6 Grundtriebe mit Ballen Hochstämme, Stammumfang Alleebäume, Stammumfang in extra weitem Stand verpflanzt	125—150	1,50	13,50	125,—	
		150—200	1,80	16,50	150,—	
		200—250	2,25	20,—	180,—	
		250—300	2,75	25,—	225,—	
		200—250	4,—			
		250—300	5,—			
		300—350	7,—			
		200—250	5,—			
		250—300	6,—			
		300—350	7,—			
		350—400	8,—			
		8—10	5,—	45,—	400,—	
		10—12	6,—	55,—	500,—	
		12—14	7,—	66,—	600,—	
		14—16	8,50	77,—	700,—	
		12—14	11,—			
		14—16	14,—			
		16—18	16,50			
		18—20	24,50			
		20—25	33,—			
		25—30	44,—			
B.F.R.V.	moravica (Zengerl) (S. edulis) (Dieck). Eßbare Eberesche. Früchte ziemlich groß, säuerlich, zu wirtschaftlichen Zwecken verwendbar Alleebäume, Stammumfang	8—10	5,—	45,—	400,—	
		10—12	6,—	55,—	500,—	
		12—14	7,—	66,—	600,—	
		14—16	8,50	77,—	700,—	
B.F.R.V.	suecica (Krock u. Almag.) (S. scand'ca) (Fries) (S. intermedia) (Pers) (S. minima) (Hedl.) (S. aria suecica) (Koehe). Schwedische Mehlbeere. Bis 10 m hoher Baum. Blätter länglich eiförmig bis 11 cm lang, fiederartig gelappt, dunkelgrün, unten weißfilzig. Blüten weiß in 10 cm breiten filzigen Doldenrispen. Frucht kurz, oval, orange-scharlach. Ein ausgezeichneter Straßenbaum, besonders für rauhe, windige Lage. 2× verpflanzte Heister aus weitem Stand Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen Alleebäume, Stammumfang in extra weitem Stand verpflanzt Stammumfang	125—150	2,25	20,—	180,—	
		150—200	2,75	25,—	225,—	
		200—250	3,60	33,—	300,—	
		250—300	4,40	40,—	360,—	
		200—250	5,—			
		250—300	6,—			
		300—350	8,—			
		7—8	4,60	42,—	380,—	
		8—10	6,—	55,—	500,—	
		10—12	7,75	66,—	600,—	
		12—14	8,50	77,—	700,—	
		14—16	11,—	100,—	900,—	
		10—12	10,—			
		12—14	14,—			
		14—16	16,50			
		16—18	22,—			
		18—20	30,—			
Spiraea (L.) Spierenstrauch (Rosaceae)						
B.H.R.St.V. albiflora (Lb!), bis 0,5 m hoher Strauch, steil aufrechtwachsend, Blätter lanzettlich, grob gesägt, dunkelgrün, Blüten weiß in feinen behaarten traubigen Blütenständen						
		30—40	—,85	7,50	65,—	

Spiraea (L.) Spierenstrauch (Rosaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.H.R.St.V. <i>arguta</i> (Zabl) (S. Thunbergi $\times$ multiflora), bis 2 m hoher Strauch mit dichter, feiner, überhängender Bezweigung. Blätter schmal, verkehrt eiförmig, scharf gesägt, lebhafte grün, Blüten reinweiß in vielblütigen Doldentrauben. Blütezeit Ende April-Mai. Einer der schönsten Frühlingsblüher, unempfindlich gegen Trockenheit und wertvoll zum Treiben	60—80	1,20	11,—	100,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	80—100	5,—		
mit Ballen	100—125	6,—		
<i>ariaefolia</i> siehe Holodiscus.				
B.H.V. <i>douglasii</i> (Hook), bis 2,5 m hoher Strauch mit dichten weißfilzigen trüben Blättern, schmal, länglich, an der oberen Hälfte gesägt, Blüten purpur-rosa in schmalkegelförmiger, dichter, bis 20 cm langer Rispe. Blütezeit Juli-August	100—150	—,85	7,50	65,—
B.H.R.V. <i>fontenaysii alba</i> (Zbl.) (Sp. canescens $\times$ latifolia), bis 3 m hoher Strauch, Blätter länglich oval, Blüten weiß in bis 8 cm langen pyramidalen Rispen. Blütezeit Juni-Juli	100—150	—,85	7,50	65,—
B.H.S.St. <i>hypericifolia</i> (L.), bis 1,5 m hoher Strauch. Zweige fein behaart, Blätter verkehrt ei-rundlich, oben grau-grün, unten heller bis bläulich. Blüten weiß, meist zu 5 in fest sitzenden Dolden. Blütezeit April-Mai	40—60	1,—	9,—	30,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	60—80	5,—		
mit Ballen	80—100	6,—		
B.H.R.S.V. <i>menziesii triumphans</i> (Bean), bis 3 m hoher Strauch, Blätter länglich-elliptisch, lebhafte grün, Blüten karmin-rosa in dichter, schmal pyramidalen, bis 20 cm langer Rispe. Verträgt Schatten und nährstoffarme Böden ..	80—125	—,85	7,50	65,—
<i>opulifolia</i> siehe Physocarpus.				
B.R.St. <i>prunifolia plena</i> (C. Schn.), bis 1,5 m hoch werdender Strauch. Triebe schlank, rutenförmig, Blätter spitz eilänglich, fein gezähnt, lebhafte glänzend grün, Herbstfärbung leuchtend orange bis braunrot. Blüten reinweiß, hübsch gefüllt, bis 1 cm breit, Blütezeit April-Mai	40—60	1,75	16,—	140,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	60—80	5,—		
mit Ballen	80—120	6,—		
B.H.R.V. <i>humalda</i> Anthony Waterer (Waterer), bis 1,25 m hoher Strauch. Blätter länglich-lanzettlich, scharf doppelt sägezählig, dunkelgrün, mitunter gelb-bunt. Blüten lebhafte karminrot in flacher Doldentraube. Blütezeit Juli-September. Zu Hecken und Massenanpflanzungen sehr geeignet	30—40	—,60	5,50	50,—
	40—60	—,85	7,50	65,—
B.H.R.St. <i>froebeli</i> (S. callosa Froebeli) (Froeb.), Strauch niedrig, dicht wachsend. Blüten dunkelpurpur in großen Doldentrauben. Durch den schönen purpurroten Ausrieb sehr zierende Farbe	30—50	—,60	5,50	50,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	50—70	—,85	7,50	65,—
mit Ballen	60—80	4,—		
	80—100	5,—		
<i>sorbifolia</i> siehe Sorbaria.				
B.H.R.St. <i>Thunbergi</i> (Sieb.), bis 1 m hoher Strauch mit feiner überhängender Bezweigung. Blätter lanzettlich scharf gesägt, lebhafte grün. Blüten reinweiß in wenig blütiger, sitzender Dolde. Blütezeit April-Mai, sehr widerstandsfähig gegen Dürre	30—40	1,20	11,—	100,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	40—60	1,50	13,50	120,—
mit Ballen	60—80	6,—		
	80—100	7,—		
B.H.R.St. <i>vanhouttei</i> (Zbl) (S. cantoniensis $\times$ trilobata), bis 2 m hoher Strauch mit dichter überhängender Bezweigung. Blätter rhombisch-eiförmig, 3—5lappig, dunkelgrün. Blüten reinweiß in flacher, gewölbter Doldentraube. Blütezeit Mai-Juni. Einer der schönsten Frühlingsblüher	60—80	—,85	7,50	65,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig ..	80—120	1,—	9,—	80,—
mit Ballen	100—125	4,—		
	125—150	5,—		
	150—175	6,—		

Staphylea (L.) Pimpernuß (Staphyleaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.F. <i>colchica</i> (Stew.) aufrecht wachsender Strauch mit grüner Belaubung und ca. 10 cm langen, duftenden, reinweißen Blütenrispen im Frühjahr	60—80 80—100	3,— 4,—	27,— 36,—	
B.F. <i>pinnata</i> (L.) aufrechtwachsende, baumartige Sträucher mit bläulich graugrüner Belaubung und 12 cm langen, hängenden, grünlich-weißen Blüentrauben	60—80 80—100	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—

Stephanandra (S. et Z.) Kranzspiere (Rosaceae)

H.L.R.St. <i>incisa</i> (Zbl.) (<i>S. flexuosa</i>) (S. et Z.), bis 1,5 m hoher Strauch, Zweige schlank, überhängend, lebhaft braunrot, Blätter eiförmig, eingeschnitten, gelappt und grob gesägt, mit langer, ausgezogener Spitze, lebhaft grün, im Herbst satt braunrot. Blüten grünlich-weiß in lockeren bis 6 cm langen Doldentrauben	60—80	1,20	11,—	100,—
B.H.R.St. <i>tanakae</i> (Franch.) Strauch mit dunkelgrüner, gelappter Belaubung und interessanter braunroter Herbstfärbung, Doldentrauben weiß und 10 cm lang, in Japan beheimatet	60—80	1,20	11,—	100,—

Stranvaesia (Ldl.) (Rosaceae)

B.F.H.I.V. <i> davidiana</i> (Dene.) in Westchina beheimateter immergrüner Strauch mit weißen Blütendolden, scharlachrote Blütenstände im Herbst	60—100	4,—		
--	--------	-----	--	--

Symphoricarpus (L.) Schneebeere (Caprifoliaceae)

B.F.H.R. <i>chenaultii</i> (Rehd.) (<i>S. microphyllus</i> × <i>orbiculatus</i>), S.V. Wuchs aufrecht, reich verzweigt und locker, Blätter eiförmig, oben dunkelgrün, unten blaugrün und dicht behaart, Blüten klein, rosa, in kurzen Ähren	80—100	—,85	7,50	65,—
B.F.H.L.R. <i>orbiculatus</i> (Mch.) (<i>S. vulgaris</i>) (Mchx.). Korallenbeere. S.V. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schlankem ausladendem Wuchs. Blätter ei-rundlich bis elliptisch, oben stumpfgrün, unten grau-grün, im Herbst rot. Blüten glockig, blaßrot, in kleinen dichten Büscheln oder kurzen Ähren. Blütezeit Juli-August, Beeren purpurrot, rundlich, sehr lange haftend	60—100 80—100 100—125	—,85 5,— 6,—	7,50	65,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				
mit Ballen				
<i>variegatus</i> (C. Schn.), Blätter goldgelb, gerandet und gedert	60—80	1,20	11,—	100,—
B.F.H.R. <i>racemosus</i> (Mchx.) (<i>S. albus laevigatus</i>) (Blake). Gemeine S.V. Schneebeere. Bis 1,5 m hoher Strauch. Blätter ei-elliptisch bis rundlich, ganzrandig, oben dunkelgrün. Blüten glockig, rötlich-weiß, in Ähren stehend. Blütezeit Juli-September. Beeren weiß, rundlich, in dichten Büscheln, bis nach dem Laubabfall haftend. Sehr guter Schattenstrauch und Bienennectarpflanze	60—100 80—100 100—125	—,85 5,— 6,—	7,50	65,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				
mit Ballen				

Syringa (L.) Flieder (Oleaceae)

B.H.R.V. <i>chinensis</i> (Willd.) (<i>S. rothomagensis</i>) (De. Launy) (<i>S. dubia</i>) (Pers.), bis 5 m hoher Strauch, Zweige schlank überhängend, Blätter ei-lanzettlich, Blüten lila-rosa in großen langen Rispen. Blütezeit Mai	60—80 80—100	3,— 3,75	25,— 34,—	225,— 300,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	100—125 125—150	10,— 15,—		
mit Ballen				
B.R.V. <i>josikaea</i> (Jacq.), bis 4 m hoher Strauch, aufrecht wachsend, Blätter breit elliptisch spitz, dunkelgrün, Blüten dunkel-violett, schwach duftend, in schmalen aufrechten 10—20 cm langen Rispen. Blütezeit Mai-Juni	60—100 100—125 125—150	1,50 5,— 7,—	13,50	120,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig				
mit Ballen				
B.E.R. <i>reflexa</i> (Schneid.), bis 4 m hoher dichter Strauch, Blüten im Juni, hellrosa mit weißem Saum, in der Knospe karminrot, in 20 cm langen, überhängenden Rispen	60—80 80—100	3,— 3,75	25,— 34,—	225,— 300,—

Syringa (L.) Flieder (Oleaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B.H.R.V.	<i>vulgaris</i> (L.), bekannter heimischer gemeiner Flieder, bis 7 m hoher Strauch oder Baum, Blätter eiförmig zugespitzt, Blüten lila, in 10—20 cm langen Rispen, stark duftend. Blütezeit Mai-Juni. Als Heckenpflanze geeignet	60—80 80—100 100—125	—,85 1,— 1,20	7,50 9,— 11,—	65,— 80,— 100,—
	Einzeipflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig .. mit Ballen	125—150 150—175	5,— 6,—		
B.H.R.	<i>vulgaris</i> in veredelten Sorten	60—80 65—100 80—120	2,75 4,25 6,—	25,— 38,— 55,—	225,— 350,— 500,—
	Büsche mit 3—5 Trieben Büsche mit 5—8 Trieben Büsche mit 8—12 Trieben				
	Einzeipflanzen breitbuschig .. mit Ballen	80—100 100—125 125—150	3,— 12,— 17,—		
	Halbstämme, Stammhöhe	80—100 100—120 120—140 140—160	6,— 8,— 10,— 12,—		
	veredelte Sorten:				
	einfach blühend:				
	Andenken an L. Späth, dunkelrot				
	Charles X, lila-rot				
	Congo, dunkelrot				
	Frau Berta Dammann, reinweiß				
	Fürst Bülow, dunkelviolet				
	Marie Legraye, reinweiß				
	Mme. Florent. Stepman, weiß				
	Perle von Teltow, dunkelviolet				
	Ruhm von Hortenstein, lila-rot				
	Sinaï rosea, rosa				
	gefüllt blühend:				
	Anthony Buchner, bläulich-lila				
	Charles Joly, dunkelpurpur				
	Louis Pasteur, rot				
	Mad. Lemoine, reinweiß				
	Michel Buchner, hell-lila				
	Perle von Stuttgart, lila				
	President Grevy, rosa-lila				

Tamarix (L.) Tamariske (Tamaricaceae)

H.	<i>odessana</i> (Stev.), bis 2 m hoch werdender Strauch, aufrecht wachsend, Blätter lanzettlich, grau-grün, Blüten klein, hellrosa, in 3 cm langen Ähren zu Rispen vereint, Blütezeit Juni-August	60—80 80—100	1,— 1,20	9,— 11,—	50,— 100,—
	<i>pentandra</i> (Pall) (T. <i>hispida aestivalis</i> (hort.)), 3—4 m hoch werdender Strauch, Zweige purpur überhängend, Blätter lanzettlich, bläulich-grün, Blüten lebhaft rosa in kleinen Ähren, die zu großen Rispen vereint sind, Blütezeit Ende Juni-August	60—80 80—100	1,75 2,25	16,— 20,—	140,— 180,—
H.	<i>tetrandra</i> (Pall), 3—4 m hoher Strauch mit überhängenden dunkelbraun-roten Zweigen. Blätter schuppenförmig, ei-lanzettlich, lebhaft grün, Blüten hellrosa in kleinen seitenständigen Ähren längs der vorjährigen Zweige. Blütezeit Mai	80—125	1,—	9,—	80,—
E.	<i>purpurea</i> (Boiss.) (D. C.), in Südosteuropa beheimatetes, sehr wertvolles, winterhartes Gehölz mit tiefbraunroten Zweigen und hellrosa Blütenähren, vollkommen unempfindlich gegen Salz und sehr gut zu verwenden bei Uferbefestigungen	80—100	1,—	9,—	80,—

Teucrium (L.) Gemandr (Labiatae)

H.St.	<i>chamaedris</i> (L.), kleiner, immergrüner Halbstrauch, Blätter gegenständig, spitz, ei-länglich, lebhaft glänzend grün, behaart. Blüten purpur, in engständigen lockeren kleinen Trauben. Blütezeit Juli-Oktober. Für niedrigere Hecken bestens geeignet	15—20	—,40 —,60	3,30 5,50	30,— 50,—
	Einfassungsware pr. lfd. m				

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Tilia (L.) Linde (Tiliaceae)					
	<i>americana megalodonta</i> (Engl) <i>americana dentata</i> (Rehd.), sehr kräftiger Wuchs, sehr großblättrige, sattgrüne Belaubung	8—10 10—12	8,50 11,—	77,— 100,—	700,— 900,—
	Alleebäume, Stammumfang	12—14	20,—		
	in extra weitem Stand verpflanzt	14—16 16—18 18—20 20—25	25,— 33,— 44,— 61,—		
B.H.R.					
	<i>euchlora</i> (K. Koch) (T. <i>dasystyla</i>) (Loud). Krimlinde. Bis 20 m hoher Baum mit rundlicher oder ovaler Krone und grüner, leicht überhängender Bezweigung. Blätter glänzend dunkelgrün, unten hellgrün, außerordentlich widerstandsfähig gegen Staub und Rauch	8—10 10—12 12—14	8,50 11,— 13,50	77,— 100,— 120,—	700,— 900,— 1100,—
	Alleebäume, Stammumfang	14—16	17,—	155,—	1400,—
B.H.R.					
	<i>grandifolia</i> (Ehrh.) (T. <i>platyphyllos</i>) (Scop). Großblättrige Sommerlinde. Bis 40 m hoher Baum mit breiter, eiförmiger Krone. Blätter groß, lebhafte grün. 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,80 2,25 2,75 3,60 4,40	16,50 20,— 25,— 33,— 40,—	150,— 180,— 225,— 300,— 360,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	200—250 250—300 300—350	10,— 18,— 25,—		
	mit Ballen				
	Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	7,25 8,50 11,— 13,50	66,— 77,— 100,— 120,—	600,— 700,— 900,— 1100,—
	Alleebäume, Stammumfang	12—14	16,—		
	in extra weitem Stand verpflanzt	14—16 16—18 18—20 20—25	19,— 25,— 33,— 44,—		
B.H.R.S.					
	<i>intermedia</i> (D. C.) (T. <i>vulgaris</i>) (Hayne) (T. <i>hollandica</i>) (hort.) (T. <i>europaea</i>) (L.) (T. <i>parvifolia</i> × <i>grandifolia</i>). Holländische Linde. Bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone und frischgrüner Belaubung, reichblühend. Vorzügliche Bienenweide. Allgemein beliebter Straßenbaum	8—10 10—12 12—14	7,25 8,50 11,—	66,— 77,— 100,—	600,— 700,— 900,—
	Hochstämme, Stammumfang	12—14	16,—		
	in extra weitem Stand verpflanzt	14—16 16—18 18—20 20—25 25—30 30—35	19,— 25,— 33,— 44,— 61,— 77,—		
B.H.R.S.V.					
	<i>parvifolia</i> (Ehrh.) (T. <i>cordata</i>) (Mill) (T. <i>ulmifolia</i>) (Scop). Steinlinde. Bis 30 m hoher Baum mit ausladender Krone. Blätter verhältnismäßig klein, sattgrün. Blüten gelblich-weiß, stark duftend, in der ersten Hälfte des Juli erscheinend, außerordentlich reich blühend, sehr gute Bienenweide. 2 × verpflanzte Heister aus weitem Stand	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,80 2,25 2,75 3,60 4,40	16,50 20,— 25,— 33,— 40,—	150,— 180,— 225,— 300,— 360,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig	200—250 250—300 300—350	10,— 18,— 25,—		
	mit Ballen				
	Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	7,25 8,50 11,— 13,50	66,— 77,— 100,— 120,—	600,— 700,— 900,— 1100,—
	Alleebäume, Stammumfang	10—12	12,—		
	in extra weitem Stand verpflanzt	12—14 14—16 16—18	16,— 19,— 25,—		
B.R.					
	<i>tomentosa</i> (Mnch.) (T. <i>argentea</i>) (Dest) (T. <i>alba</i>) (Waldst. u. Kit). Ungarische Silberlinde. Bis 30 m hoher Baum mit dichter, breitpyramidaler Krone. Blätter dunkelgrün, unten schneeweiß filzig. Herbstfärbung goldgelb. Sehr beliebter Straßenbaum. Widerstandsfähig gegen Staub und Rauch	8—10 10—12 12—14	8,50 11,— 13,50	77,— 100,— 120,—	700,— 900,— 1100,—
	Alleebäume, Stammumfang				

Ulex (L.) Stechginster (Leguminosae)

	Höhe cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
I.R.St.W. <i>europaeus</i> (L.), niedriger, sehr stacheliger und sparrig verzweigter Strauch, kaum 1 m hoch. Blätter zu lanzettlichen, langen Stacheln umgewandelt. Blüten goldgelb. Blütezeit Mai-Juni. Geeignet für trockenen und sandigen Boden. Gegen große Kälte empfindlich mit Topfballen	20—40 40—60	1,— 1,20	9,— 11,—	80,— 100,—

Ulmus (L.) Ulme, Rüster (Ulmaceae)

B.H.R. <i>campestris</i> (L.) (foliacea) (Gilib) (nitens) (Mnch.) (glabra)	125—150	1,50	13,50	125,—
S.V. (Mill.) (carpinifolia) (Gleditsch). Feldrüster. Starkwüchsiger Baum, Borke grau und tiefrissig. Blätter ei-elliptisch, sehr schief, zugespitzt, 6—8 cm lang, doppelt gesägt	150—200 200—250 250—300	1,80 2,25 2,75	16,50 20,— 25,—	150,— 180,— 225,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	5,— 6,—	45,— 55,—	400,— 500,—
<i>dampieri</i> wredei (Rehd.) (U. <i>carpinifolia</i> wredei)	60—80	2,50		
aufrecht wachsende, säulenförmige Sorte mit lebhaft goldgelbem Laub	80—100 100—125 125—150	3,50 4,50 6,—		

Viburnum (L.) Schneeball (Caprifoliaceae)

B.S.R.St. <i>burkwoodii</i> (Burkw.) (Carlesii $\times$ utile), Wuchs sparrig. Blätter ei-elliptisch bis eiförmig, 4—7 cm lang, oben glänzend tiefgrün, unten graugrün filzig. Blüten duftend, in dichten 5—7 cm breiten Scheindolden, zuerst rosa, später reinweiß mit Ballen	30—40 40—60 60—80	4,— 5,30 7,—	36,— 48,— 64,—	330,— 440,— 580,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	60—80 80—100 100—125 125—150	10,— 12,— 14,— 18,—		
R.St. <i>carlesii</i> (Hemsl.), bis 1,5 m hoher, breiter, rundlicher Strauch. Blätter breit eiförmig, trüb grün, unten heller. Blüten sehr wohlriechend, weißlich-rosa, in dichter, halbkugeligem Scheindolde. Blütezeit Ende April-Mai mit Ballen	30—40 40—60 60—80	5,— 7,— 9,—	45,— 63,— 80,—	
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	60—80 80—100	11,— 15,—		
B.R.St. <i>juddii</i> (Rehd.) (V. <i>carlesii</i> $\times$ <i>bitchiuense</i>) verbesserte Sorte der <i>Viburnum carlesii</i> mit großen Blütenständen mit Ballen	30—40 40—50	5,— 7,—	45,— 63,—	
F.H.R.S. <i>lantana</i> (L.), bis 5 m hoher, aufrechter Strauch mit filzigen Trieben. Blätter länglich eiförmig, dicht gezähnt, oben dunkelgrün, unten dicht graufilzig. Blüten weiß, in bis 10 cm breiten Doldenrispen. Blütezeit Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz	60—80 80—100	1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100—125 125—150	5,— 6,—		
F.H.S.V. <i>opulus</i> (L.), gemeiner Schneeball. Bis 4 m hoher, hellgrau rindiger Strauch. Blätter 3—5lappig, unregelmäßig gezähnt, lichtgrün. Blüten rahmweiß, in bis 10 cm breiten Scheindolden mit vergrößerten, unfruchtbaren Randblüten. Frucht rund-oval, rot mit Ballen	60—80 80—125 100—125 125—150	1,20 1,50 5,— 6,—	11,— 13,50	100,— 120,—
<i>sterile</i> (D. C.), Gefülltblühender Schneeball. Bekannter Zierstrauch, der sich im Mai-Juni mit weißen b's rötlich überlaufenen Blütenbällen bedeckt		1,20 1,50	11,— 13,50	100,— 120,—
5-8 Triebe				
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	100—125 125—150	5,— 6,—		
Halbstamm, Stammhöhe	100—120 120—140	7,50 9,—		
F.H.I.R. <i>rythidophyllum</i> (Hemsl.), immergrüner bis 4 m hoher Strauch. Blätter länglich eiförmig bis 25 cm lang, glänzend dunkelgrün, stark runzelig, unterseits dicht grau- oder gelbfilzig. Blüten rahmweiß in 15—20 cm breiten Doldenrispen. Blütezeit Mai-Juni. Frucht kurz, oval, zuerst rot, dann glänzend schwarz mit Ballen	40—60 60—80 80—100	5,30 7,— 12,—	48,— 64,—	440,— 580,—
Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbuschig mit Ballen	80—100 100—125	14,— 18,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Viburnum (L.) Schneeball (Caprifoliaceae)					
L.	tomentosum (Tbg.) (V. plicatum) (Mig.), bis 3 m hoher, breitrundlicher Strauch, Blätter länglich-oval, bis 12 cm lang, dunkelgrün, unten grauhaarig, Herbstfärbung dunkelviolettblau-braun. Blüten weiß, in bis 10 cm breiten Doldenrispen, mit breiten, langgestielten sterilen Randblättern. Frucht ei-oval, zuerst korallenrot, dann blau-schwarz mit Ballen	60—80 80—100	2,25 3,50	20,—	180,—
L.	sterile (K. Koch) (V. tom. plicatum) (Maxim), japanischer Schneeball, schneeweiße, sterile Blüten, in gegen 8 cm breiten kugeligen Ballen sitzend mit Ballen	40—60 60—80 60—80 80—100	4,50 5,50 10,— 15,—	40,— 50,—	
Vinca (L.) Immergrün (Apocynaceae)					
I.S.St.	minor (L.), bekannter kleiner Immergrün mit lila-blauen Blüten	5—8 Triebe 8—12 Triebe 12—20 Triebe	—,40 —,50 —,60	3,60 4,40 5,—	33,— 40,— 45,—
Einfassungspflanzen per lfd. m			—,65	5,50	50,—
Weigela (Thunb.) Weigelie (Caprifoliaceae)					
	Abel Carriere großblumige, lebhaft rosa-karminrot . . .	70—100	1,50	13,50	120,—
	candida Blüte groß, reinweiß	60—80	1,50	13,50	120,—
R.S.	florida (S. e. Z.) (Diervilla amabilis) (Hort.) (Weigela rosea) (Ldl.) (Diervilla rosea) (Walpers) (Weig. amabilis) (Hort.), bis 3 m hoher Strauch. Blätter fast sitzend, ei-länglich, 5—10 cm lang. Blüten rosa 3 cm lang, aus engem Grunde plötzlich stark erweitert	80—120 80—100 100—150	1,20 4,— 5,—	11,—	100,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbusch'g . . mit Ballen				
	groenewegeni, stark wachsende Weigela mit rot-weiß-gestreifter Blüte	80—125	1,20	11,—	100,—
R.S.	Eva Rathke (Rathke), schwach wachsend, Blüte dunkelbraun-rot, sehr reichblühend	60—80 80—100	1,50 1,75	13,50 16,—	120,— 140,—
	Einzelpflanzen natürlich gewachsen, breitbusch'g . . mit Ballen	80—100 100—125 125—150	6,— 8,— 12,—		
R.S.	Verschaffeltii (Hort.), Blüten purpur-rosa mit weißem Saum	80—120	1,20	11,—	100,—
	van Houttei, Blüte groß und mit rosa Farbe	80—125	1,20	11,—	100,—
	Newport Red dunkelrote, wertvolle Sorte	60—100	1,50	13,50	120,—

Schlingpflanzen

Actinidia (Ldl.) Strahlengriffel (Actinidiaceae)					
F.V.	arguta (Miq.), hochschlingend, Blätter ei-elliptisch, 8—12 cm lang, zugespitzt, scharf gesägt, dunkelgrün, Blüten zu 3 und mehr, weiß, im Grunde bräunlich, 2 cm breit, duftend mit Ballen	60—80	1,80	16,—	
Akebia (Dcne.) Akebie (Lardizabalaceae)					
F.V.	quinata (Dcne.) hochschlingender, halbbimmergrüner Strauch mit dekorativen bis 15 cm langen blaube-reiften Früchten mit Ballen	100—150	2,50		

Ampelopsis siehe unter Parthenocissus

Aristolochia (L.) Osterluzei, Pfeifenwinde (Aristolochiaceae)					
S	durior (Hill) (A. siphon) (L. Hérin) (A. macrophylla) (Lam), mehrere Meter hoch schlingend mit großen, herzförmigen Blättern und pfeifenähnlichen Blüten mit Ballen	3 Triebe	8,—		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Campsis (Lour.) Trompetenblume (Bignoniaceae)					
W.	<i>grandiflora</i> (Schom.) (C. chinensis) (Voss) (Bignonia chin.) (Lam.) (Tecoma chin.) (K. Koch) (Tecoma grandifl.) (Loisel.). Blättchen eilanzettlich, gesägt. Blüten scharlachrot, in größeren, lockeren, endständigen Rispen mit Ballen		4,50		
W.	Mme. Galen (C. tagliabuana Mme. Galen) reicher, Intensiver, scharlachroter Blüher August-September mit Ballen		4,50		
	<i>radicans</i> (Seem.) (Tecoma radicans, Juss.) (Bignonia rad. L.) bis 10 m hoch werdender, mit Luftwurzeln kletternder Strauch mit scharlachroten endständigen Blütenrispen mit Ballen		4,—		
Celastrus (L.) Baumwürger (Celastraceae)					
F.S.V.	<i>orbiculata</i> (Thbg.) (C. articulata) (Thbg.), bis 12 m windend. Blätter eiförmig, 5—10 cm lang, plötzlich zugespitzt, kerbig gesägt, beiderseits hellgrün, Blüten blaßgrün, in kurzen, beiderseitigen Trugdolden Juni. Frucht tiefgelb, Samen scharlachrot mit Ballen	80—125	1,80	15,—	
Clematis (L.) Waldrebe (Ranunculaceae)					
	<i>alpina</i> (Alpenwaldrebe) bis 2 m hoch werdende Sorte mit hellblauen zartrosa oder weißen Blüten mit Topfballen		2,—	18,—	
	großblumige Sorten. Die Blüten haben einen Durchmesser von 10—14 cm. Blütezeit Juni-Oktober. Sie lieben sonnige Lage, aber beschattete Baumscheibe Veredlungen mit Topfballen		3,—	27,—	240,—
Sorten:					
	Blue Gen, hellblau				
	Daniel Deronda, violettblau				
	Duchess of Sutherland, blaßrot				
	Crimson King, dunkelrot				
	Fair Rosamond, weiß mit zartlila Mitte				
	Gipsy Queen, tief dunkelviolettblau				
	Huldine, weiß kleinblumig				
	Jackmanii, dunkelviolettblau				
	Jackmanii Superba, violett purpur				
	Lady Balfour, dunkelblau mit weißer Mitte				
	Lazursterne, tiefblau mit weißen Staubfäden				
	Mad. de Coultré, reinweiß				
	Mme. Baron-Veillard, zart lila				
	Nelly Moser, rosa-weiß				
	Prins Hendrik, hellblau				
	Sir Carnet Wolsely, zart lavendelfarbig				
	Ville de Lyon, rot				
	W. E. Gladstone, sehr groß, hellblau				
	<i>montana</i> (Buch-Ham.), stark rankend, reich blühend, Blüte weiß mit Topfballen		3,—	27,—	240,—
S.V.	<i>montana rubens</i> (Ktze), stark rankend, reichblühend, Blüten rosa mit Topfballen		3,—	27,—	240,—
	<i>paniculata</i> (Thunb.) starkwüchsig und winterhart mit kleinen, weißen, wohlriechenden, rispenartigen Blütenständen mit Topfballen	60—100	3,—	27,—	240,—
F.R.S.V.	<i>vitalba</i> (L.), gemeine Waldrebe, weißblühend, federrartige Fruchtstände mit Topfballen		1,—	9,—	80,—
R.S.V.	<i>viticella</i> (L.), blaue Waldrebe, über 3 m hoch schlängelnd, lila-blaue, breitlockige Blüten, Juni bis Herbst mit Topfballen		3,—	27,—	240,—
Glycine siehe unter Wistaria					
Hedera (L.) Efeu (Araliaceae)					
B.I.S.V.	<i>helix</i> (L.), Gemeiner Efeu mit Ballen	40—60 60—80 80—100	1,35 1,70 2,50	11,— 15,50 22,50	100,— 140,— 200,—
B.I.S.	<i>hibernica</i> (Kirchn), großblättriger Efeu, Laub hellgrün, mit Ballen	40—60 60—80 80—100	1,35 1,70 2,50	11,— 15,50 22,50	100,— 140,— 200,—

Kletterrosen siehe unter Rosen

Lonicera (L.) Geißblatt, Heckenkirsche
(Caprifoliaceae)

brachypoda, siehe unter L. japonica

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
F.	brownii fuchsoides (Rehd.) (L. fuchsoides) (K. Koch), mit granatroten Blüten	80—125	4,—	36,—	320,—
	punicea (Rehd.) (L. punicea) (K. Koch), Blüte korallen, rot	80—125	4,—	36,—	320,—
F.V.	caprifolium floridum (hort.), starkwüchsige, winterharte Sorte mit gelbroten Blüten in reicher Fülle	80—125	3,—	27,—	240,—
F.	heckrotii (Rehd.), sehr reich blühend, Knospen purpur, beim Öffnen der Blüten in violett übergehend, Innen- seite der Blüten weiß, später hellgelb, duftend, Beeren purpurrot	60—100	4,—	36,—	320,—
	henry (lanuginosa Hybr.) mäßig schlingende, immer- grüne, gelbrote Blüten im Juli, Frucht schwarz-purpur mit Ballen	60—80	4,—	36,—	320,—
	flexuosa (Thbg) (L. brachypoda) (D. C.) (Caprifolium flexuosum) (Hort.), mittelhoher Schlinger mit duft- enden weißen, im Verblühen hellgelben Blüten	80—100	1,80	16,50	150,—
F.V.	periclymenum (L.), bekanntes Waldgeißblatt, Blüte gelb- lich-weiß, wohlriechend	100—150	1,80	16,50	150,—
	tellmanniana (Spaeth), mit großen goldgelben Blüten	80—125	3,—	27,—	240,—

Menispermum Mondsame (Menispermaceae)

F.	canadense (L.), bis 4 m windend, Blätter eirundlich, stumpf gelappt, tiefgrün, unten graugrün mit Topfballen	80—100	2,40	20,—	180,—
----	---	--------	------	------	-------

Parthenocissus Jungfernebe, wilder Wein

(Vitaceae)

	heterophylla , hochrankend, Blätter meist dreilappig ge- kerbt mit Topfballen	1,50	13,50	120,—
B.F.L.R.V.	quinquefolia (Planch) (<i>Ampelopsis quinquefolia</i>) (Michx). Wilder Wein, hochrankend, leuchtende Herbstfärbung, extra starke, aufgebundene Pflanzen .. 3—5 Triebe	1,10	10,—	90,—
	5—8 Triebe	1,50	13,50	120,—
	8—12 Triebe	2,20	20,—	180,—
B.L.R.V.	engelmannii (Rehd.) (<i>Ampelopsis Engelmannii</i>) (hort.) Selbstklimmer. Aufgebundene Pflanzen .. 3—5 Triebe	1,10	10,—	90,—
	5—8 Triebe	1,50	13,50	120,—
	8—12 Triebe	2,20	20,—	180,—
B.L.R.V.	tricuspidata veitchii (Rehd.) (<i>Ampelopsis Veitchii</i>) (hort.) (<i>A. inconstans</i>) (Miq), echter Selbstklimmer, schönste Art mit wunderbarer Herbstfärbung, Freilandware ..			
	1jähr. Veredelungen Freiland	40—60	—,90	8,—
	2jähr. Veredelungen Freiland	60—100	1,25	11,—
	1jähr. Veredelungen mit Topfballen	40—60	1,25	11,—
	2jähr. Veredelungen mit Topfballen	60—100	1,65	15,—

Polygonum (L.) Knöterich (Polygonaceae)

B.V.	aubertii (Henry), raschwachsender Schlinger mit weißen Blüten, I. Gr.	125—200	2,—	18,—	160,—
------	---	---------	-----	------	-------

Vitis (L.) Rebe (Vitaceae)

	odoratissima (Don.) (V. vulpina) (L), Duftrebe, üppiger Schlinger, beliebter Zierwein	2,50	22,50		
--	---	------	-------	--	--

Wistaria (Nutt) Wistarie, Glycine (Leguminosae)

B.	sinensis (Sweet) (W. chinensis) (D. C.) (Glycine sinen- sis) (Sm) (Glycine multijuga) (Clem) (W. polysta- chia) (K. Koch), wüchsiger Schlinger mit schönen hellblauen Blütentrauben	7,50			
----	---	------	--	--	--

Topffichten

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
<i>Picea excelsa</i> für Töpfe, dunkelgrüne, dichtverzweigte Pflanzen, ohne Ballen	20—30	—,50	4,50	40,—
Balkonfichten mit Fehlern zum Dichtpflanzen von Balkonkästen, ohne Ballen, 20 % billiger	30—40	—,60	5,50	50,—
	40—60	—,70	6,50	60,—
	60—80	—,90	8,50	80,—

Koniferen

Zur besonderen Beachtung!

1. Sämtliche von uns gelieferten Koniferen sind regelmäßig verpflanzt und umstochen und haben feste Wurzelballen, so daß bei sachgemäßer Pflege ein freudiges Weiterwachsen nach dem Versand garantiert ist.
2. Immergrüne Gehölze entziehen dem Ballen während des Transportes viel Feuchtigkeit, und es besteht die Möglichkeit, daß die Pflanzen in trockenem Zustand ankommen. Deshalb ist ein durchdringendes Wässern der ankommenden Pflanzen dringend erforderlich. Weitmächtige Ballentücher, mit welchen Koniferen bis zur Höhe von 3 m geliefert werden, dürfen beim Pflanzen nicht abgenommen werden. Bei stärkeren Ballentüchern ist nur ein Lösen des Knotens erforderlich. Am sonnigen und zugigen Standort wird es erforderlich sein, einen entsprechenden Schutz für die ersten Wochen der Pflanzung herzurichten.
3. Vor Eintritt starker Frostperioden ist es angebracht, alle Immergrünen und Koniferen, insbesondere neugepflanzte, gründlich zu wässern und dadurch die Frostgefahr (vertrocknen) zu verringern.

Zeichenerklärung:

- E = für Einzelgehölze geeignet
H = für Heckenpflanzen geeignet
R = Rauchharte Gehölze für Industriegebiete
S = für schattige Lagen und als Unterholz geeignet
St = für Steingärten usw. geeignet
V = für Vogelschutzpflanzung geeignet

Abies (Mill) Tanne (Pinaceae)

	<i>alba</i> (Mill) (<i>A. pectinata</i>) (D. C.). Edel- oder Weißtanne.	40—60	3,10	25,—
	Bis über 60 m hoch, Benadelung hellgrün	60—80	3,90	31,—
		80—100	5,—	40,—
		100—125	6,25	50,—
R.	<i>arizonica</i> (Merriam). Korktanne. Gegen 15 m hoher Baum mit korkiger, rahmweißer Rinde und glänzendgrünen, unten silberweißen Nadeln	30—40	5,—	40,—
		40—60	6,25	50,—
		60—80	8,30	66,—
		80—100	11,—	90,—
		100—125	15,—	
E.	<i>balsamea</i> (Mill). Balsamtanne, 20—25 m hoch, glatte aschgraue Rinde, Nadeln dunkelgrün mit weißen Spaltöffnungslinien	40—60	3,10	25,—
		60—80	3,90	31,—
		80—100	5,—	40,—
		100—125	6,25	50,—
		125—150	8,30	66,—
E.	<i>brachyphylla</i> (Maxim) (<i>Abies homolepis</i>) (S. et Z.). Nikkotanne, breite, kegelförmige Tanne, bis 40 m Höhe, widerstandsfähig	40—60	6,25	50,—
		60—80	8,30	66,—
		80—100	11,—	90,—
		100—125	15,—	120,—
E.R.	<i>concolor</i> (Ldl. et Gord.). Koloradotanne, blau-grüne, lange Nadeln, bis 40 m hoch werdend, vollständig winterhart	30—40	5,—	40,—
		40—60	6,25	50,—
		60—80	8,20	66,—
		80—100	11,—	90,—
		100—125	15,—	120,—
		125—150	18,—	145,—
		150—175	23,—	220,—
		175—200	34,—	270,—

Abies (Mill) Tanne (Pinaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
E. nordmanniana (Spach). Nordmanns Tanne, Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln unterseits weiß, Höhe bis 50 m	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	5,— 6,25 8,20 11,— 13,—	40,— 50,— 66,— 90,— 120,—	
pectinata siehe alba				
E. veitchii (Ldl.) (A. nephrolepsis) (Maxim). Bis 25 m hoch, schöne, regelmäßige Wuchsform, Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits kreideweiß	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	6,25 8,20 11,— 13,— 18,— 28,—	50,— 66,— 90,— 120,— 145,— 220,—	

Biota orientalis siehe unter Thuja orientalis

Cedrus (Link) Zeder (Pinaceae)

E. atlantica glauca (Carr). Blau-grüne Form der nordamerikanischen Atlas-Zeder, braucht geschützten Standort	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	5,— 6,25 8,30 11,— 13,— 18,— 28,—		
pendula Trauerform der Atlas-Zeder mit stark hängenden Zweigen	40—60 60—80 80—100	12,— 14,50 20,—		
E. deodara (Laws.) pyramidalwachsender Baum aus dem Himalajagebiet, mit leicht überhängenden Zweigen und interessanter Benadelung	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,90 5,— 6,25 8,20 11,— 14,—	31,— 40,— 50,— 66,— 90,— 110,—	

Chamaecyparis (Spach) Scheinzypresse (Pinaceae)

H.R.V. lawsoniana (Parl.). Sehr hoch werdender Baum, Zweige und Spitzentrieb leicht überhängend, grün	40—60 60—80 80—100 100—125	1,10 1,65 2,25 3,10	9,— 13,50 18,— 25,—	30,— 120,— 160,— 220,—
H.V. alumii (Beiß). schlanke Säule von stahlblauer bis stahlgrauer Farbe	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	2,25 3,10 3,90 5,— 8,20 11,— 14,—	18,— 25,— 31,— 40,— 66,— 90,— 110,—	160,— 220,— 280,— 360,— 600,— 800,— 1000,—
St. ellwoodii (Hort.), eine langsam wachsende, sehr gesunde, dunkelgrüne Zypressenart von geschlossenem Wuchs, der Chamaecyparis fletscheri sehr ähnlich	30—40 40—50 50—60 60—80 80—100	3,30 4,50 5,60 6,90 9,—	27,— 36,— 45,— 55,— 72,—	240,— 320,— 400,— 500,— 650,—
erecta viridis (Hort.), schlanker, aufstrebender Wuchs, frischsaftig grün	40—60 60—80 80—100	2,75 3,10 3,90	18,— 25,— 31,—	160,— 220,— 280,—
St.E. fletscheri (Fletscher & Sons), langsamwachsende bläulichgrüne Säulenform, mit aufstrebenden Zweigen	30—40 40—60 60—80 80—100	3,10 3,90 5,— 6,25	25,— 31,— 40,— 50,—	220,— 280,— 360,— 450,—
St.E. forsteckensis glauca (Beiß), flachrunde, grau-grüne Zwergform	15—20 20—25 25—30 30—40 40—50	4,40 6,— 6,75 7,50 9,30	36,— 48,— 54,— 60,— 74,—	320,— 430,— 480,— 540,— 670,—
intertexta locker wachsende Form mit weit überhängenden, dunkelgrünen Zweigen	40—60 60—80 80—100	3,90 5,— 6,25	31,— 40,— 50,—	280,— 360,— 450,—
St.E. minima glauca (Hort.), zwergig wachsende, dicht verzweigte Kugeln, mit dunkelgrüner Färbung	15—20 20—25 25—30 30—40 40—50	4,40 6,— 6,75 7,50 9,30	36,— 48,— 54,— 60,— 74,—	320,— 430,— 480,— 540,— 670,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Chamaecyparis lawsoniana (Sprach) Scheinzypresse (Pinaceae)					
H.E.	Silver Queen (hort.), locker wachsende Pyramiden mit silberweißer Benadelung	40-60 60-80 80-100 100-125	3,90 5,— 6,25 8,20	31,— 40,— 50,— 66,—	
E.	stewartii (hort.), im Austrieb goldgelb, nachher Bezweigung goldgelb durchsetzt	40-60 60-80 80-100 100-125	5,— 6,25 8,20 11,—	40,— 50,— 66,— 90,—	
H.V.	Triumph von Boskoop (hort.), lockere Pyramiden mit abstehender, blau-grüner Bezweigung	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	3,90 5,— 6,25 8,20 11,— 17,—	31,— 40,— 50,— 66,— 90,— 135,—	280,— 360,— 450,— 600,—
	wisselii (Hort.), säulenförmig und dekorativ wachsende Art mit interessanter, farnwedelartiger, schwärzlichgrüner Belaubung	40-60 60-80 80-100 100-125	3,10 3,90 5,— 6,25	25,— 31,— 40,— 50,—	
E.	nootkatensis (Spach), schlank aufstrebender Wuchs, glänzend-grün, unterseits bläulich, leicht überhängend ..	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	3,90 5,— 6,25 8,30 11,—		
	glauca sehr dekorative, schöne, leicht überhängende Form	60-80 80-100 100-125	8,20 11,— 15,—	66,—	
E.St.	pendula (Hort.), sehr schöne Hängeform, die im Einzelstand sehr schön wirkt	40-60 60-80 80-100 100-125	6,25 8,20 11,— 15,—		
E.	obtusa nana aurea (hort.), zwergartig wachsend, mit goldgelber Benadelung	15-20 20-25 25-30 30-40 40-50	4,40 6,— 6,75 7,50 9,30	36,— 48,— 54,— 60,— 74,—	
E.St.	nana gracilllis (hort.), außerordentlich schwachwüchsige Zwergkonifere, sehr zierend	15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60-70	6,— 6,75 7,50 9,30 12,— 15,— 23,—	48,— 54,— 60,— 74,— 96,— 120,— 180,—	430,— 480,— 540,— 670,— 880,—
E.St.	pygmaea (Carr.), zwergartig, wächst mit zurückgebogenen Zweigen und hellgrüner Belaubung	15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-60	3,30 4,50 5,— 5,60 6,90 9,—	27,— 36,— 40,— 45,— 55,— 72,—	
H.R.	pisifera (Sieb u. Zucc), schöne, locker aufgebaute Konifere mit leicht hängenden, weiß gezeichneten Zweigen	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	1,85 2,25 3,10 3,90 5,— 6,25	13,50 18,— 25,— 31,— 40,— 50,—	120,— 160,— 220,— 280,— 360,— 450,—
H.V.	aurea (Carr.), sehr schöne, goldgelbe Varietät	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	2,25 3,10 3,90 5,— 6,25	18,— 25,— 31,— 40,— 50,—	160,— 220,— 280,— 360,— 450,—
E.R.	filifera (Beiß), Form mit langen fadenförmig überhängenden Trieben	30-40 40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	3,10 3,90 6,25 8,20 11,— 14,— 17,—	25,— 31,— 50,— 66,— 90,— 110,— 135,—	220,— 280,— 450,— 600,— 800,— 1000,— 1200,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Chamaecyparis pisifera (Spach) Scheinzypresse (Pinaceae)					
H.R.V.	plumosa (Beiß), zierliche, federartige, krause, dunkelgrüne Bezweigung, für Binderei viel gebraucht	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	2,25 3,10 3,90 5,— 6,25 11,— 14,—	18,— 25,— 31,— 40,— 50,— 90,— 110,—	160,— 220,— 280,— 360,— 450,— 800,— 1000,—
H.	aurea (Beiß), goldgelbe Form der obigeren obigen Sorte, sehr wertvoll für Binderei	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	2,25 3,10 3,90 5,— 6,25 11,— 14,—	18,— 25,— 31,— 40,— 50,— 90,— 110,—	160,— 220,— 280,— 360,— 450,— 800,— 1000,—
H.R.V.	squarrosa (Beißn. et Hochst.), durch Steckling fixierte Jugendform der normalen Pflanze mit silbergrauer Benadelung, beliebte Sorte für Binderei	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	2,25 3,10 3,90 5,— 6,25 11,— 14,—	18,— 25,— 31,— 40,— 50,— 90,— 110,—	160,— 220,— 280,— 360,— 450,— 800,— 1000,—
	sulphurea (Hort.) Sorte wie squarrosa, aber mit schwefelgelber Bezweigung	40—60 60—80 80—100	2,25 3,10 3,90	18,— 25,— 31,—	160,— 220,— 280,—
Cryptomeria (D. Don.) Sichelanne					
Kryptomerie (Pinaceae)					
E.	japonica (Beiss.), sehr dekorativ, hochwachsend, breite, pyramidale Konifere mit blaugrüner Benadelung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	5,— 6,25 8,20 11,— 14,—	40,— 50,— 66,— 90,— 110,—	360,— 450,— 600,— 800,— 1000,—
Ginkgo (L.) Ginkgobaum (Ginkgoaceae)					
E.	biloba (L.) (Salisburia adiantifolia) (Sm), laubabwerfende Konifere	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,90 5,— 6,25 8,20 11,— 14,— 17,—	31,— 40,— 50,— 66,— 90,— 110,— 140,—	280,— 360,— 450,— 600,— 800,— 1000,— 1300,—
	Hochstämme, Stammumfang	8—10	25,—		
Juniperus (L.) Wacholder (Pinaceae)					
	chinensis „Blaauw's Varietät“ Chinensis - Zwergform mit blaugrüner Benadelung	20—30 30—40 40—50	5,50 7,50 10,—		
F.H.R. S.St.V.	pfitzeriana (Späth), als Einzelpflanze von schöner Schmuckwirkung und blau-grüner Bezweigung, eine schattenverträgliche und rußfeste Pflanze, je nach Wunsch aufgebundene, ungeschnittene Pflanzen oder natürlich gewachsene, liegende Pflanzen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	3,90 5,— 6,25 11,— 15,— 18,— 28,—	31,— 40,— 50,— 90,— 120,— 145,— 220,—	280,— 360,— 450,— 800,— 1080,— 1300,—
E.R.St.V.	aurea, gelb-bunte Form der J. chin pfitzeriana	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	3,90 5,— 6,25 11,— 15,—	31,— 40,— 50,— 90,— 120,—	280,— 360,— 450,— 800,—
E.St.	procumbens aurea (Beiß) (J. japonica aurea) (Carr), unregelmäßig im Wuchs, Zweige goldgelb	15—20 20—25 25—30 30—40 40—50 50—60	4,40 6,— 6,75 7,50 9,30 12,—	36,— 48,— 54,— 60,— 74,— 96,—	
St.	communis (L.), gemeiner Wacholder, buschiger Wuchs, bildet auch Bäume von größerer Höhe	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,10 3,90 5,— 6,25 11,—	25,— 31,— 40,— 50,— 90,—	220,— 280,— 360,— 450,— 800,—

<i>Juniperus communis</i> (L.) Wacholder (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
E.St.	<i>hibernica</i> (Gord), Irischer Wacholder, schlanke Säulen von blaugrüner Farbe	30—40	2,40	20,—	180,—
		40—60	3,10	25,—	220,—
		60—80	3,90	31,—	280,—
		80—100	5,—	40,—	360,—
		100—125	6,25	50,—	450,—
		125—150	11,—	90,—	800,—
St.	<i>hornibroeki</i> , kriechende Sorte mit hellgrüner Benadelung	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
St.	<i>repanda</i> (Grootend.), eine niedrige, flach auf dem Boden liegende, rußfeste, dunkelgrüne, dicht benadelte Polsterbildnerart	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
		50—60	9,—	72,—	650,—
St.	<i>suecica</i> (Loud), grüne Form der <i>hibernica</i> , vollkommen winterhart	30—40	2,40	20,—	180,—
		40—60	3,10	25,—	220,—
		60—80	3,90	31,—	280,—
		80—100	5,—	40,—	360,—
		100—125	6,25	50,—	450,—
		125—150	11,—	90,—	800,—
		150—175	14,—	110,—	1000,—
St.	<i>horizontalis</i> (Mnch) (J. sab. prostrata) (Loud) (J. prostrata) (Pers) (J. repens) (Nutt), kriechender Wacholder, ... Breite	15—20	2,25	18,—	160,—
		20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
St.	<i>douglasi</i> (Rehd.) eine rußfeste, dicht verzweigte, kriechende Form mit stahlblauer Benadelung	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
St.	<i>glauca</i> (Hort.) (reptans), eine kriechende, für Steingarten geeignete Art Breite	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
		50—60	9,—	72,—	650,—
St.	<i>plumosa</i> , flache, niedrige Form mit waagerechten Zweigen	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
	<i>prostrata</i> siehe unter J. <i>horizontalis</i>				
R.St.	<i>sabina femina</i> (Hort.), Sadebaum, dunkelgrüner, kriechender Wacholder, geeignet für Steingärten	20—30	2,25	18,—	160,—
		30—40	3,10	25,—	220,—
		40—60	3,90	31,—	280,—
		60—80	5,—	40,—	360,—
		80—100	9,—	72,—	650,—
		100—125	11,—	90,—	800,—
R.S.	<i>mas.</i> (Hort.), Belaubung nadelförmig, im Wuchs wie <i>femina</i> Breite	20—30	2,25	18,—	160,—
		30—40	3,10	25,—	220,—
		40—60	3,90	31,—	280,—
		60—80	5,—	40,—	360,—
		80—100	9,—	72,—	650,—
		100—125	11,—	90,—	800,—
E.St.	<i>tamariscifolia</i> (Ait.), ein niedriger, sich am Boden ausbreitender Strauch, Bezweigung hellgrün Breite	20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
St.	<i>squamata meyeri</i> (Rehd.), niedriger, aufrechter Strauch mit weißblauer Benadelung	20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
		60—80	9,—	72,—	650,—
		80—100	11,—	90,—	800,—
		100—125	17,—		

Juniperus (L.) Wacholder (Pinaceae)

wilsonii (Rehd.), aufrechtwachsender, breitbuschiger, bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Benadelung

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
30—40	4,50		
40—50	5,60		
50—60	6,90		

R.V. *virginiana* (L.), breit pyramidal-kroniger Baum mit brauner abblättrender Borke

40—60	1,85	13,50	120,—
60—80	2,25	18,—	160,—
80—100	3,10	25,—	220,—
100—125	3,90	31,—	280,—

burkii (Slavin.), pyramidal wachsende Sorte mit stahlblauer Benadelung

40—60	6,25	50,—	
60—80	8,20	66,—	
80—100	11,—	90,—	

E. *canaertii* (Senecl), interessante, aufrecht- und locker wachsende Form mit leichten, überhängenden, dunkelgrünen Zweigen und hellblau bereiften Beeren

40—60	6,25	50,—	
60—80	8,20	66,—	
80—100	11,—	90,—	
100—125	15,—	120,—	
125—150	18,—	145,—	

E.R.V. *glauca* (Carr.), kräftig pyramidal im Wuchs, satt blaugrüne Färbung

40—60	6,25	50,—	
60—80	8,20	66,—	
80—100	11,—	90,—	
100—125	15,—	120,—	

E.R. *tripartita* (Beißner), niedrigbleibende Form mit ausgebreiteten Ästen und feiner, dichter Bezweigung

30—40	3,10	25,—	220,—
40—60	3,90	31,—	280,—
60—80	5,—	40,—	360,—
80—100	9,—	72,—	650,—

Larix (Mill) Lärche (Pinaceae)

H.R. *europaea* (DC) (L. *decidua*) (Mill), gemeine Lärche, schöner Baum mit geradem Stamm

100—125	2,40	20,—	180,—
125—150	3,25	27,—	240,—
150—200	5,—	42,—	380,—
200—250	6,60	55,—	500,—
250—300	10,—	85,—	750,—
300—350	18,—	160,—	

H.R. *leptolepis* (Murr.) (L. *Kaempferi*) (Sarg), japanische Lärche, schöne blaugrüne Färbung, längere Nadeln als L. *europaea*

100—125	2,40	20,—	180,—
125—150	3,25	27,—	240,—
150—200	5,—	42,—	380,—
200—250	6,60	55,—	500,—
250—300	10,—	85,—	750,—
300—350	18,—	160,—	

Picea (A. Dictr.) Fichte (Pinaceae)

St. *albertiana conica* (Hort.) (P. *glauca conica*) (Rehd.) (P. *canad. conica*) (Fitch), zwergige Form von schmalkegelförmigem, dichtem Wuchs mit feinen dichtbenadelten Zweigen

15—20	2,25	18,—	160,—
20—30	3,30	27,—	240,—
30—40	4,50	36,—	320,—
40—50	5,60	45,—	400,—
50—60	6,90	55,—	500,—
60—80	9,—	72,—	
80—100	11,—	90,—	

H.R.V. *canadensis* (Koehne) (P. *alba*) (Link), Weißfichte, 15-20 m hoher Baum mit blau-grüner Benadelung

40—60	1,85	13,50	120,—
60—80	2,25	18,—	160,—
80—100	3,10	25,—	220,—
100—125	3,90	31,—	280,—
125—150	5,—	40,—	360,—
150—175	8,20	66,—	600,—

H.R.V. *excelsa* (Link), Fichte, Rottanne, der deutsche Weihnachtsbaum

40—60	1,85	13,50	120,—
60—80	2,25	18,—	160,—
80—100	3,10	25,—	220,—
100—125	3,90	31,—	280,—
125—150	5,—	40,—	360,—
150—175	8,20	66,—	600,—
175—200	11,—	90,—	800,—
200—225	14,—	110,—	1000,—
225—250	17,—	135,—	1200,—

St.V. *elambrasiliana* (Carr.), kugelig wachsende Zwergform mit ganz kurzer, dichter Bezweigung und glänzend grünen Nadeln

20—30	3,30	27,—	240,—
30—40	4,50	36,—	320,—
40—50	5,60	45,—	400,—
50—60	6,90	55,—	500,—
60—80	9,—	72,—	
80—100	11,—	90,—	

<i>Picea</i> (A. Dietr.) Fichte (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
E.	<i>exelsa inversa</i> (Beißn.), auffallende Trauerfichte, mit stark überhängenden Zweigen	40—50	12,—		
		50—60	14,50		
		60—70	18,—		
		70—80	21,—		
		80—100	29,—		
St.V.	<i>marxwelli</i> (Beißn.), flachkugelig, dichtzweigig, mit hellgrüner Benadelung	15—20	2,25	18,—	160,—
		20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
St.	<i>nidiformis</i> (Beißn.), kissenbildendes, dichtverzweigtes Polster ohne Mitteltrieb	15—20	2,25	18,—	160,—
		20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
St.V.	<i>pumila glauca</i> (Beißn.), regelmäßige flachrunde Polster bildend, bläuliche Benadelung Breite	15—20	2,25	18,—	160,—
		20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
		40—50	5,60	45,—	400,—
		50—60	6,90	55,—	500,—
St.V.	<i>pygmaea</i> (Carr.), dichtbuschig, etwas unregelmäßig wachsende Zwergform Breite oder Höhe	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
		50—60	9,—	72,—	600,—
		60—70	15,—	120,—	
		70—80	23,—	180,—	
St.V.	<i>remontii</i> (Carr.), dichtbuschig, etwas unregelmäßig wachsend	15—20	3,30	27,—	240,—
		20—25	4,50	36,—	320,—
		25—30	5,—	40,—	360,—
		30—40	5,60	45,—	400,—
		40—50	6,90	55,—	500,—
		50—60	9,—	72,—	600,—
		60—70	15,—	120,—	
		70—80	23,—	180,—	
E.H.R.V.	<i>omorika</i> (Bolle), Serbische Fichte, bis 35 m hoher, schmal pyramidalen Baum mit kurzen, dichten Ästen	40—60	3,10	25,—	220,—
		60—80	3,90	31,—	280,—
		80—100	5,—	40,—	360,—
		100—125	6,25	50,—	450,—
		125—150	8,20	66,—	600,—
		150—175	11,—	90,—	800,—
		175—200	14,—	110,—	1000,—
		200—225	17,—	135,—	1200,—
		225—250	22,50	180,—	1600,—
		250—275	28,—	220,—	2000,—
		275—300	40,—	330,—	3000,—
E.S.V.	<i>orientalis</i> (Carr.), Kaukasus- oder Sapindusfichte, 40 m hoher Baum, verträgt sehr gut Schatten, dunkelgrüne Benadelung	30—40	5,—	40,—	360,—
		40—60	6,25	50,—	450,—
		60—80	8,20	66,—	
		80—100	11,—	90,—	
		100—125	15,—	120,—	
H.R.V.	<i>pungens</i> (Engelm.), Stechfichte, steif abstehende Äste, schöne grau-grüne Färbung, vollständig winterhart..	40—60	3,10	25,—	220,—
		60—80	3,90	31,—	280,—
		80—100	5,—	40,—	360,—
		100—125	6,25	50,—	450,—
E.H.R.V.	<i>glauca</i> (Beiß), Blaufichte, aus Samen gezogen	40—60	6,25	50,—	450,—
		60—80	8,20	66,—	600,—
		80—100	11,—	90,—	800,—
		100—125	15,—	120,—	1080,—
E.	<i>kosteri</i> (Koster), charakteristisch der streng etagenmäßige Aufbau der Äste, tiefblaue Benadelung	30—40	9,—	75,—	
		40—50	12,—	100,—	
		50—60	14,50	120,—	
		60—70	18,—	150,—	
		70—80	21,—	180,—	
		80—100	29,—	240,—	
		100—125	40,—		
		125—150	48,—		

Picea (A. Dict.) Fichte (Pinaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
E.	vuykii (hort.), bildet regelmäßig gewachsene Pyramiden mit tiefblauer Färbung	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—100 100—125 125—150	9,— 12,— 14,50 18,— 21,— 29,— 40,— 48,—	75,— 100,— 120,— 150,— 180,— 240,—	

V.	sitchensis (Carr.) (P. sitkaensis) (Carr.), Sitka-Fichte, anspruchsloser, steil pyramidalen Baum mit harter, stechender Benadelung von bläulicher Farbe	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225	2,25 3,10 3,90 5,— 8,20 11,— 14,—	18,— 25,— 31,— 40,— 66,— 90,— 110,—	160,— 220,— 280,— 360,— 600,— 800,— 1900,—
----	--	--	---	---	--

Pinus (L.) Kiefer (Pinaceae)

E.R.	cembra (L.), Zübelkiefer von schmalem Wuchs, bis 20 m hoch, auch für rauhe Lagen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	5,— 6,25 8,20 11,— 15,— 18,—	40,— 50,— 66,— 90,— 120,— 145,—	360,— 450,— 600,— 800,— 1989,— 1300,—
------	--	---	---	--	--

E.	excelsa (Wall) (P. nepalensis) (Chambs), Tränenkiefer mit hängenden Nadeln, hoher Baum	40—60 60—80 80—100 100—125	5,— 6,25 11,— 15,—	40,— 50,— 90,— 120,—	
----	--	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

H.R.	montana (Mill), Krummholzkiefer mit niederliegenden Ästen, sehr anspruchslos	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	2,40 3,10 6,25 8,20 11,—	20,— 25,— 50,— 66,— 90,—	180,— 220,— 450,— 690,— 800,—
------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

H.R.	mughus (Willk), niedriger als die Stammart, mehr breit als hoch	20—30 30—40 40—50 50—60	2,25 3,30 4,50 5,60	18,— 27,— 36,— 45,—	160,— 240,— 320,— 400,—
------	---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

H.R.St.	pumilio (Willk.), zwergartiger Wuchs, dicht ver- zweigt, mit dichter Benadelung ..	20—30 30—40	3,30 4,50	27,— 36,—	240,— 320,—
---------	--	----------------	--------------	--------------	----------------

E.R.	nigra austriaca (Am. G.) (P. laricio austriaca) (Endl) (P. austriaca) (Höss), Österreichische Schwarzkiefer, bis 30 m hoch, breit, schirmf. Krone, dunkelgrüne Benadelung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	5,— 6,25 11,— 15,— 18,— 28,—	40,— 50,— 90,— 120,— 145,— 220,—	360,— 450,— 800,— 1080,—
------	---	---	---	---	-----------------------------------

V.	silvestris (L.), unsere heimische Waldkiefer	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	3,10 3,90 5,— 8,20 11,—	25,— 31,— 40,— 66,— 90,—	220,— 280,— 360,— 690,— 800,—
----	---	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

E.St.V.	wateriana (Hort), dichte, rundlich-kugelige Zwerg- form von stahlblauer Färbung	20—25 25—30 30—40 40—50 50—60	6,75 7,50 9,30 12,— 15,—	54,— 60,— 74,— 96,— 120,—	480,— 540,— 670,— 880,—
---------	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Pseudotsuga (Carr.) Douglastanne (Pinaceae)

R.	taxifolia caesia (Brit) (P. Douglasi caesia) (Schwer), graue Form der Stammart, völlig winterhart	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275	2,25 3,10 3,90 5,— 6,25 8,20 11,— 14,— 17,— 22,50	18,— 25,— 31,— 40,— 50,— 66,— 90,— 110,— 135,— 180,—	160,— 220,— 280,— 360,— 450,—
----	--	---	--	---	---

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Taxodium (Sumpfyypresse) (Pinaceae)					
(Clupressus distica) (L.)					
	distichum (Rich.) pyramidal wachsender Baum mit frischgrünen Nadeln, die im Winter abgeworfen werden, liebt feuchten, sehr nassen Standort	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,90 5,— 6,25 8,20 11,—	31,— 40,— 50,— 66,— 90,—	280,— 360,— — — —
Taxus (L.) Eibe (Taxaceae)					
H.R.S.V.	baccata (L.), für Hecke bestens geeignet, erstklassige Ware, sämtliche Bestände jährlich geschnitten, daher dicht und voll garniert	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,90 5,— 6,25 8,20 11,— 14,—	31,— 40,— 50,— 66,— 90,— 110,—	280,— 360,— 450,— 609,— 809,— 1099,—
	Pyramidenförmig geschn. Solitärpflanzen 20 % teurer	100—125 125—150	11,— 14,—	90,— 110,—	809,— 1099,—
	2 × verpflanzt ohne Ballen	20—30 30—40 40—60	1,50 2,— 2,50	13,50 18,— 22,50	120,— 160,— 200,—
	natürlich gewachsene, breite Büsche, oft breiter als hoch	60—80 60—80 60—80 60—80 80—100 80—100 80—100 80—100 100—125 100—125	8,— 10,— 13,50 18,— 10,— 13,— 18,— 24,— 24,— 24,—	64,— 80,— 110,— 145,— 80,— 110,— 145,— 190,— 190,— 190,—	580,— 720,— 1000,— 1300,— 720,— 1000,— 1300,— — — —
St.	aureo-variegata (hort.), beständige, goldbunte Form Höhe oder Breite	30—40 40—60 60—80 80—100	5,— 6,25 8,20 11,—	40,— 50,— 66,— 90,—	360,— 450,— 600,— 800,—
E.R.S.St.	dovastonii (Laws), flach niederliegend	30—40 40—50 50—60 60—70	9,— 12,— 14,50 18,—	75,— 100,— 120,— 150,—	— — — —
E.B.S.St.	aurea, schöne, gelbbunte Form der Urform Taxus dovastonii	30—40 40—50 50—60 60—70	9,— 12,— 14,50 18,—	75,— 100,— 120,— 150,—	— — — —
E.H.R.S.	erecta overeynderi (hort.), geschlossener, pyramidenförmiger Wuchs, völlig winterhart, als Heckenpflanze besonders zu empfehlen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	5,— 6,25 8,20 11,— 15,— 18,—	40,— 50,— 66,— 90,— 120,— 145,—	360,— 450,— 600,— 800,— 1080,— 1300,—
E.R.S.	fastigiata (Pilger) (hibernica) (hort.), Irische Eibe, wunderbar schlanke Säulenform mit tief dunkelgrünen Nadeln, veredelte Pflanzen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	5,— 6,25 8,20 11,— 15,—	40,— 50,— 66,— 90,— 120,—	360,— 450,— 600,— 800,— 1080,—
	aureo-marginata (Fish), sehr wertvolle, gelbbunte Säulenform	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	5,— 6,25 8,20 11,— 15,— 18,—	40,— 50,— 66,— 90,— 120,— 145,—	360,— 450,— 600,— 800,— 1080,— 1300,—
	repandens (Pers.), flachwachsende Zwergform	20—25 25—30 30—40 40—50 50—60	6,— 6,75 7,50 9,30 12,—	48,— 54,— 60,— 74,— 96,—	430,— 480,— 540,— 670,— 880,—
	cuspidata hicksii (Rehd.) schmale Säulenform, enorm winterhart	30—40 40—60 60—80	5,— 6,25 8,20	40,— 50,— 66,—	— — —
	nana (Rehd.) (T. brevifolia) (Nutt), niedrig bleibender Busch mit kurzen, dicken Nadeln, vollkommen winterhart	20—25 25—30 30—40 40—50	6,— 6,75 7,50 9,30	48,— 54,— 60,— 74,—	430,— 480,— 540,— 670,—

Thuja (L.) Lebensbaum (Pinaceae)

H.R.V.	<i>gigantea aureseens</i> (hort.) (gig. var. aurea variegata), goldbunte, völlig harte Form von üppigem Wachstum	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
		125—150	5,—	40,—	350,—
		150—175	8,20	66,—	600,—
		175—200	11,—	90,—	800,—
		200—225	14,—	110,—	1000,—
		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.R.V.	<i>occidentalis</i> (L.), abendländischer Lebensbaum für Hecken und Schutzpflanzungen sehr geeignete Konifere, die keine Ansprüche an den Boden stellt, mehrmals verpflanzt, ohne Ballen	30—40	—,50	4,—	33,—
		40—60	—,55	4,50	40,—
		60—80	—,60	5,50	50,—
		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	mehrmals geschnittene Pflanzen, voll garniert, Qualitätsware mit Ballen	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
		125—150	5,—	40,—	360,—
		150—175	6,25	50,—	450,—
		175—200	8,30	66,—	600,—
		200—225	11,—	90,—	800,—
H.R.	<i>occidentalis atrovirens</i> (hort.), beste Form für Hecken, glänzend dunkelgrün, sich auch im Winter nicht verfärbend, pyramidaler Wuchs	60—80	3,10	25,—	220,—
		80—100	3,90	31,—	280,—
		100—125	5,—	40,—	360,—
H.R.	<i>columna</i> (Späth), Säulenlebensbaum, entstanden aus einem Sämling der für alle Zwecke sehr wertvollen <i>Th. fastigiata</i>	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
		125—150	5,—	40,—	360,—
		150—175	8,20	66,—	600,—
	<i>elegantissima</i> , pyramidal wachsend, mit goldgelben Triebspitzen	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
H.V.	<i>ellwangeriana</i> (Beiß), mit moosartiger Bezweigung, dichte Pyramiden bildend	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	150,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
		125—150	5,—	40,—	350,—
H.V.	<i>ellwang. gracillis</i> (hort.), Bezweigung wie bei der Stammart, für niedrige Hecken	40—60	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
H.St	<i>Rheingold</i> (Vollert), hellgoldgelbe Form, mit moosartiger Belaubung, langsam wachsend	15—20	2,25	18,—	160,—
		20—30	3,30	27,—	240,—
		30—40	4,50	36,—	320,—
H.R.V.	<i>fastigiata</i> (Beißn.) (<i>Th. occ. stricta</i>), bildet ohne Schnitt dicht verzweigte Säulen mit schöner, hellgrüner Färbung, die auch im Winter unverändert bleibt. Setzt nur wenig oder keine Saat an. Vollkommen unempfindlich gegen Rauch und Tropfenfall, ohne Frage eine der wertvollsten <i>Thuja</i> -Arten, auch für Hecken sehr zu empfehlen	40—50	1,85	13,50	120,—
		60—80	2,25	18,—	160,—
		80—100	3,10	25,—	220,—
		100—125	3,90	31,—	280,—
		125—150	5,—	40,—	360,—
		150—175	8,20	66,—	600,—
		175—200	11,—	90,—	800,—
		200—225	14,—	110,—	1000,—
St.	<i>globosa</i> (Beißn.) (<i>Spihlmanni</i>), kugelförmig wachsende Form mit frischgrüner Belaubung	20—30	2,40	20,—	180,—
		30—40	3,10	25,—	220,—
		40—60	3,90	31,—	280,—
		60—80	5,—	40,—	360,—
°	<i>compacta</i> (hort.), regelmäßige Kugeln bildend, auch ohne jeglichen Schnitt mit dunkelgrüner Belaubung	30—40	3,10	25,—	220,—
		40—60	3,90	31,—	280,—
H.V.St.	<i>hoveyi</i> (Veitch), gedrungener, rundlich eiförmiger Wuchs, lichtgrüne Bezweigung	30—40	1,85	13,50	
		40—60	2,25	18,—	
		60—80	3,10	25,—	
		80—100	3,90	31,—	

Thuja (L.) Lebensbaum (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R.H.S.	<i>recurva nana</i> (hort.), bildet rundliche Kugeln mit übergebogenen oder gedrehten Zweigspitzen .. Breite	15—20 20—30 30—40 40—50	2,25 3,30 4,50 5,60	18,— 27,— 36,— 45,—	160,— 240,— 320,— 400,—
H.R.S.	<i>rosenthalii</i> (Ohlendorf), schmale dichte Säulenform mit dunkelgrüner, gekräuselter Bezweigung, die auch im Winter sich nicht verfärbt, für Grabpflanzung vielfach angewandt, außerordentlich unempfindlich. Eine sehr wertvolle Thuja-Art	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,85 2,25 3,10 3,90 5,—	13,50 18,— 25,— 31,— 40,—	120,— 160,— 220,— 280,— 360,—
H.	<i>vervaenana</i> (Henk u. Hochst.), breit pyramidal wachsend, mit lockerer, gelblicher, im Winter goldbronzefarbener Bezweigung	60—80 80—100 100—125	2,25 3,10 3,90	18,— 25,— 31,—	
H.V.	<i>wagneriana</i> (Beißn.) (<i>Versmannii</i>) (hort), schmal oval mit dichter, sattgrüner Bezweigung	40—60 60—80	1,85 2,25	13,50 18,—	
H.V.	<i>wareana</i> (Beißn.), von dichtem, gedrunenem Wuchs, grau-grüner Belaubung	60—80 80—100 100—125	2,25 3,10 3,90	18,— 25,— 31,—	
H.St.	<i>orientalis nana</i> (Carr) (<i>Biota orient. compacta</i>) (Beißn.), dicht verzweigte Zwergform mit zierlicher, frischgrüner Bezweigung	20—30 30—40 40—50	3,30 4,50 5,60	27,— 36,— 45,—	
	<i>standishii</i> lockere, leicht überhängende Form mit frischer, intensiver Bezweigung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,— 4,— 5,— 6,— 8,—		
Thujopsis (S. et Z.) Hibalebensbaum (Pinaceae)					
R.V.	<i>dolabrata</i> (S. et Z.), bis 15 m hoher Baum mit waagrecht abstehenden, an den Spitzen überhängenden Zweigen, breite Pyramiden bildend	30—40 40—60 60—80 80—100	3,90 5,— 6,25 8,20	31,— 40,— 50,— 66,—	280,— 360,— 450,— 600,—
Tsuga (Carr.) Hemslocktanne (Pinaceae)					
H.S.V.	<i>canadensis</i> (Carr), leicht überhängende Zweige, zierliche Benadelung	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,90 5,— 6,25 11,— 15,— 18,—	31,— 40,— 50,— 90,— 120,— 145,—	280,— 360,— 450,— 800,—
	<i>heterophylla</i> (<i>T. mertensiana</i> , Auct.) westamerikanische Hemslocktanne, ähnelt der <i>canadensis</i> , im Wachstum etwas rascher	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	3,90 5,— 6,25 11,20 15,—	31,— 40,— 50,— 90,— 120,—	280,— 360,— 450,—

Junggehölze zur Weiterkultur

Sind bei einer Bestellung die gewünschten Jahrgänge vergriffen, so werden die Pflanzen von anderen Jahrgängen gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist. Höhenmaße sind ungefähr angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu vermeiden. Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um 25 %, jedoch um mindestens DM 1,— je 100 Stück. Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Die mit einem F bezeichneten Pflanzenarten und Größen sind Forstpflanzen. Für diese gelten die Verkaufs- und Versandbedingungen gemäß § 23 unserer Lieferungsbedingungen.

a) Beerenobst

Brombeeren			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>fruticosus</i>	1jähr. bew. Ausf.	-1/0	60—100	10,—	80,—
Himbeeren					
Preußen, Deutschland Lloyd George	1jähr. Abrisse	-1/0	50—80	12,—	100,—
Johannisbeeren					
Boskoop, Goliath, Lee's schwarze					
Rosenthals Langtraubige, weiße Holländische, weiße Perle, weiße Versailles, rote Holländer, rote Kirsch,					
Erstling von Vierlanden	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	15—40	15,—	135,—
Heros Fays Fruchtbare, Silvergieters	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	15—40	16,50	150,—
Haselnüsse in großfr. Sorten	1jähr. Ableger	-1/0	30—60	60,—	
	1jähr. Ableger	-1/1	60—100	80,—	

b) Junge Schlingpflanzen

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Ampelopsis					
siehe Parthenocissus					
Campsis					
radicans	1jähr. Sämlinge	1/0		16,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	25—50	60,—	
Celastrus					
orbiculatus	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	9,50	
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	11,50	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	24,—	
Clematis					
vitalba	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	4,70	32,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	60—100	7,—	55,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	60—100	13,50	120,—
Veredlungsunterlagen siehe unter Unterlagen					
viticella	1jähr. Sämlinge	1/0		11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	18,50	160,—
Lonicera					
caprifolia major	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	30—60	30,—	
heckrottii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	30—50	100,—	
periclymenum	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	20,—	180,—
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	50—80	40,—	360,—
Menispermum					
canadense	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	22,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	30,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	30—50	60,—	
	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/3	50—80	100,—	
Parthenocissus					
quinquefolia	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0		13,50	120,—
Engelmanni	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0		15,50	140,—
radicantissima	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0		15,50	140,—
Tecoma					
radicans	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	12,—	100,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	15,—	125,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—60	30,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	60—80	45,—	
Wistaria (Glyzine)					
chinensis	1jähr. Sämlinge	1/0		15,—	125,—
	1jähr. Veredl. m. Tb.	x/1/0			125,—

c) Junge Laubgehölze

Wir liefern junge Laubgehölze in Sorten unserer Wahl

	1000 Stück in 20—30 Sorten				90,—
	30—40 Sorten				105,—
Acer					
campestre	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	4,50	30,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	9,—	75,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	60—100	10,50	90,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	13,50	120,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	16,50	150,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	22,—	200,—
	4jähr. 2 x verpfl. buschig		80—100	5,—	40,—
	4jähr. 2 x verpfl. buschig		100—125	6,—	50,—
dasycarpum siehe sacharinum					
ginnala	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,50	50,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	9,—	75,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	165,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	22,—	200,—
negundo	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	3,90	24,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	4,50	30,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	60—100	6,50	50,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	13,50	120,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	15,—	135,—

			Höhe	100	1000	
			in cm	St.	St.	
				DM	DM	
Acer						
palmatum	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	20,—		
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	25,—		
	2jähr. Sämlinge	1/1	20—40	37,50		
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	50,—		
	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	2,50	18,—	
	aus anerkannter Saat	1/0	20—40	3,—	25,—	
	10 % Aufschlag	1/0	40—60	4,50	40,—	
	2jähr. Sämlinge	2/0	40—65	8,—	68,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	11,—	98,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	16,—	145,—	
4jähr. v. Säml.	1/3	140—180	21,—	190,—		
pseudoplatanus	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	3,—	24,—	
	aus anerkannter Saat	1/0	40—60	4,—	36,—	
	10 % Aufschlag	2/0	40—60	5,—	45,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	7,—	60,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	11,—	90,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	15,—	130,—	
	4jähr. v. Säml.	1/3	140—180	20,—	170,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	6,—	45,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	9,—	75,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	14,—	125,—	
sacharinum	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	16,—	145,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	20,—	180,—	
	4jähr. v. Säml.	2/2	140—180	30,—	270,—	
	Aesculus					
	hippocastanum	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	5,50	40,—
		2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	7,50	60,—
		2jähr. Sämlinge	2/0	40—60	9,50	80,—
		3jähr. v. Säml.	1/2	20—40	9,50	80,—
		4jähr. v. Säml.	1/3	40—65	13,50	120,—
	4jähr. v. Säml.	1/3	65—100	22,—	200,—	
Ailanthus						
glandulosa	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	4,20	28,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	5,—	40,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	7,50	60,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	13,50	120,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	80—100	18,—	160,—	
Alnus						
glutinosa	1jähr. Sämlinge	1/0	7—15	2,—	12,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	2,50	18,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	4,—	32,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	8,—	65,—	
	2jähr. v. Säml.	1/2	65—100	11,—	90,—	
	2jähr. v. Säml.	1/2	100—140	12,—	105,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	140—180	15,—	130,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	3,—	24,—	
	aus anerkannter Saat	1/0	25—50	4,—	35,—	
	10 % Aufschlag	1/1	40—65	7,—	62,—	
incana	2jähr. v. Säml.	1/2	65—100	10,—	86,—	
	2jähr. v. Säml.	1/2	100—140	11,—	98,—	
	Amelanchier					
	botryapium	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	9,—	
		1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	12,—	
		3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	20,—	
		3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	25,—	
	canadensis	1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	25,—	
		2jähr. v. Säml.	2/0	30—50	40,—	
		3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	60,—	
3jähr. v. Säml.		1/2	50—80	60,—		
ovalis	1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	25,—		
	2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	40,—		
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	60,—		
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	60,—		
Amorpha						
fruticosa	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	6,—		
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	10,—		
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	12,—		
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	16,—		
Andromeda						
floribunda	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	5—15	40,—		
	4jähr. v. Steckl.	0/2/2	15—30	60,—		
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—20	60,—		
japonica						

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Azalea					
japonica in klein- und großblumigen Sorten	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—20	140,—	
mollis	2jähr. Sämlinge	2/0		9,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	10—15	40,—	
	4jähr. v. Säml.	1/3	15—25	60,—	
pontica	2jähr. Sämlinge	2/0		9,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	10—15	40,—	
	4jähr. v. Säml.	1/3	15—25	60,—	
Berberis					
buxifolia nana	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	13,50	120,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—20	22,—	200,—
candidula	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—12	59,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—12	84,—	
darwinii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—12	60,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—12	84,—	
gagnepaini	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	50,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	74,—	
hookeri	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	50,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	74,—	
julianae	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	50,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	74,—	
stenophylla	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—25	60,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	15—25	84,—	
thunbergii	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	7,—	55,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	16,—	145,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	22,—	200,—
thunbergii atripurpurea	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	7,—	55,—
	1jähr. Sämlinge	2/0	15—30	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	16,—	145,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	22,—	200,—
verruculosa	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	6—12	60,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—12	84,—	
wilsoni subcaulata	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	40,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	50,—	
Betula					
papyrifera	2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	16,—	
	2jähr. Sämlinge	2/0	40—65	20,—	
pendula tristis	1jähr. Veredl. m. Tb.	x/1/0	60—80	200,—	
pendula youngii	1jähr. Veredl. m. Tb.	x/1/0	80—120	270,—	
pubescens u. verrucosa aus anerkannter Saat 10 0/0 Aufschlag	F 1jähr. Sämlinge	1/0	15—25	2,50	20,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	3,—	28,—
	F 2jähr. Sämlinge	2/0	25—50	4,50	35,—
	F 2jähr. Sämlinge	2/0	50—80	6,50	54,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	8,—	64,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	11,—	90,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	14,—	112,—
Buddleia					
davidii	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	6,50	50,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	9,—	75,—
	1jähr. pik. Säml.	1/x/0	30—50	14,—	125,—
	1jähr. pik. Säml.	1/x/0	50—80	17,—	155,—
davidii Empire Blue	1jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/0		75,—	
davidii Ile de France	1jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/0		60,—	
davidii Royal Red	1jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/0		75,—	
davidii White Bouquet	1jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/0		75,—	
Buxus					
sempervirens arborescens	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	13,50	120,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3	12—25	20,—	180,—
			15—20	80,—	
Kugeln zur Weiterkultur	mit Ballen		20—25	100,—	
			30—40	110,—	
Pyramiden zur Weiterkultur	mit Ballen		40—60	125,—	
			60—80	180,—	
Calluna					
vulgaris alba	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris alba Hammondi	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris alporti	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris aurea	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris elegantissima	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris fl. pl.	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Calicanthus					
floridus	1jähr. Sämlinge	1/0		40,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	60,—	
praecox	1jähr. Sämlinge	1/0		40,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	60,—	
Caragana					
arborescens	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	8,—	65,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	9,—	75,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	13,50	120,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	16,50	150,—
Carpinus					
betulus					
aus anerkannter Saat	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	2,50	15,—
10 % Aufschlag	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	3,50	27,—
	F 2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	4,50	33,—
	F 2jähr. Sämlinge	2/0	40—60	9,—	70,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	7,—	50,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—65	13,—	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	20,—	150,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	25,—	200,—
3—4jähr. verpfl. für Hecken gezogen					
		1/2	40—60	27,—	240,—
		1/2	60—80	36,—	330,—
		1/3	80—100	44,—	400,—
betulus pyramidalis	1jähr. Veredl.	x/1/0	25—50	110,—	
	1jähr. Veredl.	x/1/0	50—80	140,—	
Castanea					
sativa	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	22,—	200,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	25,—	225,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	15—30	30,—	270,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	35,—	315,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	45,—	405,—
Catalpa					
bignonioides	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	10,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	12,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	24,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	40,—	
speciosa	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	10,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	12,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	24,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	40,—	
Ceanothus					
americanus	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	30,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—60	45,—	
Celtis					
occidentalis	1jähr. Sämlinge	1/0		20,—	
Cercidiphyllum					
japonica	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	9,—	80,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	11,—	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	30,—	270,—
Cercis					
siliquastrum	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	16,—	
	2jährige Sämlinge	2/0	12—25	44,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	25—40	80,—	
Chaenomeles					
japonica	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	6,50	50,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	14,—	125,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—70	16,50	150,—
lagenaria	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	6,50	50,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	14,—	125,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—70	16,50	150,—
Clethra					
alnifolia	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		80,—	

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Colutea					
arborescens	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	8,50	70,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	10,50	90,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	16,50	150,—
Cornus					
alba	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	8,—	65,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	11,50	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	13,50	120,—
alba elegans	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	40,—	
alba kesselringii	1jähr. v. Steckl.	0/1/0	30—60	20,—	180,—
alba sibirica (C. tat. sibirica)	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	40,—	
alba späthi	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	40,—	
mas.	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	18,—	160,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	22,—	200,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	35,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	45,—	
sanguinea	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	60,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	15,—	135,—
stolonifera flaviramea	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	20,—	180,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	20,—	180,—
Corylus					
avellana	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	11,50	100,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	14,—	125,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	18,—	160,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	22,—	200,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	27,50	250,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	33,—	300,—
in großfr. Sorten	2jähr. v. Ableger	1/1	60—100	100,—	
avellana atropurpurea	2jähr. Ableger	-2/0	60—100	100,—	
columna	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	20,—	180,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	25,—	225,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	40,—	360,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	60,—	540,—
Cotinus					
coggygia	1jähr. Sämlinge	1/0		18,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	30,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	50,—	
Cotoneaster					
acutifolia	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	10,50	90,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	18,—	160,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	25,—	225,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	33,—	300,—
	4jähr. v. Säml.	2/2	80—100	40,—	360,—
adpressa	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	6—10	40,—	360,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	6—10	64,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	55,—	500,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	10—15	88,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	7,50	60,—
bullata	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	16,50	150,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	25,—	230,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	45,—	400,—
dammeri	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	70,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0 1 2	12—20	93,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—20	60,—	540,—
dielsiana (C. applanata)	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	7,50	60,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	16,50	150,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	25,—	230,—
divaricata	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	10,50	90,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	15,—	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	25,—	225,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	33,—	300,—
franchettii	1jähr. Sämlinge	1/0	5—10	16,50	150,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	20,—	180,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	28,—	260,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	20—40	50,—	450,—

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Cotoneaster					
<i>horizontalis</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	10—20	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	10—20	40,—	360,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	15—25	22,—	200,—
	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	15—25	53,—	540,—
<i>humifusa</i> siehe <i>C. dammeri</i>					
<i>microphylla</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		64,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		88,—	
<i>microphylla thymifolia</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		64,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		88,—	
<i>moupinensis</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	7,50	60,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	13,50	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	16,50	150,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	25,—	230,—
<i>multiflora</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	17,50	
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	22,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	30,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	40,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	55,—	
<i>praecox</i>	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	70,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0		7,50	
	2jähr. v. Säml.	1/1	10—15	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	10—15	40,—	360,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	15—25	22,—	200,—
<i>prostrata</i>	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	15—30	58,—	540,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—15	15,—	135,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—15	40,—	360,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	22,—	200,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—25	58,—	540,—
<i>salicifolia floccosa</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—25	55,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	15—25	80,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	25—50	120,—	
<i>simonsii</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	7,50	60,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	13,50	120,—
<i>Crataegus</i>	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	16,50	150,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	13,50	125,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	16,50	150,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	22,—	200,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	33,—	300,—
<i>coccinea</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	13,50	125,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	16,50	150,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	22,—	200,—
<i>prunifolia</i>	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	33,—	300,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	13,50	125,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	16,50	150,—
<i>monogyna</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	22,—	200,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	33,—	300,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	3,10	16,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	4,—	25,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	40—60	5,50	40,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	60—90	7,—	55,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	7,—	55,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	60—90	9,50	80,—
	4jähr. v. Säml.	1/3	60—100	12,50	110,—
Veredlungsunterlagen siehe unter Unterlagen					
<i>pyracantha</i> siehe <i>Pyracantha coccinea</i>					
Cydonia					
siehe <i>Chacnomeles</i>					
Cytisus					
<i>hirsutus</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	8,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	40—70	13,50	
<i>nigricans</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	8,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	40—70	13,50	
<i>praecox</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	36,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	15—30	60,—	
<i>scoparius</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	5,50	40,—
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	20—40	50,—	
<i>scoparius</i> Hybriden i. Sorten	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	20—40	90,—	

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Daphne					
mezereum	1jähr. Sämlinge	1/0		25,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	10—20	60,—	
	4jähr. v. Säml.	2/2	15—30	80,—	
Deutzia					
candidissima, scabra plena, fortunei, watereri, magnifica, Pride of Roche- ster, rosea plena und andere	1jähr. Steckl.	0/1/0	30—60	15,—	135,—
gracilis	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	220,—
lemoinei	2jähr. v. Steckl.	0/3/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/3/0	20—40	25,—	220,—
lemoinei Boule de Neige	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	220,—
lemoinei compacta	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	220,—
lemoinei Avalanche	2jähr. v. Steckl.	0/3/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/3/0	20—40	25,—	220,—
rosea	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	220,—
rosea multiflora	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
rosea venusta	2jähr. v. Steckl.	0/2/0	10—25	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	220,—
Diervilla siehe Weigela					
Elacagnus					
angustifolia	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	20,—	180,—
multiflora	1jähr. Sämlinge	1/0		20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	30,—	
Erica					
carnea	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
carnea King George	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
carnea Silberschmelze	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
herbacea vivellii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
herbacea rubra	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
herbacea Winter Beauty	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
mediterranea	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		22,—	200,—
vulgaris	siehe Calluna vulgaris				
Escallonia					
Donard Seedling	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	20—40	65,—	
Evonymus					
alata	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	20,—	
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—15	35,—	
europaea	1jähr. Sämlinge	1/0	7—15	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	7,50	60,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	25,—	225,—
nana koopmanni	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	18,—	160,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	22,—	200,—
radicans	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	13,50	120,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—30	16,50	150,—
radicans fol. arg. var.	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	20,—	180,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	44,—	
radicans minima	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	20,—	180,—
radicans repens	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		25,—	225,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	50,—	
radicans vegeta					
Exochorda					
grandiflora	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	35,—	300,—
		1/0	20—40	45,—	400,—
Fagus					
silvatica	F 1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	3,50	27,—
aus anerkannter Saat	F 3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	12,—	98,—
10 0/0 Aufschlag	F 3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	15,—	130,—
3—4jähr. verpfl. für Hecken gezogen		1/2	40—60	27,—	240,—
		1/2	60—80	36,—	330,—
		1/2	80—100	44,—	400,—

				Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Fagus						
<i>silvatica atropurpurea</i>	2jähr. v. Veredl.	x/1/1		30—50	190,—	
<i>macrophylla</i>	2jähr. v. Veredl.	x/1/1		50—80	240,—	
	2jähr. v. Veredl.	x/1/1		80—120	330,—	
<i>purpurea</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		15—30	15,50	
	3jähr. v. Säml.	1/2		30—50	35,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2		50—80	48,—	
Forsythia						
<i>intermedia</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		20—40	15,—	135,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		40—70	20,—	180,—
<i>intermedia spectabilis</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		20—40	15,—	135,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		40—70	20,—	180,—
<i>intermedia vitellina</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		20—40	15,—	135,—
<i>suspensa</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		25—50	36,—	
<i>suspensa fortunei</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		25—50	36,—	
<i>viridissima</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		25—50	36,—	
Fraxinus						
<i>excelsior</i>	F 1jähr. Sämlinge	1/0		10—20	2,50	18,—
aus anerkannter Saat	F 1jähr. Sämlinge	1/0		20—40	3,—	24,—
10 % Aufschlag	F 3jähr. v. Säml.	1/2		40—65	8,50	65,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2		65—100	12,—	98,—
	F 4jähr. v. Säml.	1/3		100—140	20,—	160,—
	F 4jähr. v. Säml.	1/3		140—180	28,—	230,—
<i>ornus</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		15—30	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1		20—40	12,50	
	3jähr. v. Säml.	1/2		40—65	16,50	
	3jähr. v. Säml.	1/2		65—100	20,—	
Genista						
<i>scoparia</i> siehe <i>Cytisus scoparius</i>		1/0				
<i>hispanica</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1			60,—	
<i>radiata</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1			60,—	
<i>sagittalis</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1			60,—	
<i>tinctoria</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		25—50	5,50	40,—
	1jähr. v. Säml.	1/0		50—80	7,50	60,—
<i>tinctoria flore pleno</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		50—80	100,—	
Gleditsia						
<i>triacanthos</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		15—30	8,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0		30—50	10,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1		20—40	16,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2		50—80	24,—	
Hibiscus						
<i>syriacus</i>	1jähr. Sämlinge	1/0			20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1		20—40	35,—	
Hippophae						
<i>rhamnoides</i>	1jähr. Sämlinge	1/1		10—20	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/1		20—40	7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1		25—40	15,—	135,—
	3jähr. v. Säml.	1/2		50—80	26,50	240,—
Holodiscus						
<i>discolor ariaefolius</i> (<i>Spirea ariefolia</i>)	2jähr. v. Säml.	1/1		30—50	24,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1		50—80	30,—	
Hydrangea						
<i>arborescens</i> grdl.	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		15—30	30,—	
<i>paniculata</i> grdl.	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		15—30	20,—	180,—
	3jähr. v. Steckl.			30—50	33,—	300,—
<i>opuloides acuminata</i>	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1			60,—	
Hypericum						
<i>calycinum</i>	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0			33,—	
<i>patulum henryi</i>	2jähr. v. Säml.	1/1		20—40	22,—	
Ilex						
<i>aquifolium</i>	1jähr. Sämlinge	1/0			8,—	65,—
	2jähr. Sämlinge	2/0		7—15	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml.	1/1		10—18	40,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1			60,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2		18—24	60,—	
	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2		12—30	90,—	
<i>pyramidalis</i>	2jähr. v. Säml. m. Tb.	0/1/1		8—12	65,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		12—20	90,—	

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Juglans					
nigra	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	16,50	150,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	20,—	180,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	27,50	250,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—60	37,—	330,—
regia	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	23,50	215,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	29,—	265,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	40,—	360,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	40,—	360,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—60	48,—	440,—
Kerria					
japonica	3jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	20,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	30,—	
japonica flore pleno	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	30,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/1	30—50	40,—	
Koelreuteria					
paniculata	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	12,50	
Kolkwitzia					
amabilis	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—30	60,—	
Laburnum					
alpinum	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	9,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	14,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	25,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	35,—	
vulgare	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,50	50,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	8,50	70,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	22,—	200,—
vossi	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	30—50	80,—	
	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	50—80	100,—	
Lavendula					
officinalis	2jähr. v. Säml.	1/1	10—15	18,—	
Ligustrum					
Lodense	1jähr. bew. Steckl.	0/1/1	10—20	9,50	80,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/1	20—40	15,—	135,—
ovalifolium	1jähr. bew. Steckl.	0/1/1	15—30	5,50	40,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/1	30—50	6,50	50,—
	2—4 Triebe	0/2/0	30—50	9,50	80,—
	2—4 Triebe	0/2/0	50—80	11,50	100,—
vulgare	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	15—30	5,50	40,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	6,50	50,—
	2—4 Triebe	0/2/0	30—50	9,50	80,—
	2—4 Triebe	0/2/0	50—80	11,50	100,—
vulgare atrovirens	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	10—20	6,50	50,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	20—40	9,50	80,—
	2—4 Triebe	0/2/0	30—50	11,50	100,—
	2—4 Triebe	0/2/0	50—80	15,—	135,—
Liriodendron					
tulipifera	1jähr. Sämlinge	1/0		40,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	15—30	90,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	65,—	
Lonicera					
amoena alba	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—70	15,—	135,—
coerulea	2jähr. Sämlinge	2/0	10—15	9,50	80,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	15—25	11,50	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	20—30	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	24,—	215,—
ledebouri	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	29,—	265,—
maackii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	29,—	265,—
morrowii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
pileata	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	15,—	135,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	20,—	180,—
yunnanensis	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	15,—	135,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	20,—	180,—
tatarica	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—70	15,—	135,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	15—30	6,—	45,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	8,—	65,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	15,—	135,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	18,—	160,—
	4jähr. v. Säml.	2/2	80—100	22,—	200,—

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Lonicera					
tatarica alba	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
xylosteum	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	25—50	8,—	65,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	15,—	135,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	80—120	22,—	200,—
Lycium					
halimifolium	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	60—100	18,—	160,—
Mahonia					
aquifolium	1jähr. Sämlinge	1/0		4,—	24,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	10—20	6,50	50,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	12—25	11,50	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	15—30	15,50	140,—
	4jähr. v. Säml.	1/3	20—40	25,—	225,—
	4jähr. v. Säml.	1/3	25—50	30,—	270,—
Malus					
in veredelten Sorten	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	40—80	60,—	
Morus					
alba	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	4,70	32,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	5,50	40,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	15—30	9,50	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—60	12,50	110,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	60—100	18,—	160,—
Pernettya					
mucronata	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	5—10	40,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	65,—	
Phellodendron amurense					
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	15,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	26,—	
Philadelphus					
a) hochwachsende Sorten:					
coronarius	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
inodorus grandiflorus	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
pubescens	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
b) mittelhohe Sorten:					
virginalis	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	20,—	180,—
virginalis Bouquet blanc	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	18,—	165,—
virginalis Girandole	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	32,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	45,—	
c) niedrigbleibende Sorten:					
coronarius aureus	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	32,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	45,—	
Lemoinei Avalanche	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	18,—	165,—
Lemoinei erectus	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	18,—	165,—
Lemoinei Dame blanche	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	18,—	165,—
Lemoinei Manteau d'Hermine	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	18,—	165,—
Physocarpus					
opulifolius (Spirea opulifolia)	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—60	13,50	120,—
opulifolius luteus (Sp. op. lutea)	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—60	15,—	135,—
Platanus					
acerifolia	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	15—30	30,—	
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	50,—	
Populus					
alba nivea	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	11,50	100,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,50	140,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	20,—	180,—
alba pyramidalis	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	15—30	80,—	
			30—60	100,—	
bachelieri	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	65—100	11,—	90,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/1	100—140	18,—	150,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	140—180	25,—	220,—

Populus

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
balsamifera	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	11,50	100,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	22,—	200,—
berolinensis	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	10,—	80,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	11,50	100,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	15,50	140,—
canadensis, robusta, alba	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	65—100	11,—	90,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	100—140	18,—	150,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	140—180	25,—	220,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	180—220	33,—	280,—
nigra pyramidalis (P. nigra fastigiata)	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	9,—	80,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	11,50	100,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	15,50	140,—
simonii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	10,—	—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,—	—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	20,—	—
simonii fastigiata	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	10,—	—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,—	—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	20,—	—
vernirubens	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	65—100	11,—	90,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	100—140	18,—	150,—
	F 2jähr. bew. Steckl.	0/2/0	140—180	25,—	220,—

Potentilla

fruticosa	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	5,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,50	50,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	12,—	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—60	15,—	135,—
farrerri	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	20,—	180,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	25,—	225,—
friedrichseni	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—25	13,50	120,—
	3jähr. v. Steckl.	0 1 2	25—50	17,—	155,—
parvifolia	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	13,50	120,—
	3jähr. v. Steckl.	0 1 2	25—50	17,—	155,—
purdmii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	13,50	120,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	25—50	17,—	155,—

Prunus

cerasifera (Pr. myrobalana)	1jähr. Sämlinge	1/0	60—100	12,—	100,—
cerasifera pissardii nigra	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	30—50	65,—	—
	1jähr. Handveredlungen	x/1/0	50—80	80,—	—
laurocerasus caucasica	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	24,—	—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	33,—	—
laurocerasus herbergii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	24,—	—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	33,—	—
laurocerasus schipkaensis	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	24,—	—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	50,—	—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	33,—	—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—40	80,—	—
laurocerasus schipkaensis macrophylla	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	24,—	—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	33,—	—
mahaleb	1jähr. Sämlinge	1/0	60—100	12,—	100,—
padus	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	7,50	60,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	10,50	90,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	22,—	200,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	33,—	300,—
serotina	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	2,—	16,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	3,—	24,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	4,50	35,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	8,—	64,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	11,—	88,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	16,—	126,—
serrulata Hisakura	1jähr. Veredl.	x/1/0	30—50	65,—	—
	1jähr. Veredl.	x/1/0	50—80	80,—	—
serrulata Shidare Sakura	1jähr. Veredl.	x/1/0	30—50	80,—	—
spinosa	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,50	50,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	9,—	75,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	12,50	110,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	160,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	22,—	200,—
virginiana	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	16,50	150,—

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Ptelea					
trifoliata	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	8,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	10,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	20,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	24,—	
Pyracantha					
coccinea, cocc. lalandi	2jähr. v. Steckl.	1/0	10—20	40,—	360,—
cocc. Kasan	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	60,—	540,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	60,—	540,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—40	90,—	800,—
Quercus					
fastigiata	2jähr. Veredl.	x/1/1	30—50	180,—	
	2jähr. Veredl.	x/1/1	50—80	220,—	
pedunculata (Qu. robur)	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—25	3,—	22,—
aus anerkannter Saat	F 1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	3,50	30,—
10 % Aufschlag	F 3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	10,—	80,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	14,—	110,—
	F 4jähr. v. Säml.	1/3	80—100	20,—	155,—
	F 4jähr. v. Säml.	2/2	100—140	30,—	250,—
rubra	F 1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	3,—	25,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	4,50	35,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	11,—	90,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	18,—	150,—
	F 4jähr. v. Säml.	2/2	80—100	23,—	190,—
	F 4jähr. v. Säml.	2/2	100—140	28,—	250,—
sessilis	F 1jähr. Sämlinge	1/0	7—15	4,—	30,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	5,—	40,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	15—30	10,—	88,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	16,—	135,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	23,—	185,—
	F 4jähr. v. Säml.	1/3	80—100	28,—	225,—
Rhamnus					
cathartica	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	8,—	67,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	10,—	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	15,50	140,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	28,—	220,—
frangula	1jähr. Sämlinge	1/0	8—15	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	8,—	65,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	10,—	80,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	11,50	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	15,50	140,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	18,50	170,—
Rhododendron					
Hybriden aus Samen gezogen	2jähr. Sämlinge	2/0		9,—	
	3jähr. v. Säml.	1/2	10—15	35,—	
	4jähr. v. Säml.	1/3	15—25	50,—	
praecox	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—15	120,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	160,—	
Veredlungsunterlagen siehe unter Unterlagen					
Rhodotypus					
kerrioides	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	11,—	93,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	14,—	110,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	16,50	150,—
Rhus					
typhina	1jähr. Sämlinge	1/0		25,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	45,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	60,—	
Ribes					
alpinum	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	22,—	200,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	30—50	28,—	250,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	50—80	35,—	300,—
aureum	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	50—80	11,—	93,—
divaricatum (R. arboreum)	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	50—70	11,—	93,—
floridum	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	15,—	135,—
sanguineum	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	60—100	18,—	160,—
„ atrorubens	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	60—100	18,—	160,—
„ King Edward VII.	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	25,—	

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Robinia					
hispidia	1jähr. Handveredlg.	x/1/0		100,—	
pseudocacia	F 1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	4,—	30,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	5,—	45,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	80—100	7,—	60,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	6,50	55,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	11,—	85,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	100—140	16,—	125,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	140—180	19,—	155,—
bessoniana	1jähr. Handveredlg.	x/1/0		100,—	
Rosa					
blanda	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	7,50	60,—
canina	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	6,30	55,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	25—50	10,50	90,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	13,50	120,—
lucida (virginiana)	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	11,50	100,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—60	15,—	135,—
multiflora	1jähr. Sämlinge	1/0	25—50	9,50	75,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	10,—	90,—
rubiginosa	1jähr. Sämlinge	1/0	25—40	6,70	55,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	40—60	9,—	75,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	13,50	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	50—80	18,—	160,—
rubrifolia	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	11,—	93,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	13,50	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	22,50	200,—
rugosa	1jähr. Sämlinge	1/0	7—15	4,70	32,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,20	47,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	11,—	93,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	18,—	160,—
„ hollandica	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	9,50	80,—
Rubus					
fruticosus	1jähr. Sämlinge	1/0		10,50	87,—
	1jähr. pik. Sämlinge	1x0		13,—	114,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—60	25,—	
phoeniculusius	2jähr. v. Säml.	1/1	30—60	40,—	
Salix					
alba argentea, alba britzensis, elegantissima, latifolia glabra, pentandra, macrolepis, nigricans, pontederana, pulchra ruberima, repens argentea, rotundifolia, scharfenbergensis, smithiana, viminalis	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	9,50	80,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	12,50	110,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	16,—	140,—
alba vitellina pendula nova	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	12,50	110,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	18,—	160,—
aurita	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	12,50	110,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,—	135,—
caprea	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—60	12,50	110,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	60—100	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	16,50	150,—
„ mas.	1jähr. Veredlg.	x/1/0	30—60	50,—	
	1jähr. Veredlg.	x/1/0	60—100	60,—	
cinerea	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—65	12,50	110,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	65—100	15,—	135,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	100—140	16,50	150,—
Sambucus					
nigra	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	5,50	40,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	8,—	65,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	11,50	100,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	15,—	135,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	20,—	180,—
lacinata	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	22,—	
großfrüchtige Sorten	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	22,—	
racemosa	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	10,50	90,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	50—80	14,—	125,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	40,—	360,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	65—100	53,—	480,—

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Skimmia					
japonica	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—15	40,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—20	50,—	
Sophora					
japonica	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	12,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—60	16,—	
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	24,—	
Sorbaria					
aitchisonii	1jähr. pik. Säml.	1x0	10—20	13,50	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	60—100	25,—	225,—
sorbifolia (Spirea sorbifolia)	1jähr. pik. Säml.	1x0	10—20	13,50	120,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	60—100	25,—	225,—
Sorbus					
aucuparia	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	3,50	19,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	4,—	29,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	5,—	40,—
	F 2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	8,—	66,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	12,50	100,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	100—140	16,50	135,—
	4jähr. v. Säml.	1/3	140—180	30,—	270,—
suecica (S. scandica)	1jähr. Sämlinge	1/0	5—10	3,50	20,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	4,50	30,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	7,50	60,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—65	10,50	90,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	65—100	15,—	135,—
Spiraea					
albiflora	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—25	18,—	160,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—40	22,—	200,—
arguta	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	25,—	225,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	29,—	265,—
ariaefolia siehe Holodiscus discolor					
billardii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	12,50	110,—
bumalda Anthony Waterer	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—25	18,—	160,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	22,—	200,—
„ Froebeli	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	15,50	140,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	20,—	180,—
douglasii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	12,50	110,—
fontenaysii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	40—70	12,50	110,—
Froebeli siehe Sp. bumalda Froebeli					
hypericifolia thalictroides	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—60	22,—	200,—
menziesii triumphans	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	12,50	110,—
opulifolia siehe Physocarpus					
sorbifolia siehe Sorbaria sorbifolia					
thunbergii	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	40,—	
vanhouttei	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	25—50	16,50	150,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	40—70	22,—	200,—
Symphoricarpus					
chenaultii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	16,—	145,—
orbiculatus	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	16,—	145,—
„ aurei variegatus	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	20—40	20,—	
racemosus	1jähr. Sämlinge	1/0	15—30	6,—	45,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	30—50	9,—	75,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	30—50	13,50	120,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	16,50	150,—
Syringa					
chinensis (S. rothomagensis)	1jähr. Veredl.	x/1/0	20—40	60,—	
	1jähr. Veredl.	x/1/0	40—60	90,—	
josikaea	2jähr. Sämlinge	2/0	10—20	11,50	100,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	14,—	125,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	20—40	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	40—65	22,—	200,—
reflexa	2jähr. Sämlinge	2/0	15—30	15,—	135,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	20,—	180,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	27,—	240,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—65	33,—	300,—
vulgaris	2jähr. v. Säml.	1/1	20—40	7,50	60,—
	2jähr. v. Säml.	1/1	40—60	9,50	80,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	60—100	18,—	160,—
vulgaris Hybriden	1jähr. Veredl.	x/1/0	15—30	80,—	
	1jähr. Veredl.	x/1/0	30—50	100,—	
Veredlungsunterlagen siehe unter Unterlagen					

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Tamarix					
odessanum	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	20,—	
pentandra	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	24,—	
tetrandra purpurea	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—50	20,—	
Teucrium					
chamaedrys	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—12	15,—	135,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	20,—	180,—
Tilia					
grandifolia	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	7,—	54,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	8,20	64,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	13,50	120,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	50—80	20,—	180,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	30—50	18,—	160,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	22,—	200,—
	3jähr. v. Säml.	1/2	80—100	27,—	240,—
parvifolia	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	3,—	25,—
aus anerkannter Saat	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	5,—	40,—
10 % Aufschlag	F 2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	9,—	70,—
	F 3jähr. v. Säml.	1/2	50—80	15,—	130,—
	F 4jähr. v. Säml.	1/3	80—120	20,—	160,—
Ulex					
europaea	1jähr. Sämlinge m. Tb.	1/0	15—25	60,—	
	1jähr. Sämlinge m. Tb.	1/0	25—50	80,—	
Ulmus					
campestris	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	3,—	21,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	20—40	5,—	35,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	40—65	10,—	85,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	65—100	14,—	114,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	100—140	18,—	140,—
scabra (U. montana)	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	3,50	21,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	40—65	10,—	85,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	65—100	14,—	114,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	100—140	18,—	140,—
Viburnum					
burkwoodii	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		100,—	
lantana	1jähr. Sämlinge	1/0	5—10	9,50	80,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	11,50	100,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	15—30	15,—	135,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	30—50	20,—	180,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	30—50	27,—	240,—
opulus	3jähr. v. Sämlinge	1/2	50—80	36,—	320,—
	1jähr. Sämlinge	1/0	5—10	7,—	55,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	10—20	9,50	80,—
	2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	13,50	120,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	25—50	22,—	200,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	50—80	33,—	300,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	80—100	40,—	350,—
opulus sterile	2jähr. v. Ableger	—1/1	15—30	27,50	
	3jähr. v. Ableger	—1/2	30—60	40,—	
rhytidophyllum	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	100,—	
Weigela					
florida, candidissima, hybrida Ver-					
schaefeltii	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	15—30	18,—	160,—
	1jähr. bew. Steckl.	0/1/0	30—60	20,—	180,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	20—40	20,—	180,—
Eva Rathke, Newport Red, Pres.					
Duchartre	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	15—30	32,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	30—50	40,—	

d) Junge Nadelhölzer (Koniferen)

Abies

alba (A. pectinata)	F 1jähr. Sämlinge	1/0		2,50	15,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2		6,50	55,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	12—25	9,—	75,—
balsamea	2jähr. Sämlinge	2/0		13,—	
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	10—20	22,—	
concolor	2jähr. Sämlinge	2/0		13,—	115,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	10—15	22,—	200,—
	4jähr. v. Sämlinge	2/2	15—25	33,—	300,—

				Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Abies						
<i>grandis</i>	F	2jähr. v. Sämlinge	1/1		15,—	135,—
		3jähr. v. Sämlinge	1/2		37,—	330,—
	F	2jähr. Sämlinge	2/0		10,50	90,—
		3jähr. v. Sämlinge	1/2		18,—	165,—
<i>nordmanniana</i>		4jähr. v. Säml.	2/2		27,50	250,—
<i>pectinata</i> siehe <i>A. alba</i>						
<i>veitchii</i>		2jähr. Sämlinge	2/0		15,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	8—12	30,—	
Cedrus						
<i>atlantica</i>		1jähr. Sämlinge	1/0		16,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	10—20	40,—	
		2jähr. v. Sämlinge m. Tb.	1/1	10—20	60,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—30	67,—	
<i>deodara</i>		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	20—30	90,—	
		1jähr. Sämlinge	1/0		16,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	10—20	40,—	
		2jähr. v. Sämlinge m. Tb.	1/1	10—20	60,—	
<i>libanii</i>		3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—30	67,—	
		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	20—30	90,—	
		1jähr. Sämlinge	1/0		16,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	10—20	40,—	
<i>Cephalotaxus</i>		2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	10—20	60,—	
		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	20—30	67,—	
		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	20—30	90,—	
		1jähr. Sämlinge	1/0		30,—	
Chamaecyparis						
<i>Lawsoniana</i>		2jähr. Sämlinge	2/0		4,50	30,—
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—30	11,50	100,—
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—40	15,—	135,—
Veredlungsunterlagen unter Unterlagen						
„ <i>alumi</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—25	26,50	240,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
		4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	55,—	500,—
<i>Lawsoniana Ellwoodii</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	26,50	240,—
		2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	50,—	
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	33,—	300,—
„ <i>fletscheri</i>		3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—25	67,—	
		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	26,50	240,—
		2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	50,—	
„ <i>intertexta</i>		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	33,—	300,—
		3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—25	67,—	
		2jähr. Veredl.	x/2/0	25—35	88,—	
„ <i>stewartii</i>		2jähr. Veredl.	x/2/0	25—35	88,—	
		2jähr. Veredl.	x/2/0	25—35	88,—	
		2jähr. Veredl.	x/2/0	25—35	88,—	
<i>obtusata</i>		1jähr. Veredl.	x/1/0	8—12	100,—	
		1jähr. Veredl.	x/1/0	8—12	100,—	
		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
<i>pisifera</i>		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	33,—	300,—
		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—25	33,—	300,—
„ <i>aurea</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	32,—	
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	18—30	48,—	
		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
„ <i>filifera</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	33,—	300,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	55,—	500,—
		4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	55,—	500,—
„ <i>plumosa</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
		4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	55,—	500,—
„ „ <i>aurea</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
		4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	55,—	500,—
„ „ <i>sqarrosa</i>		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	26,50	240,—
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
		4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	55,—	500,—
Cryptomeria						
<i>japonica</i>		2jähr. v. Sämlinge	1/1	15—20	20,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—40	30,—	
Ginkgo biloba						
		1jähr. Sämlinge	1/0		22,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	10—20	37,50	
		2jähr. v. Säml. m. Tb	1/1	10—20	50,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—30	50,—	
		3jähr. v. Steckl. m. Tb.	1/2	15—30	75,—	

Juniperus

			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
chinensis pfitzeriana	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	36,—	320,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	54,—	480,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3	30—40	66,—	600,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	20—30	60,—	540,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	30—40	100,—	900,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	48,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	80,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	72,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—30	115,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0		7,—	55,—
	2jähr. v. Sämlinge	1/1	8—15	12,50	110,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—40	19,—	175,—
communis hibernica	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	26,50	240,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	50,—	450,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—30	66,—	600,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	26,50	240,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—30	33,—	300,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	10—20	50,—	450,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—30	66,—	600,—
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	5—10	45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	66,—	600,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	5—10	70,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	10—15	100,—	
horizontalis (J. procata)	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—20	66,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—20	100,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0 1/3	20—30	135,—	
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—20	66,—	600,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0 1/2	15—20	100,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	20—30	135,—	
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	33,—	300,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—20	45,—	400,—
	4jähr. v. Steckl.	0 1/3	20—30	55,—	500,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	57,—	500,—
sabina femina	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—20	77,—	600,—
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3	20—30	90,—	
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	33,—	300,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—20	45,—	400,—
	4jähr. v. Steckl.	0 1/3	20—30	55,—	500,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—15	57,—	500,—
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	15—20	77,—	600,—
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/2/2	20—30	90,—	
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	5—10	45,—	400,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	5—10	70,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	66,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	10—15	100,—	
squamata meyeri	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—10	33,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	45,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3	15—25	55,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	8—10	57,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	10—15	77,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3	15—25	88,—	
	1jähr. Sämlinge	1/0		7,—	55,—
	2jähr. v. Sämlinge	1/1	15—25	13,50	120,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	25—40	20,—	180,—
Veredlungsunterlagen siehe Unterlagen					

Larix

europaea	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—25	3,—	25,—
	F 2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	5,—	42,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	20—40	8,—	60,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	30—50	10,—	85,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	50—80	15,—	110,—
	F 1jähr. Sämlinge	1/0	10—25	3,50	28,—
leptolepis	F 2jähr. Sämlinge	2/0	20—40	5,50	44,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	20—40	9,—	70,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	30—50	12,—	95,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	50—80	16,—	125,—

Picea

canadensis (P. alba)	F 2jähr. Sämlinge	2/0	7—20	1,50	11,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—35	4,50	38,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—40	6,50	53,—


			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
Picea					
<i>conica</i> (P. <i>Albertina conica</i>)	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		55,—	
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		75,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		100,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		80,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		100,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3	10—15	140,—	
<i>excelsa</i>	F 2jähr. Sämlinge	2/0	10—25	1,50	13,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—35	4,50	38,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—40	7,—	53,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	30—60	8,—	66,—
Veredlungsunterlagen siehe Unterlagen					
„ <i>maxwellii</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		65,—	580,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		90,—	800,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		60,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		80,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		100,—	
„ <i>nidiformis</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		65,—	580,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		60,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		80,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		100,—	
„ <i>pygmaea</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		65,—	580,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		90,—	
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		60,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		80,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		100,—	
„ <i>pumila glauca</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1		45,—	400,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		65,—	580,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		90,—	800,—
	2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1		60,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		80,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		100,—	
<i>omorika</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		6,50	50,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	10—20	20,—	180,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—40	30,—	270,—
<i>orientalis</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		10,—	90,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	7—12	30,—	270,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	12—20	45,—	400,—
<i>pungens</i>	2jähr. Sämlinge	1/1		7,50	60,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2		13,50	120,—
„ <i>glauca</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		9,50	80,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	10—20	16,50	150,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	15—35	25,—	225,—
„ <i>kosteri</i>	1jähr. Veredl. m. Tb.	x/1/0		160,—	
	2jähr. Veredl. m. Tb.	x/2/0		250,—	
<i>sitkaensis</i>	F 2jähr. Sämlinge	2/0	10—25	3,—	22,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—35	8,—	55,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	25—50	10,—	80,—
Pinus					
<i>cembra</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		14,—	
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	8—12	20,—	
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	10—18	30,—	
<i>excelsa</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		14,—	
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	10—20	26,50	
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—40	40,—	
<i>laricio austriaca</i> s.P. <i>nigra austriaca</i>	F 2jähr. Sämlinge	2/0		2,—	12,—
<i>montana</i>	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2		5,—	40,—
	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3	15—30	8,—	60,—
	2 × verpflanzt		20—30	33,—	300,—
	2 × verpflanzt		30—40	53,—	480,—
„ <i>mughus</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		3,50	29,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	8—12	8,20	67,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	12—20	15,—	135,—
	2 × verpflanzt		15—20	40,—	360,—
	2 × verpflanzt		20—30	44,—	400,—
	2 × verpflanzt		30—40	66,—	600,—
„ <i>pumilio</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		5,50	40,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	8—12	12,50	110,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	10—15	18,—	165,—
<i>nigra austriaca</i>	F 1jähr. Sämlinge	1/1		1,50	10,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1		4,50	33,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	12—25	6,50	55,—




Heizbares Gewächshaus zur Vermehrung besonderer Gehölze und Koniferen



Zwergkoniferen in reichhaltiger Auswahl



Ein Ausschnitt aus meinem Koniferensortiment



Zier- und Decksträucher aller Jahrgänge und Sorten

Pinus			Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>sylvestris</i>					
Höhenkiefer anerkannt, Schwarzwald über 700 m	F 1jähr. Sämlinge	1/0		1,50	12,—
	F 1jähr. Sämlinge, Auslese	1/0		1,80	14,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1		4,50	34,—
Höhenkiefer anerkannt 300—600 m	F 1jähr. Sämlinge	1/0		1,30	10,—
	F 1jähr. Sämlinge, Auslese	1/0		1,50	12,—
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1		3,50	28,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2		8,—	60,—
Tieflandkiefer anerkannt	F 1jähr. Sämlinge	1/0		1,—	8,50
	F 1jähr. Sämlinge, Auslese	1/0		1,30	10,50
	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1		3,30	26,—
<i>strobus</i>	F 2jähr. Sämlinge	2/0		3,—	22,—
aus anerkannter Saat	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2		5,—	40,—
10 % Aufschlag	F 4jähr. v. Sämlinge	1/3		7,50	60,—
<i>Pseudotsuga</i>					
<i>douglasii</i>	F 2jähr. Sämlinge	2/0	15—35	12,—	90,—
aus anerkannter Saat	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	15—25	15,—	120,—
10 % Aufschlag	F 2jähr. v. Sämlinge	1/1	25—50	22,50	180,—
	F 3jähr. v. Sämlinge	1/2	30—60	25,—	200,—
<i>Taxodium</i>					
<i>distichum</i>	1jähr. Sämlinge	1/0	10—20	20,—	
	2jähr. v. Sämlinge	1/1	20—40	30,—	
	2jähr. v. Säml. m. Tb.	1/1	20—40	50,—	
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	40—70	45,—	
	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	40—70	80,—	
<i>baccata</i>	1jähr. Sämlinge	1/0		12,50	110,—
	2jähr. Sämlinge	2/0		18,—	160,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	8—12	30,—	270,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	12—18	44,—	400,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	18—25	55,—	500,—
	mehrm. verpfl. o. B.		25—30	120,—	
	mehrm. verpfl. o. B.		30—40	160,—	
	mehrm. verpfl. o. B.		40—60	200,—	
„ <i>aurea</i>	3jähr. v. Sämlinge	1/2		60,—	
	3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2		120,—	
	4jähr. v. Sämlinge	1/3		100,—	
	4jähr. v. Säml. m. Tb.	1/3		150,—	
„ <i>erecta overeynderi</i>	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		54,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		100,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		80,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		120,—	
	5jähr. v. Steckl.	0/2/3		120,—	
„ <i>washingtonii</i>	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		60,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		100,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		150,—	
<i>decastoni</i>	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		60,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		100,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3		150,—	
„ <i>aurea</i>	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
<i>fastigiata</i>	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		60,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		100,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
„ <i>aurea</i>	3jähr. v. Steckl.	0/1/2		60,—	
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3		100,—	
	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
<i>repandens</i>	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2		120,—	
<i>Thuja</i>					
<i>gigantea aurescens</i>	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—20	25,—	225,—
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—35	30,—	270,—
	4jähr. v. Steckl.	0/1/3	25—40	35,—	320,—
<i>occidentalis</i>	2jähr. Sämlinge	2/0		3,90	24,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	15—30	9,50	80,—
	3jähr. v. Sämlinge	1/2	20—35	11,—	93,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	25—50	12,—	106,—
	4jähr. v. Sämlinge	1/3	30—60	13,50	120,—
	2 mal v. Sämlinge		30—40	33,—	300,—
	2 mal v. Sämlinge		40—60	40,—	360,—
	2 mal v. Sämlinge		60—80	50,—	450,—

Veredlungsunterlagen siehe unter Unterlagen

				Höhe in cm	100 St. DM	1000 St. DM	
Thuja	occidentalis atrovirens	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	30,—	270,—	
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—25	40,—	360,—	
		2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	30,—	270,—	
	„ columna	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—25	40,—	360,—	
		occidentalis ellwangeriana	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	25,—	225,—
			3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—35	30,—	270,—
	4jähr. v. Steckl.		0/1/3	25—40	35,—	320,—	
	„ „ elegantissima	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	25,—	225,—	
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	20—35	30,—	270,—	
		„ „ gracilis	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	12—20	25,—	225,—
	3jähr. v. Steckl.		0/1/2	20—35	30,—	270,—	
	4jähr. v. Steckl.		0/1/3	25—40	35,—	320,—	
	„ „ Rheingold	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—10	30,—	270,—	
		3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—12	40,—	360,—	
		2jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/1	55,—			
fastigiata	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	65,—				
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3	88,—				
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	30,—	270,—		
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—25	40,—	360,—		
globosa (Spihlm.)	4jähr. v. Steckl.	0/1/3	20—40	54,—	480,—		
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—12	30,—	270,—		
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	40,—	360,—		
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—12	30,—	270,—		
„ compacta	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	10—15	40,—	360,—		
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	7—10	30,—	270,—		
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	8—12	40,—	360,—		
recurva nana	3jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/2	65,—				
	4jähr. v. Steckl. m. Tb.	0/1/3	88,—				
	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	8—15	30,—	270,—		
rosenthalii	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	15—20	40,—	360,—		
Thujaopsis							
	dolobrata	2jähr. v. Steckl.	0/1/1	10—15	33,—		
	3jähr. v. Steckl.	0/1/2	12—20	40,—			
Tsuga	canadensis	2jähr. Sämlinge	2/0		18,—	160,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	8—12	24,—	220,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	12—20	30,—	270,—	
		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	12—20	64,—		
		4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—30	40,—	360,—	
		4jähr. v. Säml. m. Tb.	1/3	20—30	88,—		
	Mertensiana	2jähr. Sämlinge	2/0		18,—	160,—	
		2jähr. v. Sämlinge	1/1	8—12	24,—	220,—	
		3jähr. v. Sämlinge	1/2	12—20	30,—	270,—	
		3jähr. v. Säml. m. Tb.	1/2	12—20	64,—		
		4jähr. v. Sämlinge	1/3	20—30	40,—	360,—	
		4jähr. v. Säml. m. Tb.	1/3	20—30	88,—		

Obst-Veredlungsunterlagen

I. Sämlingsunterlagen

Malus communis

Apfelsämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis				Durchmesser in mm	DM
2j. verpflanzt	==	1/1		10/12	130,—
2j. verpflanzt	==	1/1		8/10	100,—
2j. verpflanzt	==	1/1		7/8	60,—
1j. krautartig pik.	==	1 x 0		9/12	130,—
1j. krautartig pik.	==	1 x 0		7/9	100,—
1j. krautartig pik.	==	1 x 0		6/7	60,—
1j. krautartig pik.	==	1 x 0		4/6	30,—
1j. Sämlinge	==	1/0		9/12	100,—
1j. Sämlinge	==	1/0		7/9	70,—
1j. Sämlinge	==	1/0		6/7	45,—
1j. Sämlinge	==	1/0		4/6	25,—

Pirus communis

Birnensämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis				Durchmesser in mm	DM
2j. verpflanzt	==	1/1		10/12	150,—
2j. verpflanzt	==	1/1		8/10	130,—
2j. verpflanzt	==	1/1		7/8	70,—

Pirus communis

		Durchmesser in mm	DM
1j. krautartig pik. =	1 x 0	9/12	150,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	7/9	130,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	6/7	70,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	4/6	35,—
1j. Sämlinge =	1/0	9/12	120,—
1j. Sämlinge =	1/0	7/9	85,—
1j. Sämlinge =	1/0	6/7	50,—
1j. Sämlinge =	1/0	4/6	30,—

Prunus avium**Vogelkirschen, hellrindige**

1j. krautartig pik. =	1 x 0	oder 2j. verpfl. 1/1	9/12	120,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	oder 2j. verpfl. 1/1	7/9	95,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0		5/7	65,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0		4/5	25,—
1j. Sämlinge =	1/0		9/12	100,—
1j. Sämlinge =	1/0		7/9	85,—
1j. Sämlinge =	1/0		5/7	55,—
1j. Sämlinge =	1/0		4/5	20,—

Vogelkirschen von Bremens Kirsche

1j. krautartig pik. =	1 x 0	oder 2j. verpfl. 1/1	9/12	150,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	oder 2j. verpfl. 1/1	7/9	120,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0		5/7	80,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0		4/5	35,—
1j. Sämlinge =	1/0		9/12	120,—
1j. Sämlinge =	1/0		7/9	90,—
1j. Sämlinge =	1/0		5/7	65,—
1j. Sämlinge =	1/0		4/5	25,—

Prunus mahaleb**Steinweichsel oder Weichselkirsche**

1j. krautartig pik. =	1 x 0	7/9	90,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	5/7	65,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	4/5	40,—
1j. Sämlinge =	1/0	7/9	80,—
1j. Sämlinge =	1/0	5/7	55,—
1j. Sämlinge =	1/0	4/5	30,—

Prunus**St. Julien damascena, schwarz und weiß, und ähnliche Pflaumenunterlagen aus Samen**

2j. verpflanzt =	1/1	10/12	180,—
2j. verpflanzt =	1/1	8/10	150,—
2j. verpflanzt =	1/1	7/8	100,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	9/12	180,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	7/9	150,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	6/7	100,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	4/6	50,—
1j. Sämlinge =	1/0	9/12	135,—
1j. Sämlinge =	1/0	7/9	120,—
1j. Sämlinge =	1/0	6/7	90,—
1j. Sämlinge =	1/0	4/6	40,—

Für Prunus dam. Orleans ein Aufschlag von 10 %

Prunus cerasifera myrobalana**Myrobalanen**

1j. krautartig pik. =	1 x 0	7/9	100,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	5/7	80,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	4/5	40,—
1j. Sämlinge =	1/0	7/9	90,—
1j. Sämlinge =	1/0	5/7	70,—
1j. Sämlinge =	1/0	4/5	35,—

Prunus persica und Prunus armeniaca**Pfirsiche und Aprikosen (Marillen)**

1j. krautartig pik. =	1 x 0	7/9	110,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	5/7	100,—
1j. krautartig pik. =	1 x 0	4/5	60,—
1j. Sämlinge =	1/0	7/9	100,—
1j. Sämlinge =	1/0	5/7	90,—
1j. Sämlinge =	1/0	4/5	55,—

Crataegus monogyna

Weißdorn, für Veredlungszwecke

	Durchmesser in mm	1000 St. DM.
2j. verpflanzt = 1/1	8/10	110,—
2j. verpflanzt = 1/1	7/8	90,—

Juglans regia

	Durchmesser in mm	100 St. DM.
1j. S. 1/0	10/20	17,50
1j. S. 1/0	20/40	22,—
1j. S. 1/0	40/60	30,—
2j. v. S. 2/0	20/40	30,—
2-3j. v. S. 2/0-3/0	40/60	36,—
2-3j. v. S. 2/0-3/0	60/80	44,—

II. Vegetativ vermehrbare Unterlagen**Apfel**

	Durchmesser in mm	
Malus EM. II (Echter Doucin)		
" EM. IV (Holsteiner Doucin)		
" EM. IX (Gelber Metzger Paradies)		
2j. verpflanzt = 1/1	10/12	170,—
2j. " = 1/1	8/10	150,—
2j. " = 1/1	6/8	120,—
1j. Abrisse = 1/0	9/12	120,—
1j. " = 1/0	7/9	100,—
1j. " = 1/0	6/7	70,—

Malus EM. I (Breitblättriger englischer Paradies)

" EM. XI (Grüner Doucin)		
" EM. XVI (Ketziner Ideal)		
2j. verpflanzt = 1/1	10/12	130,—
2j. " = 1/1	8/10	115,—
2j. " = 1/1	6/8	90,—
1j. Abrisse = 1/0	9/12	100,—
1j. " = 1/0	7/9	85,—
1j. " = 1/0	6/7	60,—

Quitte EM. A. und andere anerkannte Quittentypen

2j. verpflanzt = 1/1	10/12	175,—
2j. " = 1/1	8/10	150,—
2j. " = 1/1	6/8	110,—
1j. Abrisse = 1/0	9/12	150,—
1j. " = 1/0	7/9	120,—
1j. " = 1/0	6/7	80,—
1j. " = 1/0	4/6	50,—

Pflaume**Kroosjes**

Prunus Ackermann (Marunke)		
2j. verpflanzt = 1/1	10/12	180,—
2j. " = 1/1	8/10	160,—
2j. " = 1/1	6/8	125,—
1j. Abrisse = 1/0	9/12	150,—
1j. " = 1/0	7/9	130,—
1j. bew. Stecklinge = 0/1/0	10/12	150,—
1j. " " = 0/1/0	8/10	130,—
1j. " " = 0/1/0	6/8	100,—

Prunus myrobalana alba

1j. bew. Stecklinge = 0/1/0	10/12	200,—
1j. " " = 0/1/0	8/10	180,—
1j. " " = 0/1/0	6/8	150,—

Pflaume**Brompton**

Große grüne Reneklode

Myrobalana B.

2j. verpflanzt = 1/1	10/12	230,—
2j. verpflanzt = 1/1	8/10	210,—
2j. " = 1/1	6/8	180,—
1j. Abrisse = 1/0	9/12	180,—
1j. " = 1/0	7/9	170,—
1j. " = 1/0	5/7	160,—

Stachelbeere und Johannisbeere

<i>Ribes aureum</i> (Brechts Erfolg)			1000 St
			DM
1—2j. bew. Abrisse	= — 1/0	140 cm und höher	160,—
1—2j. „ „	= — 1/0	120/140 cm hoch	135,—
1—2j. „ „	= — 1/0	100/120 cm hoch	100,—
<i>Ribes divaricata</i> (Arboreum)			
1—2j. bew. Stecklinge	= 0/1/0	140 cm und höher	225,—
1—2j. „ „	= 0/1/0	120/140 cm hoch	200,—

Rosenveredlungsunterlagen**Preisgruppe I****Rosa canina sowie folgende Edelcanina:**

Brüghs, Deegens, Jägerbattl., Kokulinski, laxa, multiflora, rubiginosa, Senff, Schmidts Ideal		Durchmesser in mm	DM
1j. Sämlinge	= 1/0	8/12	70,—
1j. „	= 1/0	6/8	55,—
1j. „	= 1/0	4/6	40,—
1j. „	= 1/0	2/4	12,—
1j. krautartig pik.	= 1x0	8/12	80,—
1j. „	= 1x0	6/8	65,—
1j. „	= 1x0	4/6	50,—
1j. „	= 1x0	2/4	15,—

Preisgruppe II**Rosa inermis, multiflora stachellos,****Pfänders, Heinsobns Rekord, Pollmeriana und Neuheiten**

1j. Sämlinge	= 1/0	8/12	80,—
1j. „	= 1/0	6/8	65,—
1j. „	= 1/0	4/6	50,—
1j. „	= 1/0	2/4	14,—
1j. krautartig pik.	= 1x0	8/12	90,—
1j. „	= 1x0	6/8	75,—
1j. „	= 1x0	4/6	60,—
1j. „	= 1x0	2/4	16,—

Preisgruppe III**Rosenwildstämme**

Veredlungshöhe	160/200 cm		600,—
„	140/160 cm		550,—
„	120/140 cm		400,—
„	100/120 cm		350,—
„	80/100 cm		275,—

Gehölz-Veredlungsunterlagen

			100 St. DM	1000 St. DM
<i>Clematis vitalba</i>				
2j. v. S.	1/1	4—6 mm	15,—	135,—
1j. S.	1/0	4—6 mm	110,—	
1j. S.	1/0	3—4 mm	8,20	67,—
<i>Crataegus monogyna</i>				
2j. v.	1/1	8—10 mm	12,50	110,—
2j. v.	1/1	7—8 mm	10,50	90,—
<i>Hibiscus syriacus</i>				
2j. v. S.	1/1	8—10 mm	50,—	
2j. v. S.	1/1	6—8 mm	40,—	
1j. S.	1/0	4—6 mm	30,—	
<i>Rhododendron flavum</i>				
5j. v. S.	2/3	6—8 mm	40,—	360,—
5j. v. S.	2/3	4—6 mm	30,—	270,—

Laubhölzer

			100 St. DM	1000 St. DM
Rhododendron ponticum u. andere Sämlinge				
5j. v. S.	2/3	7—9 mm	33,—	300,—
Syringa vulgaris, eintriebzig				
2j. S. oder 2—3j. v.	2/0 oder 1/1 oder 1/2	10—12 mm	15,50	140,—
2j. S. oder 2—3j. v.	2/0 oder 1/1 oder 1/2	8—10 mm	12,60	110,—
2j. S. oder 2—3j. v.	2/0 oder 1/1 oder 1/2	7—8 mm	9,50	80,—
Viburnum lantana				
2j. S.	2/0	8—10 mm	33,—	300,—
2j. S.	2/0	6—8 mm	25,—	225,—
2j. S.	2/0	4—6 mm	20,—	180,—

Nadelhölzer-Veredlungsunterlagen

Cedrus deodara				
2j. v. S.	1/1	4—6 mm	60,—	
Chamaecyparis lawsoniana				
2—3j. v. S.	1/1 oder 2/1	6—8 mm	23,—	210,—
2—3j. v. S.	1/1 oder 2/1	4—6 mm	20,—	180,—
Juniperus virginiana				
2j. v. S.	1/1	6—8 mm	27,—	250,—
2j. v. S.	1/1	4—6 mm	22,—	200,—
Picea excelsa				
4j. v. S.	2/2	8—10 mm	13,50	120,—
3j. v. S.	2/1	6—8 mm	11,50	100,—
Taxus baccata				
4j. v. S.	1/3 oder 2/2	8—10 mm	70,—	630,—
4j. v. S.	1/3 oder 2/2	6—8 mm	60,—	540,—
4j. v. S.	1/3 oder 2/2	4—6 mm	50,—	450,—
Thuja occidentalis				
4j. v. S.	2/2	6—8 mm	18,—	160,—
3j. v. S.	2/1	4—6 mm	15,—	135,—

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen

50–1000 kg und 50–1000 km

Wichtig

Bei Stückgutsendungen werden wir, um unseren Kunden Frachtkosten einzusparen, so weit wie irgend möglich, diese Sendungen in Sammelwaggons in die dortige Gegend zum Versand bringen.

km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	km
50	2,30	3,60	5,20	6,60	8,20	9,20	11,20	12,40	13,50	13,50	50
100	3,40	5,70	8,20	10,80	13,50	15,50	18,30	20,50	22,60	22,60	100
150	4,—	7,30	10,40	13,70	17,—	19,50	23,40	26,—	28,50	28,50	150
200	5,10	9,20	13,50	17,70	22,20	25,70	30,70	34,20	37,50	37,50	200
250	5,70	10,40	15,30	20,—	25,50	29,40	35,10	38,90	42,90	42,90	250
300	6,60	12,40	18,10	23,80	30,—	34,60	41,60	46,20	50,50	50,50	300
350	7,—	13,50	19,50	26,—	32,90	37,70	45,50	50,60	55,30	55,30	350
400	7,90	15,—	22,10	29,10	36,90	42,60	51,10	56,70	62,—	62,—	400
450	8,50	16,—	23,40	30,90	39,10	45,40	54,50	60,30	66,—	66,—	450
500	9,10	17,30	25,50	33,77	42,80	49,40	59,30	66,—	72,30	72,30	500
550	9,60	18,20	27,20	35,80	45,40	52,40	62,80	69,90	76,30	76,30	550
600	10,10	19,20	28,50	37,60	47,60	55,10	66,—	73,30	80,40	80,40	600
650	10,40	20,—	29,60	39,10	49,50	57,30	68,80	76,40	83,60	83,60	650
700	10,90	20,90	30,70	40,80	51,90	59,80	71,90	79,80	87,30	87,30	700
750	11,20	21,50	31,70	42,—	53,30	61,50	74,—	82,—	89,90	89,90	750
800	11,40	21,80	32,50	43,—	54,60	63,10	75,50	84,—	92,—	92,—	800
850	11,60	22,20	33,—	43,70	55,60	64,20	76,80	85,50	93,80	93,80	850
900	11,80	22,80	33,70	44,60	56,40	65,40	78,40	87,10	95,30	95,30	900
950	11,80	22,90	34,20	45,40	57,60	66,40	79,70	88,80	96,90	96,90	950
1000	12,40	23,80	35,10	46,50	59,—	68,10	81,80	90,90	99,50	99,50	1000

km	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	bis 1000 kg	über 1000 kg p. 100 kg	km
50	14,50	15,60	17,10	18,10	19,50	20,50	21,60	21,60	21,60	2,14	50
100	24,30	25,90	28,50	30,10	32,80	34,50	36,30	36,30	36,30	3,59	100
150	30,60	33,10	36,30	38,40	41,60	43,80	46,—	46,—	46,—	4,55	150
200	40,30	43,—	47,40	50,30	54,50	57,40	60,50	60,50	60,50	5,99	200
250	46,10	49,30	54,30	57,40	62,40	65,50	69,10	69,10	69,10	6,84	250
300	54,50	58,50	64,40	68,10	74,—	77,80	81,60	81,60	81,60	8,08	300
350	59,60	63,90	70,10	74,40	80,90	84,90	89,60	89,50	89,50	8,86	350
400	66,90	71,60	78,80	83,50	90,60	95,40	100,40	100,40	100,40	9,94	400
450	71,30	76,30	83,80	89,—	96,60	101,60	106,90	106,90	106,90	10,58	450
500	77,80	83,50	91,60	97,10	105,50	111,—	117,—	117,—	117,—	11,58	500
550	82,40	88,—	96,90	102,90	111,60	117,50	123,60	123,60	123,60	12,24	550
600	86,60	92,80	102,—	108,30	117,50	123,80	130,20	130,20	130,20	12,89	600
650	90,—	96,50	106,30	112,80	122,40	128,80	135,30	135,30	135,30	13,40	650
700	94,10	100,80	110,90	117,50	127,80	134,50	141,60	141,60	141,60	14,02	700
750	96,60	103,90	114,10	121,—	131,40	138,30	145,50	145,50	145,50	14,41	750
800	99,10	106,10	116,90	123,90	134,50	141,50	149,10	149,10	149,10	14,76	800
850	100,80	108,10	118,90	126,—	137,—	144,10	151,70	151,70	151,70	15,02	850
900	102,80	110,—	121,—	128,50	139,40	146,80	154,30	154,30	154,30	15,28	900
950	104,40	111,90	123,10	130,60	141,60	149,10	157,—	157,—	157,—	15,54	950
1000	107,—	114,80	126,40	133,90	145,40	153,10	160,80	160,80	160,80	15,92	1000

Frachtsätze für lebende Pflanzen

Waggonladungen

zwischen Pinneberg und	Entfernung	F 5 Wagendlg. von 5000 Kilo	F 10 Waggonladung von 10000 Kilo	Waggonladung unter 5000 kg (mindestens 2000 kg)	zwischen Pinneberg und	Entfernung	F 5 Wagendlg. von 5000 Kilo	F 10 Waggonladung von 10000 Kilo	Waggonladung unter 5000 kg (mindestens 2000 kg)
	km	DM	DM	DM		km	DM	DM	DM
Aachen	492	4,34	3,72	11,23	Düsseldorf Hbf.	408	4,00	3,43	9,94
Amberg	721	5,22	4,47	14,02	Duisburg Hbf.	386	3,86	3,32	9,59
Ansbach	612	4,86	4,14	12,89	Eckernförde . .	122	1,70	1,47	4,08
Augsburg Hbf.	760	5,31	4,55	14,41	Erlangen	631	4,93	4,22	13,15
Baden-Baden . .	692	5,14	4,40	13,69	Essen Hbf. . . .	378	3,79	3,26	9,22
Bad Oldesloe . .	64	1,04	0,91	3,22	Flensburg	159	2,03	1,78	4,55
Bad Pyrmont . .	249	2,86	2,46	6,84	Frankf./M. Hbf.	528	4,45	3,82	11,89
Bad Segeberg . .	80	1,21	1,03	2,94	Freiburg/Breisg.	791	5,40	4,62	14,41
Bamberg	591	4,76	4,09	12,59	Friedrichshafen	860	5,52	4,72	15,02
Basel	812	5,45	4,65	14,76	Fulda	430	4,16	3,55	10,27
Bayreuth Hbf. .	622	4,90	4,19	12,89	Gelsenkirch Hbf.	367	3,75	3,23	9,22
Berlin H.u.L.Bhf.	310	3,35	2,89	8,08	Gießen	464	4,33	3,71	10,90
Bielefeld Hbf. .	249	2,86	2,46	6,84	Göttingen . . .	293	3,23	2,77	7,68
Bocholt	394	3,89	3,34	9,59	Hagen Hbf. . . .	363	3,69	3,17	9,22
Bochum Hbf. . .	366	3,75	3,23	9,22	Hamburg Berl. .	21	0,55	0,47	1,32
Bonn	466	4,34	3,72	10,90	Hamburg-Altona	15	0,47	0,40	1,07
Bottrop Hbf. . .	373	3,85	3,31	9,22	Hamburg-Harbg.	13	0,47	0,40	1,07
Braunlage	369	3,75	3,23	9,22	Hameln	230	2,73	2,35	6,41
Braunschw. Hbf.	203	2,48	2,16	5,99	Hamm (Westf.)	315	3,40	2,90	8,08
Bremen Hbf. . .	138	1,86	1,62	4,08	Hanau Hbf. . . .	518	4,42	3,79	11,58
Bremerhaven . .	146	1,94	1,69	4,55	Hannover Hbf.	183	2,28	1,97	5,53
Celle	157	2,08	1,78	4,55	Heide (Holst.) .	104	1,50	1,27	3,59
Coburg	539	4,50	3,86	11,89	Heidelberg Hbf.	613	4,86	4,14	12,89
Darmstadt Hbf.	554	4,58	3,93	12,24	Heilbronn Hbf.	654	4,99	4,27	13,40
Dortmund Hbf.	346	3,58	3,09	8,86	Hildesheim Hbf.	207	2,56	2,20	5,99
Düren	469	4,34	3,72	10,90	Ingolstadt Hbf.	738	5,24	4,48	14,02

Ohne Gewähr!

zwischen Pinneberg und	Entfernung	F 5 Wagenldg. von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10000 Kilo	Wagenladung unter 5000 kg (mindestens 2000 kg)	zwischen Pinneberg und	Entfernung	F 5 Wagenldg. von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10000 Kilo	Wagenladung unter 5000 kg (mindestens 2000 kg)
	km	DM	DM	DM		km	DM	DM	DM
Kaiserslaut. Hbf.	648	4,96	4,25	13,15	Oldenburg/O. .	184	2,28	1,97	5,53
Karlsruhe Hbf.	659	4,99	4,27	13,40	Osnabrück . .	246	2,86	2,46	6,84
Kassel Hbf. . .	351	3,65	3,12	8,86	Paderborn Hbf.	293	3,23	2,77	7,68
Kempten/A.Hbf.	847	5,50	4,69	15,02	Passau Hbf. . .	865	5,52	4,72	15,02
Kiel Hbf. . . .	90	1,31	1,13	3,22	Pforzheim . .	688	5,09	4,35	13,69
Koblenz Hbf. .	528	4,45	3,82	11,89	Plön	91	1,37	1,19	3,22
Köln Hbf. . .	444	4,19	3,58	10,58	Recklingh. Hbf.	351	3,65	3,12	8,86
Konstanz . . .	900	5,59	4,78	15,28	Regensburg Hbf.	747	5,26	4,50	14,02
Krefeld	408	4,00	3,43	9,94	Rendsburg . .	94	1,40	1,22	3,22
Landshut/B.Hbf.	809	5,41	4,63	14,76	Schleswig Altst.	122	1,70	1,47	4,08
Lindau Hbf. .	883	5,56	4,75	15,02	Schweinfurt Hbf.	549	4,56	3,89	11,89
Ludwigsh./R.Hbf.	610	4,86	4,14	12,89	Soest	329	3,48	3,00	8,47
Lübeck Hbf. .	87	1,25	1,08	2,94	Solingen Hbf. .	411	4,02	3,45	9,94
Lüneburg . . .	70	1,08	0,94	2,68	Soltau/Hann. .	98	1,42	1,23	3,22
Mainz Hbf. . .	564	4,62	3,96	12,24	Stuttgart Hbf. .	706	5,18	4,42	14,02
Mannh.Hbf.Eilg.	609	4,82	4,12	12,89	Trier Hbf. . .	613	4,86	4,14	12,89
Minden/Westf.	204	2,48	2,16	5,99	Tübingen Hbf.	769	5,31	4,55	14,41
Mühlheim/R Hbf.	384	3,85	3,31	9,59	Uelzen	104	1,50	1,27	3,59
München Hbf.	818	5,45	4,65	14,76	Ulm Hbf. . . .	757	5,30	4,53	14,41
M.-Gladb. Hbf.	426	4,12	3,54	10,27	Wiesbaden Hbf.	565	4,65	3,98	12,24
Münster/W.Hbf.	294	3,23	2,77	7,68	Wilhelmshaven	236	2,77	2,41	6,41
Neustadt/A. Bf.	603	4,82	4,12	12,89	Wuppertal-B. .	386	3,86	3,32	9,59
Nürnberg Hbf.	644	4,96	4,25	13,15	„ Elberfeld	480	4,34	3,72	11,23
Offenbach/Main	531	4,49	3,85	11,89	„ Vohwinkel	395	3,95	3,38	9,59
					Würzburg Hbf.	543	4,53	3,87	11,89

Ohne Gewähr!

MEINE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

(unter Zugrundelegung der Lieferungsbedingungen des Bundes Deutscher Baumschulen). Die Bedingungen gelten zwischen mir und dem Auftraggeber als rechtlich bindend.

1. Die Preise gelten ab meiner Baumschule in Deutscher Mark ohne Skonto- und Portoabzüge. Eingehende Aufträge auch meiner Vertreter gelten erst dann als von mir angenommen, wenn sie innerhalb einer Woche nach Eingang der Aufträge von mir bestätigt sind. Mündliche Abreden zwischen meinen Vertretern und dem Auftraggeber werden von mir nur dann anerkannt, wenn sie ebenfalls von mir schriftlich bestätigt worden sind.
2. Erfüllungsort ist Pinneberg, ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist Pinneberg, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Pinneberg oder der Geschäftssitz des Kunden.
3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Meine Vertreter sind nicht berechtigt, Zahlungen irgendwelcher Art zu fordern oder anzunehmen. Etwaige an meine Vertreter geleistete Zahlungen werden deshalb von mir nicht anerkannt.
4. Ich bin berechtigt, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern, wenn sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellt, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufwertes gefährdet ist. Kommt der Käufer dem Verlangen nach Sicherheitsstellung bzw. Vorausbezahlung nicht nach, so bin ich berechtigt, nach Ablauf einer dem Käufer zu setzenden Frist von mindestens 8 Tagen vom Verkauf zurückzutreten. Ich bin ferner berechtigt, einen bereits abgeschlossenen Verkauf einseitig zu lösen, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus früheren Lieferungen im Zeitpunkt der Ausführung des neuen Auftrages noch nicht nachgekommen ist. Ist der Auftrag bereits ausgeführt, so steht es mir frei, eingeräumte Zahlungstermine abzukürzen und sonstige zugesagte Vergünstigungen zu widerrufen.
5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Schäden, welche durch Frost oder andere Weise während des Transportes hervorgerufen sind, bin ich nicht haftbar. Um den Auftraggeber vor Transportschäden möglichst zu schützen, werden alle Sendungen von mir aus zu Lasten des Auftraggebers für den Transport versichert. Der Käufer ist verpflichtet, die genauen Versandvorschriften, insbesondere bezüglich der Bestimmungsstation usw. zu erteilen. Geschieht dieses nicht, so bin ich berechtigt, den Versand nach bestem eigenem Gutdünken auf dem mir am günstigsten erscheinenden Weg vorzunehmen, ohne damit eine Verantwortung zu übernehmen. Bei Verkäufen auf Abruf habe ich das Recht, Herbstlieferungen nach dem 15. November, Frühjahrslieferungen nach dem 15. April ohne weiteres auszuführen. Für alle im Auftrag des Bestellers ausgeführten Sammelladungen lehne ich jede Verantwortung ab, und zwar sowohl für die eigene als auch für fremde Ware.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.
7. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt, wenn nicht anders ausdrücklich vereinbart ist, der Besteller. Die Berechnung erfolgt nach den ortsüblichen Sätzen. Rollgeld, Kosten der Verpackung und der Transportversicherung werden als Barvoranschuß durch die Bahn nachgenommen.
8. Gewähr für das Anwachsen wird nicht übernommen.
9. Bürgschaft für Sortenechtheit wird bis zum Rechnungswert geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Bei derartigen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und

der geforderten Unterlagen läuft bis zum Ablauf des 5. Jahres vom Tage der Lieferung, bei allen übrigen Pflanzen bis zum Ablauf des 2. Jahres vom Tage der Lieferung an. Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

10. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens 5 Tage nach Empfang der Ware an mich direkt und nicht an meine Vertreter zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
11. Ersatz in einzelnen gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist. Der Sortenersatz indessen ist nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt. Als Ersatz für Pflanzen der I. Wahl können Pflanzen der mittleren Wahl zu den hierfür gültigen Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der II. Wahl für I. Wahl oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordern jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Bestellers.
12. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
13. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbestimmungen und Normalsätze des Bundes deutscher Baumschulen maßgebend.
14. Bei Lieferung von Forstpflanzen gelten die Lieferungsbedingungen gemäß Verordnung zur Regelung des Absatzes und der Preise für Forstsaamen und Forstpflanzen vom 17. September 1938, die ich als bekannt voraussetze. Auf Verlangen sende ich dem Käufer diese Bedingungen zu.



Inhaltsverzeichnis

Obstbäume u. Fruchtsträucher	Seite 4	Junggehölze zur Weiterkultur	Seite 78
Obstsorten	„ 6	Beerenobst und Sonstiges	
Rosen	„ 11	zur Weiterkultur	„ 78
Laubhölzer	„ 17	Junge Nadelhölzer	„ 93
Schlingpflanzen	„ 65	Veredelungsunterlagen	„ 98
Topffichten usw.	„ 68	Frachtsätze	„ 103
Koniferen	„ 68	Lieferungsbedingungen	„ 106

Islandmoos-Renntierflechte

Nur garantiert finnische Renntierflechte
in der altbekannten erstklassigen Qualität

Frischmoos in Standard-Export-Kisten **Kiste 24,—**

Trockenmoos in Standard-Export-Kartons **Karton 15,—**

Bei größerer Abnahme Mengenrabatt!

Notizen



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Rellingen — 1954/1955

Besuchen Sie mich!

Zur Besichtigung meiner
Kulturen

lade ich Sie herzlichst ein.

Conrad Maass